

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：NITROSTAT

藥品成分：Nitroglycerin

● 作用是什麼？為什麼要服用？

是血管擴張劑，可改善心臟的血流與氧氣的供應；用來預防心絞痛。通常在心絞痛發作時使用或從事可能引起發作的活動之前作為預防用(如爬樓梯，爬山、性活動、較劇烈運動、寒冷天氣外出等)。

● 如何服用？

1. 當胸痛時，最好先坐下以避免頭暈而跌倒，然後將此藥錠置於舌下，不要吞服，未溶解前儘量不要吞口水，症狀如未緩解，可每隔五分鐘舌下含一錠，至多使用三次，如果在發作後15分鐘內連續使用三次共用三錠，此時症狀如仍未改善，就應掛急診就醫，因為這有可能是其他的緊急的疾病狀況。
2. 預防發作的使用方法為：在從事可能引起發作的活動前5-10分鐘使用，約在用藥後2分鐘內產生藥效並約可維持30分鐘藥效。
3. 不要以感覺藥品會甜或灼熱感來判斷藥品的新鮮度，因為不覺甜或灼熱一樣是有作用的。

● 服用此藥時，應注意甚麼？

1. 記錄胸痛的次數，於下次就診時告知醫師。
2. 藥品會因久置而失效，倘若你使用後無法舒解胸痛，應該看醫師。
3. 請戒煙、減重、休息以及避免從事引起心絞痛的活動。
4. 可能產生暈眩，用藥後應避免開車或從事具危險性的機械操作。
5. 當你用藥期間可能懷孕或須哺乳，或您正在服用其他的藥品如降血壓藥物、抗精神病藥物或成藥等時，請先告知醫師。
6. 請以原有的玻璃容器保存藥品，取用後請儘速栓緊瓶蓋，於室溫下(25°C)保存。
7. 避免潮濕或貼身存放，並且盡量避免用手直接碰觸藥品。
8. 開封後應先取出小棉球，以便緊急時便於取用。但六個月未使用的藥錠應丟棄。
9. 裝此藥的瓶子內不要再裝其他種藥。
10. 請限制飲酒以免引起低血壓。請不要與“威而鋼”(Viagra)併用。
11. 請勿自行將此藥給別人用，以免發生意外。
12. 請放在小孩無法取用的地方。

● 有副作用嗎？該如何處理？

1. 使用此藥後可能會引起頭痛，但請您不要自行服用止痛藥或改變藥量，應告訴醫生，醫生會調整藥量或開藥給您。
2. 使用“耐絞寧”錠後，可能會暈眩、頭重腳輕、虛弱、心跳加快、胃不舒服、臉潮紅等症狀，如會影響您的生活品質時，門診時請告訴醫師。
3. 若出現視力模糊、口乾或皮膚疹現象時應停藥，並儘快看醫生。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726292