

PREMARIN® 普力馬林® 陰道乳膏 (conjugated estrogens)

VAGINAL CREAM in anonliquefying base




陰道乳膏使用圖解

1 將軟膏的蓋子打開




2 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上




3 壓擠軟管使軟膏依所需劑量
壓入塗藥管內



4 將塗藥器旋開



5 躺平後再將膝蓋彎曲
然後將裝入藥膏的塗藥器
輕輕的插入陰道深部
再慢慢推動推管
將藥膏完全推入陰道內



6

使用後的塗藥器
可將推管及容器分開
並用少許的肥皂和溫水沖洗



Reference: Premarin Vaginal Cream仿單版本USPI 201512-1

【適應症】萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。【劑量與給藥法】陰道內用：0.5-2g(gm)，視萎縮程度或用醫師決定劑量。必須選擇最低劑量來控制症狀，且在儘可能情況下中止治療法。必須週期性給藥(例如使用三個星期，休息一個星期)。嘗試停用或逐漸減少用藥時，須經3至6個月之緩慢減少使用。【禁忌症】普力馬林陰道乳膏不可使用於有下列情況的婦女：1.未經診斷之生殖道不正常出血 2.已知、懷疑或有乳癌病史者 3.已知或懷疑罹患會受雌激素影響之惡性腫瘤者 4.目前罹患深層靜脈血栓、肺栓塞或曾罹患這些疾病者 5.目前罹患動脈栓塞疾病者(例如中風、心肌梗塞)或曾罹患這些疾病者 6.已知會對普力馬林陰道乳膏產生過敏反應或血管性水腫 7.肝功能異常或肝臟疾病 8.已知的C蛋白、S蛋白、或抗凝血酵素缺乏損或其他血栓好發者的疾病 9.已知或懷疑懷孕者。【警語及注意事項】雌激素劑量增加罹患子宮內膜癌、心血管病、乳癌與種可能性失智症之風險【不良反應】子宮異常出血、骨盆疼痛、子宮肌瘤增大、子宮內膜增生、乳房觸痛、深層靜脈栓塞、肺栓塞、心肌梗塞、頭痛



Pfizer Limited

輝瑞大藥廠股份有限公司

台北總公司
新北市251淡水區中正東路二段177號
TEL:(02)2809-7979 FAX:(02)2809-7676

台中辦事處
台中市408公益路二段51號10樓A室
TEL:(04)2328-2818 FAX:(04)2320-5438

高雄辦事處
高雄市802苓雅區四維三路6號16樓A室
TEL:(07)535-7979 FAX:(07)535-7676

處方前請參閱詳細處方說明 警語、注意事項 詳細處方資料備索

PP-PVC-TWN-0002-201710