

**嘉喜®**  
**[九價人類乳突病毒(第6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58型)基因重組疫苗]**

**GARDASIL® 9 [Human Papillomavirus 9-valent Vaccine, Recombinant]**

**病人接種須知**

114.06.06

衛部菌疫輸字第001001號

本藥須由醫師處方使用

接種GARDASIL9疫苗之前，請詳閱本須知。您或您的孩子(接種GARDASIL 9的人)將須根據您的年紀接種2劑或3劑疫苗。每次接種前都請務必詳閱本須知。本須知並不能取代您與您的健康照護專業人員間關於GARDASIL®9疫苗的討論。



**GARDASIL 9是什麼?**

GARDASIL 9是一種為9至45歲之女孩及女性、男孩及男性施打的疫苗(注射劑)，可以幫助預防由某些型別之人類乳突病毒(HPV)所引起的疾病。

**GARDASIL 9可以幫助預防哪些疾病?**

GARDASIL 9 適用於9至45歲的人施打，使其產生主動免疫反應，以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變：

- 由第16, 18, 31, 33, 45, 52及58型HPV所引起的子宮頸、外陰、陰道、肛門與某些頭部及頸部(例如咽喉及後口腔)的癌症。
- 由第6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52及58型HPV所引起的子宮頸、外陰、陰道及肛門部位的癌前病變。
- 由第6及11型HPV所引起的生殖器疣。

這些疾病有許多導因。在大多數的情況下，這些疾病都是由9種型別的HPV所引起的：HPV第6、11、16、18、31、33、45、52及58型。GARDASIL 9只能預防由這9種型別的HPV所引起的上述疾病(詳參適應症)。

接種GARDASIL 9並不會使人感染HPV或發生任何這些疾病。

**我應該要瞭解哪些關於GARDASIL 9的重要資訊?**

GARDASIL 9:

- 並不能取代由健康照護者所建議之子宮頸癌、外陰癌，陰道癌，肛門癌和某些頭頸癌(例如咽喉癌和後口腔的癌症)篩檢的必要性；女性仍應定期接受子宮頸癌篩檢。
- 並不能使接種GARDASIL 9的人免於罹患其他型別之HPV、其他病毒或細菌所引起的疾病。
- 並不能治療HPV感染。
- 若您已感染某些型別的HPV，再接種本疫苗，本疫苗無法預防您發生這些已感染型別所引起的疾病。

GARDASIL 9可能並無法充分保護每一個接種本疫苗的人。

**哪些人不可接種GARDASIL 9?**

任何曾發生下列過敏反應的人：

- 對先前施打的GARDASIL 9過敏
- 對先前施打的GARDASIL<sup>®</sup>過敏
- 對酵母菌過敏(嚴重過敏反應)
- 對非晶形羥基磷酸鋁硫酸鹽過敏
- 對聚山梨醇酯80過敏

在接種GARDASIL 9之前，我應該告訴健康照護專業人員哪些訊息？

請告訴健康照護專業人員您或您的孩子(接種GARDASIL 9的人)是否：

- 懷孕或準備懷孕。
- 有免疫功能方面的問題，如感染HIV或患有癌症。
- 正在使用會影響免疫系統的藥物。
- 發燒超過37.8°C (100°F)。
- 曾對先前施打的GARDASIL 9或GARDASIL產生過敏反應。
- 正在使用任何藥物，包括指示用藥及成藥。
- 有出血性問題且不能在手臂上注射者。

在懷孕期間不應接種GARDASIL 9。如果您計畫懷孕或已懷孕，應等到懷孕結束再完成疫苗接種。

在超過1,000例懷孕案例中，其流產或發生重大出生缺陷的機會在已懷孕或在接種GARDASIL 9後懷孕的女性並沒有較高。

健康照護專業人員會協助判斷您或您的孩子是否可以接種本疫苗。

**GARDASIL 9的接種方式為何？**

GARDASIL 9是一種注射劑，通常都是施打於手臂肌肉。您可能需要接種2~3劑。

年紀	接種方案	接種時間
9 至 14 歲	2 劑*	第一劑: 於您與您的醫師或健康照護專業人員所選定的日子施打 第二劑: 於施打第一劑後 6 至 12 個月之間施打
	或 3 劑**	第一劑: 於您與您的醫師或健康照護專業人員所選定的日子施打 第二劑: 於施打第一劑的 2 個月後施打 第三劑: 於施打第一劑 6 個月後施打
15 至 45 歲	3 劑	第一劑: 於您與您的醫師或健康照護專業人員所選定的日子施打 第二劑: 於施打第一劑的 2 個月後施打 第三劑: 於施打第一劑 6 個月後施打

\*若第二劑施打時間距離第一劑小於5個月，您會需要接種第三劑，第三劑的施打時間需於距離第二劑至少4個月。

\*\*您的醫師會決定是否須以3劑接種方案取代2劑接種方案。

請確保您和您的孩子依您的健康照護專業人員建議的完整劑次接種GARDASIL 9，如此才能讓您或您的孩子獲得GARDASIL 9的完整效益。如果接種GARDASIL 9的人漏打一劑疫苗，請告訴醫師或健康照護專業人員。您的醫師或健康照護專業人員會決定何時施打漏掉的劑次。

請務必遵照您的醫師或健康照護專業人員的指示，回診施打後續的劑次。

施打HPV疫苗之後可能會發生暈厥的現象。暈厥的人有時會因而跌倒受傷。因此，健康照護專業人員可能會要求

接種GARDASIL 9的人在施打疫苗後坐下或躺下15分鐘。有些暈厥的人可能會出現顫抖或身體僵硬的反應。

接種GARDASIL 9的人可能須要接受健康照護專業人員的治療。

### 如果我已經接種過GARDASIL，我可以接種GARDASIL 9嗎？

如果您已經接種過GARDASIL，請和您的健康照護專業人員討論，確認您是否適合接種GARDASIL 9。

### 我可以同時施打GARDASIL 9和其他的疫苗嗎？

GARDASIL 9可以和下列疫苗同時施打：

- Menactra [四價腦膜炎雙球菌(A、C、Y及W-135型)多醣體白喉類毒素結合疫苗]
- Adacel [吸附性破傷風類毒素、減量白喉類毒素、非細胞型百日咳混合疫苗(Tdap)]

### GARDASIL 9有哪些可能的副作用？

GARDASIL 9最常見的副作用包括：

- 注射部位疼痛、腫脹、發紅、發癢、瘀青、出血、以及出現硬塊
- 頭痛
- 發燒
- 噁心
- 暈眩
- 疲倦
- 腹瀉
- 腹痛
- 喉嚨痛

研究顯示，將GARDASIL 9與其他疫苗，例如Menactra及/或 Adacel同時施打時，注射部位腫脹的病例有較多的現象。

如果您出現下列任何問題，請告訴健康照護專業人員，因為這些可能是過敏反應的徵兆：

- 呼吸困難
- 氣喘(支氣管痙攣)
- 蕁麻疹
- 皮疹

與其他疫苗一樣，GARDASIL 9在一般使用下，有其他的副作用被通報如下。GARDASIL在一般使用期間，被通報的副作用亦如下所示。因為疫苗的組成相似，GARDASIL被通報的副作用可能與GARDASIL 9有關。


### GARDASIL 9

- 暈厥 (有時伴有類癲癇運動)
- 嘔吐
- 注射部位出現腫塊(結節)

另外，下列副作用也在GARDASIL的一般使用中觀察到

- 腺體腫脹(頸部、腋窩或腹股溝)
- 關節疼痛
- 異常疲倦、虛弱或意識混亂
- 發冷
- 全身不適
- 腿部疼痛
- 呼吸短促
- 胸痛
- 肌肉疼痛
- 肌肉虛弱
- 癲癇發作
- 劇烈胃痛
- 較平常容易出血或瘀傷
- 皮膚感染

114.06.06



如果您出現任何對您造成困擾的症狀，應立即與您的健康照護專業人員聯絡。

如果您需要更完整的副作用清單，請洽詢健康照護專業人員。

如果您有副作用方面的問題，請向您的健康照護專業人員諮詢。

GARDASIL 9用於孕婦的安全性尚未證實。

### **GARDASIL 9中含有哪些成分?**

GARDASIL 9含有：

- HPV第6、11、16、18、31、33、45、52及58型的蛋白成分
- 非晶形羧基磷酸鋁硫酸鹽
- 酵母蛋白
- 氯化鈉
- L-組胺酸
- 聚山梨醇酯80
- 硼酸鈉
- 水

本須知乃是扼要說明GARDASIL 9的相關資訊。

若要瞭解更多的GARDASIL 9相關資訊，請洽詢健康照護專業人員。