

永骨信注射液5毫克/100毫升

YungClasta 5mg/100mL Solution for Infusion

衛部藥製字 第 061816 號

限由醫師使用

版本日期 2025-07-01

14 病人使用須知

含雙磷酸鹽類成分藥品

永骨信注射液之「病人用藥安全指引」

開始使用永骨信注射液前，請先詳細閱讀此用藥安全指引。如果有任何問題，請詢問您的醫師或藥師，此用藥安全指引並不能取代醫師對您的病情或治療所提出的專業諮詢與建議，用藥期間請務必依照醫師安排，定期回診。

在使用永骨信注射液期間，請保持好個人口腔衛生，並定期至牙科門診追蹤。若需要拔牙、植牙等侵入性之相關手術，請先告知牙醫師您正在使用雙磷酸鹽類藥物，並經醫師評估後始可施行。

1. 藥品中英文商品名：

永骨信注射液 5毫克/100毫升(YungClasta 5mg/100mL Solution for Infusion · Zoledronic Acid Monohydrate)

2. 「關於永骨信注射液您必須了解的資訊」：

(1) 本藥品屬於雙磷酸鹽類藥物，可用於「治療骨佩吉特氏病(Paget's disease of bone)」、「治療停經後婦女的骨質疏鬆症，以降低發生髌關節、脊椎與非脊椎性骨折的機率，並增加骨密度」、「男性骨質疏鬆症之治療，以增加骨密度」、「適用於治療及預防男性與女性因類固醇引起之骨質疏鬆症；這些病人為剛開始使用或持續使用每日劑量相當於7.5mg prednisolone或更高劑量的全身性類固醇，且預期將持續使用類固醇至少12個月者」、「預防停經後婦女的骨質疏鬆症」。

(2) 本藥品須由醫師處方使用，病人不可自行購買。

(3) 長期使用本藥品期間，若您發現下列疑似症狀時，請立即諮詢您的醫師：

- 持續感覺口腔牙齦疼痛、腫脹、化膿、唇或顏面麻木感、牙齒鬆動或脫落、齒槽骨暴露、牙齒傷口無法癒合等症狀，您可能有顎骨壞死的風險。
- 持續感覺到大腿、鼠蹊部或髌部疼痛，您可能有非典型大腿骨骨折的風險。

(4) 應請定期回診，讓醫師評估藥品療效與需求性。

(5) 本藥品用於兒童之安全性及療效未知，無特殊臨床需求或醫師指示，不建議用於兒童。

(6) 不宜使用本藥品的情形(須配合專業臨床判斷)：

- 血鈣過低。
- 對永骨信注射液或其他成分過敏。完整成分請參閱本藥品說明書(仿單)。
- 腎功能嚴重不全。

3. 使用永骨信注射液同時已了解以下事項：

(1) 已經由醫師確認我的口腔狀況，包括無明顯牙齦流血、疼痛或發炎等狀況。

(2) 如有下列情形會主動告知您的醫師：

- 即將或正進行牙科手術、拔牙等侵入性牙科治療。
- 嘴巴或牙齒有任何問題。
- 曾服用過或正在服用雙磷酸鹽類或其他抗骨質疏鬆症之藥品。
- 目前正在服用類固醇藥品或有糖尿病。
- 吸菸。
- 曾經罹患過癌症。
- 懷孕、哺乳。

4. 使用永骨信注射液期間應注意事項：

◎ 每天保持餐後及睡前刷牙習慣以維持口腔清潔，並經常漱口以保持口腔濕潤。

◎ 每天用鏡子檢查口腔牙齦，若出現牙齦疼痛、腫脹、化膿、唇或顏面麻木感、牙齒鬆動或脫落、齒槽骨暴露、牙齒傷口無法癒合等症狀時，應告知您的醫師或牙醫師。

◎ 定期至牙科診所接受口腔檢查，若需要進行拔牙、植牙等相關侵入性手術，主動告知牙醫師目前您正在使用雙磷酸鹽類成分藥品。

◎ 若持續出現任何大腿、髖部或鼠蹊部疼痛的情形時，應告知您的醫師。

5. 本病人用藥安全指引僅提供最最重要之藥品安全訊息，更多詳細內容請參閱盒內藥品說明書(仿單)，或諮詢您的醫師或藥師。

6. 如有任何藥品安全方面的疑慮請諮詢本公司，諮詢專線：【0800-012679】。如果您懷疑發生了與藥品相關的不良反應，請盡快諮詢您的醫師或藥師，或通報至全國藥物不良反應通報中心(02-2396-0100；

<https://adr.fda.gov.tw/home>)。

版本日期：February 26, 2025