

Entresto 藥物治療轉換對照表

現行用藥	轉換至 Entresto		
	步驟一	步驟二	步驟三
目前接受 ACEI 治療患者	中斷ACEI 治療36小時	患者目前使用 中-高劑量ACEi (如: enalapril > 10mg/天), 建議起始治療使用 Entresto 100mg BID ^{2,3}	依據患者耐受情況於 2 至 4 週後加倍 ENTRESTO® 劑量, 達到200mg BID的 目標維持劑量 ⁴
		患者目前使用 低劑量ACEi (如: enalapril ≤ 10mg/天), 建議起始治療使用 Entresto 50mg BID ^{2,3}	
目前接受 ARB 治療患者	患者目前使用 中-高劑量ARB (如: valsartan > 160mg/天), 建議起始治療使用 Entresto 100mg BID ^{2,3}		
	患者目前使用 低劑量ARB (如: valsartan ≤ 160mg/天), 建議起始治療使用 Entresto 50mg BID ^{2,3}		
PARADIGM-HF 主要患者類型 ¹ :	NYHA Fc 2-3, Ejection Fraction ≤ 35% 穩定使用ACEi或ARB 以及 Beta blocker SBP ≥ 100mmHg eGFR ≥ 30mL/min/1.73m ² , K ⁺ ≤ 5.2mmol/L		

ENTRESTO® 100 mg Film-Coated Tablets 衛部藥輸字第026672 號
 ENTRESTO® 200 mg Film-Coated Tablets 衛部藥輸字第026671 號

適應症: ENTRESTO 核准用於治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會 [NYHA] 第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者; 減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。
說明: ENTRESTO 可以和其他心臟衰竭療法併用; 用於取代血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEi) 或血管收縮素受體拮抗劑 (ARB)。

用法用量: ENTRESTO 的建議起始劑量為每日兩次100 毫克; 依據患者耐受情況於2至4週後加倍ENTRESTO劑量; 達到每日兩次200毫克的目標維持劑量。

禁忌症: 對藥品中任何成份過敏的患者; 過去使用 ACEi 或 ARB 治療曾有相關血管性水腫病史的患者; 禁止在使用 ACEi 的36 小時內轉換至本藥物; 或在使用本藥物的36 小時內轉換至ACEi; 或同時併用alisikiren 的糖尿病患者

藥物安全性資料: Entresto 能降低血壓; 也可能造成有症狀的低血壓。腎素-血管收縮素系統活化的患者; 例如細胞外液體積減少或體分流失(如接受高劑量利尿劑治療的患者), 其風險更高。

PARADIGM-HF試驗的雙盲期內, 18% 接受 Entresto 治療的患者及12% 接受enalapril 治療的患者曾發生低血壓之不良事件; 兩治療組中約有 1.5% 患者曾發生低血壓之嚴重不良事件。

使用Entresto前應先矯治細胞外液體積減少或體分流失, 或採用較低的起始劑量。如果發生低血壓, 應考慮調整利尿劑、併用降血壓藥物、其他低血壓成因(例如血容量不足)藥物的劑量。

若採取此類措施後低血壓仍持續, 應降低 Entresto劑量或暫時停用Entresto。通常不需要永久停用治療。

Reference: 1. McMurray et al. N Engl J Med 2014;371:993-1004 2. Senni et al. Eur J Heart Fail 2015;17(Suppl 1):393-4 3. Senni et al. Eur J Heart Fail 2015;17(Suppl 1):265-6 4. Entresto 衛生福利部核准仿單