

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：PAXLOVID

藥品成分：Ritonavir 100mg/tab + Nirmatrelvir 150mg/tab

● 為什麼要服用這個藥品？



適用於發病 5 天內、具重症風險因子之成人與兒童病人(12 歲以上且體重至少 40 公斤)的輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺病)確診者，避免高風險族群由無症狀或輕症進一步惡化至重症。

● 如何服用？

正常劑量：1 顆 Ritonavir 100mg 與 2 顆 Nirmatrelvir 150mg，
3 顆錠劑一同服用，每天兩次，持續 5 天。

中度腎功能不全調整劑量：1 顆 Ritonavir 100mg 與 1 顆 Nirmatrelvir 150mg，
2 顆錠劑一同服用，每天兩次，持續 5 天。

**服藥指示：每片錠劑為一日份藥量，每次會拿到 5 片錠劑，
黃色部分為早晨服用，藍色部分為晚上服用。**

說明	正常劑量	<u>中度</u> 腎功能不良調整劑量
圖示		

PAXLOVID (Nirmatrelvir 和 ritonavir 錠劑) 可與食物併服或不併服。
錠劑需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。若需管灌請查詢管灌措施。

如果病人在預計服藥的 8 小時內漏服一劑 PAXLOVID，病人應儘快服藥並恢復正常的給藥時程。如果病人漏服一劑藥物的時間超過 8 小時，則不應服用漏服的劑量，而應按照常規用藥時間服用下一劑藥物。

● 服用此藥時，應注意甚麼？

1. 本藥品與其他藥物可能有交互作用，如有在服用其他藥物，務必告知醫師。
2. 懷孕婦女請諮詢醫師或藥師
3. 本藥含有乳糖

● 有副作用嗎？該如何處理？

使用此藥後可能會引起味覺改變、腹瀉、高血壓、肌肉疼痛，但請您不要自行停藥，應告訴醫生。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726292