

# 國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：**PAXLOVID** **重度腎功能不全劑量調整**

藥品成分：**Ritonavir 100mg/tab + Nirmatrelvir 150mg/tab**

## ● 為什麼要服用這個藥品？

適用於發病 5 天內、具重症風險因子之成人與兒童病人(12 歲以上且體重至少 40 公斤)的輕度至中度新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺病)確診者，避免高風險族群由無症狀或輕症進一步惡化至重症。

## ● 如何服用？



重度腎功能不全調整劑量：

**第 1 天**

1 顆 Ritonavir 100mg 與 2 顆 Nirmatrelvir 150mg，  
3 顆錠劑一同服用，每日服用一次。

**第 2 天至第 5 天**

1 顆 Ritonavir 100mg 與 1 顆 Nirmatrelvir 150mg，  
2 顆錠劑一同服用，每日服用一次。

說明	第 1 天	第 2 至第 5 天
	2 顆 Nirmatrelvir 1 顆 Ritonavir	1 顆 Nirmatrelvir 1 顆 Ritonavir
圖示		

錠劑需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。若需管灌請參照管灌泡製方式。  
固定每天同一時間使用，在血液透析的日子，應在血液透析後使用

PAXLOVID 可與食物併服或不併服。如果病人在預計服藥的 8 小時內漏服一劑 PAXLOVID，病人應儘快服藥並恢復正常的給藥時程。如果病人漏服一劑藥物的時間超過 8 小時，則不應服用漏服的劑量，而應按照常規用藥時間服用下一劑藥物。

## ● 服用此藥時，應注意甚麼？

1. 本藥品與其他藥物可能有交互作用，如有在服用其他藥物，務必告知醫師。
2. 懷孕婦女請諮詢醫師或藥師
3. 本藥品含有乳糖

## ● 有副作用嗎？該如何處理？

使用此藥後可能會引起味覺改變、腹瀉、高血壓、肌肉疼痛，但請您不要自行停藥，應告訴醫生。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向  
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務  
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726292