

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：必利勁 Priligy®

藥品成分： DAPOXETINE



● 有什麼藥效？為什麼要服用？

Priligy 用於治療年齡 18-64 歲且符合下列所有條件的早發性射精的男性

1. 陰道內射精潛伏時間(IELT) 短於兩分鐘
2. 難以控制射精，在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激，發生持續或復發性射精
3. 因為早發性射精而導致病人明顯沮喪

● 如何服用？

- 於計畫性行為前一至三小時服用
- 服用時至少搭配 1 整杯水
- 將整顆藥錠吞下服用
- 每 24 小時內最多僅可服用 1 次
- 必利勁 Priligy® 可搭配(但非必要)食物服用

● 服用本藥時，應注意甚麼？

此藥物可能會引起暈眩或頭昏眼花。服用後，請避免駕駛或操作具危險性的器械；

本藥品避免與酒精類飲料共用；

服用後，請盡量待在舒適安全的處所，例如：家中

● 有什麼情況者不適合服用？

有心臟問題者，例如：心臟衰竭或心律不整；有嚴重的肝臟或腎臟問題者；憂鬱症或其他精神狀態異常者不適合服用。腎功能不佳劑量調整:建議用於輕度至中度腎功能不全的病人，應謹慎使用。重度腎功能不全病人不建議使用 PRILIGY; 肝功能不佳劑量調整:中度以及重度肝功能不全病人(Child-Pugh 分類分別為 B 與 C)則禁止使用 PRILIGY。

正在接受下列藥物治療，如：MAOI(單胺氧化酵素抑制劑)或其他憂鬱症藥物；thioridazine(用於治療精神分裂症)；治療黴菌感染的某些藥物；治療人類免疫不全病毒(HIV)的某些藥物；治療感染的某些抗生素；治療躁鬱症的 lithium；幫助睡眠的 tryptophan；金絲桃(一種草藥)；治療嚴重疼痛問題的 tramadol；治療偏頭痛的藥物等。不適合使用。

● 若忘了服藥，該怎麼辦？

下次計畫性行為前一到三小時前服用即可。一日最多僅可服用一次。

● 藥品該如何儲存？

請收納於攝氏 25°C 以下，乾燥陰涼處。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向

醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務

國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496730