

"生春" 伏痛貼布 (氟白普洛芬)
ANTIPAIN PATCH "SHENG CHUN" (FLURBIPROFEN)

【成分】Formula

每片中含有：

Each patch 12g(10.5cm x 14.0cm) contains：

Flurbiprofen 40.0mg

【適應症】

變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

Application：

Deformans arthritis、Periarthritis of the shoulder、Tenonitis、Tenosynovitis、Peritenonitis、Carpitis、Muscle pains such as Bruises, Sprains, and Strains.

【用法用量】

患部清洗乾淨，每日貼二片。(本藥須由醫師處方使用)

Usage & Dosage：

After clean, two pieces a day.

104.2.-4

【注意事項】

1. 禁忌：

- a. 對本劑或其他之 Flurbiprofen 製劑，曾有過敏之患者。
- b. 曾有 Aspirin 喘息，或曾對非類固醇性消炎鎮痛劑會產生誘發性喘息發作之患者。

2. 重要的基本注意事項：

- a. 以消炎鎮痛劑來治療時，不是原因療法，而只是對症療法時，須留意。
- b. 由於對皮膚之感染症，無抗菌效果，因此對於伴有感染之炎症，使用時要併用抗菌劑或抗真菌劑，而且要十分慎重投藥及觀察。
- c. 對於慢性疾患(如變形性關節症等)之治療應考慮使用藥物療法以外之療法，而且又要仔細觀察患者之狀態，留意副作用之產生。

3. 慎重投藥：

有支氣管喘息之患者〔支氣管喘息患者之中，對 Aspirin 會誘發喘息發作之患者〕

4. 副作用：

較嚴重之副作用——會誘發喘息發作(Aspirin 喘息)，由於會誘發喘息之發作(發作原因不明)，因此發現有乾性 La 音，喘鳴，呼吸困難感等之初期症狀時，須停止用藥。本劑貼後數小時曾有發現誘發喘息發作之情形。

副作用之頻度	0.1~5%未滿	0.1%未滿
皮膚	搔癢、發赤、發疹	斑疹、刺痛熱辣感

5. 對高齡者之使用：

對高齡者所貼付部位之皮膚狀態要加以注意，須慎重使用。

6. 對孕婦、產婦、哺乳中之婦女等之使用：

孕婦或可能懷孕之婦人，判斷使用上之有益性大於危險性之情況下才投藥。對於孕婦要確定其安全性無慮時才投藥。

7. 小兒等之使用：

對於小兒要確定安全性無慮時才使用。

8. 使用上之注意事項：

- a. 勿使用於損傷皮膚，及勿貼於黏膜上。
- b. 勿使用於濕疹或發疹之部位。
- c. 擦去汗水後使用。

9. 室溫、遮光保存。

【許可證字號】

衛署藥製字第 045599 G-7962 號

【包裝】

4 片入/包 x100 包/箱

Package：


4 pieces/foil bag x100 packs/CTN

儲藏於 25℃ 以下



V.201409


委託者：生春堂製藥工業股份有限公司
SHENG CHUN TANG PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
台灣台南市永康區王行里興工路6號
No.6, Singong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)
製造廠：立康生物科技股份有限公司工廠
LI KANG BIOTECHNICAL CO., LTD.
台灣台南市永康區王行里環工路29號
No.29, Huangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)



外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“生春”伏痛貼布(氟白普洛芬) Antipain Patch “Sheng Chun”(Flurbiprofen)	申請廠商	生春堂製藥工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字第	G-7962 045599	號

104.2.-4








外用

PIC/S GMP 優良藥品



“生春”伏痛貼布 (氟白普洛芬)

ANTIPAIN PATCH "SHENG CHUN"(Flurbiprofen)

消炎·鎮痛·水性貼布

《4片裝》 健保代碼AC45599345



4 713248 404047

