

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單

藥品名稱：備勞喘定量噴霧劑 Berotec N

藥品成分：Fenoterol HBR



有什麼藥效？ 使用時機？

本藥可預防和治療支氣管痙攣疾患

➤ 急性氣喘發作、或其他伴隨有支氣管痙攣之可逆性呼吸道狹窄的症狀。

大多數患者吸入一個定劑量及可緩解症狀，若吸入 5 分鐘後沒有明顯改善，可投與第二個定劑量。每天最多不得投予超過 8 個定劑量。

➤ 預防運動引發的氣喘。

運動前給 1 至 2 個定劑量，每天不得超過 8 個定劑量。

使用方法？

首次使用定量噴霧器前須先移去護蓋，並按活塞兩次。



使用本藥時，應注意甚麼？

- 1.有肥大性阻塞性心肌病變的、心跳過速、對 fenoterol hydrobromide 或本藥品及其任一賦形劑過敏之病患。不可使用。
- 2.若發生急性呼吸困難或呼吸困難極速惡化時應立即就醫。

如何查詢剩餘藥量？


容器不透明，因此無法看出內容物何時被用完。此噴霧劑可提供 200 個定劑量，當 200 個定劑量都被使用後，可能仍有少量液體留存，但因無法確定每個劑量都含有足夠的治療含量，請勿再使用。

如何清潔？

1. Berotec N 建議每週至少清潔一次，將噴霧劑之塑膠口含器與金屬藥罐分開。
2. 用清水清洗塑膠口含器，至無任何藥物堆積或看不到任何灰塵為止。(圖一)
3. 清潔後將塑膠口含器上的水分甩乾，使其陰乾。且勿使用任何加熱系統!
4. 待塑膠口含器乾燥後，即可重新裝上藥罐與防塵蓋。(圖二)



(圖一)




(圖二)

圖片來源：百靈佳殷格翰

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726292

氣喘病患的自我照護

- 呼吸道傳染病流行期間，盡量減少出入公共場所，並戴口罩。
- 天氣變化大季節，注意保暖。
- 避免接觸刺激性味道，如：二手煙、香水、蚊香、芳香劑等有刺激氣味物質，減少呼吸道刺激。
- 定期清掃環境，並且每兩星期以55°C的溫熱水清洗家中寢具，避免塵蟎孳生。
- 盡量不要飼養寵物。若有飼養也需定期清洗並區隔生活空間。
- 寢具不要使用羽毛，棉絮，草蓆，可使用尼龍被，太空被或蠶絲被。
- 維持室內清潔，避免黴菌滋生。可使用除溼機，使室內濕度維持在50%~60%，並定期更換濾網。
- 於開花季節，避免外出。緊閉門窗，避免接觸花粉過敏原，可使用空氣清淨器。
- 運動前要做足夠暖身運動，運動後也要做緩和運動並調整呼吸。
- 避免情緒過度激動、緊張，保持愉悅心情。



(感謝台灣氣喘衛教學會審校本衛教內容)



備勞喘® 100微公克定量噴霧液

Berotec® N 100 mcg/puff Metered Aerosol

(Fenoterol hydrobromide)



使用方法：

首次使用定量噴霧器前須先移去護蓋並按活塞兩次。

1 移去護蓋。

(若超過三天未使用定量噴霧液裝置，在使用時需先按活塞一次)




2 深深呼一口氣，並以雙唇緊閉含緊口含器。

按壓容器的底部，並同時深深地吸氣，接著憋氣數秒鐘。



3 自口中移去口含器後，慢慢地呼氣。

(如需吸入第二個劑量，請依步驟2至3重複操作)




4 使用後蓋好吸入器護蓋。




清潔注意事項：

清洗吸入器

1. 清潔時，應先取下防塵蓋並移去吸入器中的藥罐。
 2. 然後用溫水清洗吸入器，直到無任何藥物堆積且(或)看不到任何灰塵為止。(圖一)
 3. 清潔之後，將吸入器甩一甩，然後讓其陰乾，切勿使用任何加熱系統。
- 待口含器乾燥之後，即可重新裝上藥罐與防塵蓋。(圖二)



(圖一)



(圖二)

備勞喘® 定量噴霧液

Berotec® N (Fenoterol hydrobromide)

針對下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：
支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、
氣腫以及伴隨支氣管痙攣之肺支氣管障礙。

