



得舒康乳膏0.25%

Desosone Cream 0.25%

衛署藥製字 第 048358 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-09-29

版次 3

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gram contains :**Desoximetasone.....2.5 mg**

1.2 賦形劑

White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chlorocresol、Cetostearyl alcohol
「Nafol 1618H」、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Dimethicone、Glycerin、Ethoxydiglycol
、Purified water

1.3 劑型

乳膏劑

1.4 藥品外觀

乳白色乳膏

2 適應症

濕疹、牛皮癬、燒傷、曬傷、昆蟲咬傷等皮膚感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

- 3.1.1 每天於皮膚患者塗敷少數的本乳膏一次或二次，如果必要時可使用三次。如果可能，應輕柔按摩。皮膚傷口漸癒可減少用藥次數，例如由每天二次減少為每天一次。
- 3.1.2 應避免使用於廣大範圍(超過體表約10%)及長期治療(超過約4週)，因可能會導致全身性腎上腺皮質素作用。並且，長期治療可能會導致更多明顯的局部作用。
- 3.1.3 劑量錯誤：短時間的劑量誤差(使用於過大範圍或使用過量，用藥次數過多，或少一次用藥)不會有不良影響。若有此情形，請洽詢醫師。
- 3.1.4 用藥過量：由於吸收大量desoximetasone，可能會發生全身性腎上腺皮質素作用，特別是使用本品於大範圍皮膚部位或長期使用情況下。於此情形下，應減少用量或完全停止治療。若可能產生腎上腺抑制，應考慮逐漸停止治療。

4 禁忌

- 本乳膏不可使用於眼部。
- 對desoximetasone，其它類(如：betamethasone)的腎上腺皮質素，或本品之賦形劑過敏者不可使用本品。
- 本品含有石蠟，可能導致橡膠保險套滲漏或破裂。因此，應避免本品與橡膠保險套碰觸，因為

保險套的保護作用可能會因而喪失。

- 因接種疫苗導致皮膚反應的患者，或有結核病、梅毒、病毒感染(如水痘)、酒渣鼻、皮膚炎等的皮膚症狀者不可使用包括本品在內的局部用腎上腺皮質素，因可能會使病情惡化。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 5.1.1 嬰兒及6歲以下兒童於絕對必要情況下才可使用本品，因為於此種年齡層之幼童因腎上腺皮質素吸收而導致全身性作用(如成長遲緩)的危險性增加。若無法避免必須使用本品，則應使用最小之有效治療劑量。
- 5.1.2 於成人某些特例中可能需使用本品於大範圍的皮膚患部，此種情況下，尤其是長期使用時，應考慮腎上腺抑制的可能性。如果發生此種現象，可能需要逐漸停用本品。
- 5.1.3 於治療期間，如果小劑量的局部用腎上腺皮質素(包括本乳膏)重覆接觸結合膜囊可能會導致眼內壓增加。因此，若須長期使用本品於眼睛周圍應先仔細評估其利弊，並應於醫療人員監測下使用本品。
- 5.1.4 局部腎上腺皮質素如本乳膏於細菌或黴菌皮膚感染時，只可作為症狀治療，應併用抗菌或抗黴菌治療。
- 5.1.5 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

為避免desoximetasone被吸收的危險，於懷孕及授乳期不可廣範圍地使用本品。但如果必須使用本品時，可使用於小範圍之皮膚患部。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

- 8.1.1 於使用本品治療的皮膚部位可能有毛囊炎、多毛、痤瘡、色素過多或過少、毛細管擴張、皮脹紋、皮膚萎縮、皮膚浸軟等症狀。尤其於長期用藥及使用密閉式敷料情況下較可能發生。
- 8.1.2 只有少數個例使用本品會導致皮膚局部過敏反應。
- 8.1.3 若使用本品於廣大範圍，長期使用，或使用密閉式敷料可能會產生全身性腎上腺皮質素作用。
- 8.1.4 如果發生任何上述副作用，或其它非預期作用或變化(如皮膚變化)請向醫師諮詢。
- 8.1.5 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱

111.09.29

和刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Desoximetasone係專供局部使用之強效腎上腺皮質素，具有消炎、抗過敏、抗滲出、抗增生、及抗搔癢作用。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請於25°C以下陰涼處保存。請置於孩童無法觸及之處。

製造廠

人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路3號

藥商

人人化學製藥股份有限公司 桃園市中壢區南園二路3號