

# 吩坦尼穿皮貼片用藥指導單

Fentanyl Transdermal Patch

Durogesic Transdermal Patch



## 使用前準備

- 於上軀幹或上臂找一塊無刺激及無放射線照射的平整皮膚表面。
- 對年紀較小的**兒童**而言，**上背部**為較理想的部位，因兒童移除貼片的可能性最低。
- 使用貼片前，要將貼藥部位(最好是無毛髮生長的區域)的**毛髮剪除**(勿用刮除方式剃除)。
- 如於使用貼片前，欲清潔吩坦尼穿皮貼片劑投與部位的皮膚，用**清水潔淨**即可。  
不能使用肥皂、油、乳液或任一其它會刺激皮膚或改變膚質的物質。
- 貼上貼片之前，應使**皮膚完全乾燥**。
- 務必填寫**使用紀錄表**(貼上及撕下的日期時間)並簽名，並於領藥時與廢片一並繳回。

## 使用方法

1. 從密封包裝內取出吩坦尼穿皮貼片劑。  
(取出後應立即使用)



2. 先將貼片保護層移除。



3. 再將貼片貼上皮膚，並用手掌用力緊壓 **30 秒**，確保整片貼片完全與皮膚接觸，尤其要注意角落部位應緊密黏貼，避免碰到貼片的黏著層。



4. 貼上後，以清水洗手。

## 使用後處置

- 使用過的 Fentanyl 穿皮貼片劑，應**對黏後放入原包裝袋，繳回（醫院）藥局銷毀。**
- 如有**未曾使用剩下之貼片應退還（醫院）藥局。**
- 貼上貼片後或移除貼片後只能用水洗手。

## 警語及注意事項

- Fentanyl 貼片劑無論使用前後，均應放置於兒童無法觸及處。
- 此貼片劑**不能分割、切開或以任何方式破壞**，因為這可能會破壞緩釋劑型。
- 此貼片劑可連續貼足 72 小時。新的貼片要貼在與前一片不同的位置。同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新貼片。
- 使用此貼片的患者可正常沐浴，但不可泡熱水澡，也**不可讓貼片直接接觸熱源**（如：加熱墊、電毯、加熱水床、加熱燈、密集日光浴、熱水瓶、長時間的熱水浴、芬蘭蒸氣浴及熱循環水療。）
- Fentanyl **過量之症狀**主要為其藥理作用之增強，最嚴重的作用為**呼吸抑制**。  
**若有嗜睡、呼吸減少或困難，請立即通知醫護人員。**
- 因為藥品吸收時間，使用貼片不會立即止痛，第一次使用不可馬上停用原止痛藥，請依指示慢慢停用原止痛藥。
- 可能偶有噁心嘔吐、皮膚輕微紅疹等症狀，為正常之副作用，可用輔助藥物緩解，請告知醫護人員。
- 喝葡萄柚汁可能增加此藥在體內停留之濃度與時間，勿大量食用。

## 其他特殊族群

- 懷孕期間不能使用吩坦尼穿皮貼片劑，除非確實有必要。母親在懷孕期間長期使用吩坦尼穿皮貼片劑的新生嬰兒曾被報導有新生兒戒斷症狀。
- 研究發現此貼片成分會排泄到人體乳汁內且可能會對新生兒造成鎮靜/呼吸抑制。因此，哺乳婦女不建議使用吩坦尼穿皮貼片劑。
- 老年人有清除率(clearance)下降、半衰期延長且對藥品敏感度高於年輕患者的可能。老年人使用吩坦尼穿皮貼片劑時，應注意是否有 Fentanyl 中毒的徵兆，必要時可降低劑量。

圖片與參考資料來源：

“管制藥品局”吩坦尼穿皮貼片劑使用須知、“管制藥品廠”吩坦尼穿皮貼片劑仿單

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向

醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務

國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496730