

High-Xylmol Oint 樂癒痔軟膏用藥指導

藥品成分名：Lidocaine、Phenylephrine、Betamethasone

藥品作用方式：

Lidocaine	為局部麻醉劑，可輕緩外痔疼痛及肛門搔癢。
Phenylephrine	有末梢血管收縮作用可以抑制痔瘡出血。
Betamethasone	為皮質類固醇，具消炎作用，以消除痔瘡之腫脹。

藥品如何使用：

1. 給藥前後請洗淨雙手。
2. 外痔病症：清潔、擦乾肛門周圍，以適量藥膏直接塗抹於患部。
3. 內痔病症：可將所附軟管插在藥膏管口再插入肛門內，從下端輕輕擠壓藥膏後拿出使用後將軟管注入器取下，以溫水清洗、陰乾。

忘記用藥怎麼辦： 想起時應盡快補用，若已經接近下次用藥時間，則於下次用藥時間依正常劑量使用，不可同時使用兩倍劑量。

用藥期間有哪些注意事項： 儲存於 25°C 以下避光陰涼處。

可能的副作用及處理方式： 局部短暫刺激。


未使用/過期藥品的處理： 本品可直接丟入一般垃圾桶。

[塗藥到肛門外部]




取下蓋子，用清潔的手指取適量的軟膏直接塗抹至患處；或者先塗抹在藥用紗布上面，再黏貼到患處。


[注入肛門內]



取下蓋子，將軟膏從開口尖端擠出少量。



將管嘴注入肛門內。



擠壓塗藥器本體以慢慢地注入軟膏，在擠出軟膏時應同時緩慢將塗藥器本體拉出來。

本衛教單張並未包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢藥師或醫師
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處()