

國軍高雄總醫院藥劑科民眾用藥指導單



藥品名稱：Lidocaine patch 利多卡因貼片

藥品成分：Lidocaine

有什麼藥效？

用於緩解皰疹後神經痛(Post-herpetic Neuralgia)。使用部位僅限於未受損的皮膚。

如何使用？

1. 在使用貼片前後應洗淨雙手，避免接觸到眼睛。
2. 移除釋放封套(release liner)前，貼片可以剪刀剪為更小片。衣著可以覆蓋貼片使用的部位。
3. 使用於未受損的皮膚上，貼在傷口左右上下約略一個手掌外的距離。貼的距離在以不會撕裂傷口外圍為主。於 24 小時期間最多可以使用 3 片，使用一次不可超過 12 小時。

使用本藥時，應注意甚麼？

1. 在使用期間如果有刺痛或者灼熱感，請移除貼片，且至刺痛感消失，當併用其他有局部麻醉劑的產品時，必須考量所有合併使用藥物的吸收後才可使用。
2. 治療部位的皮膚可能會發生紅斑、水腫、瘀血、小水泡、變色、色素消退、灼熱感、搔癢、剝離或者是局部的異常知覺。這些反應一般說來是溫和而且暫時性的，且會在數分鐘到數小時內自然消失。無全身性副作用。
3. 使用後若有心悸，頭暈，短暫性視覺昏暗或其他心律不整之症狀，應立即撕下，並立刻就醫。

處理及丟棄

在觸摸 Lidocaine Patch 5%後應該要洗手，並避免眼睛接觸 Lidocaine Patch 5%。使用過後的貼片應該立即處置，以預防小孩或寵物有接觸的機會。

請勿將貼片存放於包裝袋外



沿著虛線剪開袋子。移除離形紙前可將貼片剪至需要之大小並將剩餘部分放置到孩童與寵物接觸不到的地方



使用前先撕起離形紙並迅速貼上



每次最多使用三片貼在患處。使用12小時後需停用12小時後再次使用。如有出現過敏反應請停止使用

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
國軍高雄總醫院 藥劑科 藥物諮詢專線：07-7496751 轉 726292