

“意欣”嘴有效 口內膏

Oralfix ORAL BASE

口腔組織受到創傷時，非常容易引起發炎、甚至潰瘍，應該要及時加以防治。本藥含抗消炎成分 **Triamcinolone acetonide**，故能抑制發炎症狀。另外，本藥所含的其他成分(賦形劑)能夠在使用部位形成保護層，避免受傷部位再受到刺激，也可以緩解痛的感覺。

【成分】有效成分及含量

Each Gm Contains :

Triamcinolone acetonide.....1mg

其他成分(賦形劑)： Propylparaben、Methylparaben、Carbomer-940、Sod Hydroxide、Polyethylene oxide、Purified Water

【用途(適應症)】短期緩解急慢性口腔黏膜破損。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

(一) 結核病、消化性潰瘍(例如：胃潰瘍)或糖尿病的人。

(二) 疑似有其他感染的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 有精神病的人。

(三) 高血壓、腎臟病的人，因本藥可能會引起浮腫以及血壓上升。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 使用本藥期間請多補充蛋白質。

(五) 糖尿病的人使用期間，應多注意血糖值。

(六) 使用本藥期間，可能會降低口腔組織的正常防禦功能，若口腔發生感染症狀可能會不容易被發現。

(七) 依照指示使用本藥時，只會有少量的藥品成分會被吸收，不會引起全身性反應。

(八) 如果長期使用本藥，可能會導致類似口服類固醇藥品的副作用：例如抑制腎上腺功能、糖以及蛋白質的代謝改變、或加重消化性潰瘍等，但是通常停藥後，副作用就會逐漸消失。

(九) 每次使用量依據患部大小而定，只要塗敷足夠的量，能黏附在傷口或潰瘍處形成薄膜覆蓋即可。

【用法用量】 每日 1 次，睡前適量塗布患處，如果症狀嚴重時可增至每日 2~3 次，飯後使用較佳。醫師藥師藥劑生指示藥品。。

【警 語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
口腔	刺激、過敏

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)7日後狀況沒有改善或更惡化。

【包 裝】 1000 公克以下鋁管裝、PE 塑膠瓶裝。.

【類 別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存方法】 儲存於室溫 25℃ 以下。

委託者：意欣國際有限公司

地 址：高雄市三民區懷安街 119 號

電 話：(07)386-7252

製造廠：皇佳化學製藥股份有限公司

地 址：高雄市鳥松區埔安街 1 號

電 話：(07)731-0537