

TRELEGY ELLIPTA

吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者
正確使用 TRELEGY ELLIPTA 吸入器

ELLIPTA 吸入劑操作步驟

想看TRELEGY ELLIPTA操作影片嗎？
請掃描右方QR code



中文版



英文版



印尼版



越南版



1 打開

扳開要聽到「喀」一聲，才有成功上藥



2 吸入

- A. 先向外吐一口氣，勿朝吸嘴吐氣。
- B. 將吸嘴放入嘴唇內，緩而長的**吸**一口氣。
- C. 吸氣完畢後自口中移去吸入器，緊閉雙唇
接著盡可能地閉氣。(至少閉氣3-4秒)



3 關上

- A. 使用完畢切記將吸入器蓋子**關**上
- B. 此藥物含有吸入型類固醇，用完請漱口

使用注意事項



⊗ 請勿重複開關



⊗ 注意嘴巴
不要遮住通氣口



⊗ 注意手指
不要遮住通氣口

- ⊗ 遵醫囑性以及吸入裝置操作的正確性對藥物的治療成效十分重要。
- ⊗ 提醒您，記得定期回醫院拿藥並與醫護人員確認自身吸入裝置操作是否正確。

TRELEGY ELLIPTA

吸入器使用說明

本說明書僅提供有被處方此藥品之患者
正確使用 TRELEGY ELLIPTA 吸入器



請您務必詳閱 TRELEGY ELLIPTA 包裝盒裡的仿單內使用操作說明，瞭解本藥物的重要資訊。
如果對藥物有任何問題，請隨時詢問醫師、護理師或藥師。

重要注意事項

- 此藥品無明顯氣味，不需要擔心沒有吸入藥物。
- 請勿搖晃吸入器，手指不要擋住通氣孔，也不要對著吸入器吹氣。
- 每一次使用後，劑量計數器上的數字會逐次減少。
- 如果聽到「喀擦」聲時，劑量計數器的數字沒有減少，就無法從吸入器吸入所需的劑量，此時請帶著吸入器尋求藥師協助。

英文產品名稱：TRELEGY ELLIPTA 92/55/22 mcg Inhalation Powder 衛部藥輸字第 027395 號

中文產品名稱：肺樂喜易利達 92/55/22 mcg 乾粉吸入劑

成分含量：乾粉吸入劑：遞送劑量 fluticasone furoate 92 mcg、umeclidinium 55 mcg 及 vilanterol 22 mcg。

適應症與用途：適用於已接受吸入性皮質類固醇與長效 β_2 作用劑合併治療，或已定期使用兩種吸入型長效支氣管擴張劑合併治療，而仍控制不佳的慢性阻塞性肺病(COPD)患者，以治療氣道阻塞。TRELEGY ELLIPTA 也適用於降低有惡化病史患者之 COPD 惡化。

用法用量：以每天吸入一次的方式投藥。對老年患者、腎功能不全患者或中度肝功能不全患者，不須調整劑量。

禁忌症、警語與不良反應：有嚴重乳蛋白過敏問題及已證實對 fluticasone furoate、umeclidinium、vilanterol 或任何賦形劑過敏者應禁止使用。

在使用含有 fluticasone furoate 成分之經口吸入用藥品治療，曾有發生白色念珠菌局部感染的報告。應注意是否可能發生肺炎。對有尿滯留問題的患者，如前列腺肥大或膀胱頸阻滯，使 Trelegy Ellipta 時應謹慎。LABA 可能會升高發生氣喘相關死亡的風險。Vilanterol 對某些患者可能會產生具臨床意義的心血管影響。當考慮將 TRELEGY 與長期使用的 ketoconazole 及其他的 CYP3A4 抑制劑合併投予時應謹慎。對患有痙攣性疾疾病或甲狀腺毒症的患者或對擬交感神經胺異常敏感的患者，使用 Trelegy Ellipta 時應謹慎。 β 腎上腺素作用劑類的藥物可能會發生低血鉀現象，也可能發生暫時性的高血糖。對病情正在快速惡化或發生可能危及生命之發作事件的 COPD 患者，不可開始使用 TRELEGY。投予 Trelegy Ellipta 之後可能會發生過敏反應，如全身性過敏、血管性水腫、皮疹和蕁麻疹。

特定族群之使用：在對孕婦使用 TRELEGY，目前並無足夠的資料可據以確認是否存在有藥物相關風險。只有在潛在效益超越 β 作用劑干擾子宮收縮作用方面之可能風險的情況下，才可於懷孕後期與分娩期間使用。TRELEGY 並不適用於兒童。

詳細資訊請參閱盒內仿單

NP-TW-FVU-PSTR-200001

Date of Preparation: 2020/11/03

Trade marks are property of their respective owners

Trelegy Ellipta was developed in collaboration with INNOVIVA

© (2020) GSK group of companies or its licensor

TRELEGY ELLIPTA

fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol