



“杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克 (達淨磺胺銀)

"SINPHAR" SILIVERZINE CREAM

10MG/GM (SULFADIAZINE SILVER)

衛署藥製字 第 032571 號

本藥須由醫師處方使用

版本日期 2023-06-13

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每gm含有：

Sulfadiazine Silver.....10mg

1.2 賦形劑

Cetyl Stearyl Alcohol、Propylene Glycol、White Petrolatum、Liquid Petrolatum、Sorbitan Monostearate、Polysorbate 60、Methylparaben、Propylparaben、Water Purified.

1.3 劑型

乳膏劑。

1.4 藥品外觀

白色至微黃色乳膏。

2 適應症

局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿。

3 用法及用量

3.1 用法用量

灼傷治療時1日1~2次。

先清潔患處後，以無菌之手套塗敷本劑，患部必須塗佈完全並達2~3mm厚，在塗敷本劑後不必馬上裹上紗布，第二天將前日的乳膏清潔或以溫水洗掉，再繼續塗敷治療，使用本劑應繼續直到出現治療效果，以免患部未完全痊癒，會有再感染之可能，其他一般感染症，以適量塗敷，每日一至數次。

4 禁忌

4.1 本劑不可用於眼睛。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 藥物反應症候 (搔癢、發紅、腫脹、丘疹、小水疱) 出現時，應中止使用。

5.1.2 曾對磺胺藥過敏，光線過敏，肝或腎障害之患者應慎重使用。

5.1.3 若有過敏 (發癢、發紅) 菌交代症、白血球減少及皮膚疼痛等現象應中止使用。

5.1.4 本劑與外用酵素製劑併用會減弱藥效，併用時應注意。

5.1.5 廣範圍、大面積之使用場合，應定期測定血清滲透壓。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

孕婦使用，應考慮有益性及危險性之比較。

6.2 哺乳

目前尚無資訊。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前尚無資訊。

6.4 小兒

新生兒及早產兒，不推薦使用本劑。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Sulfadiazine Silver之抗菌作用機序與Silver nitrate和Sulfadiazine不同，Sulfadiazine Silver僅對細胞膜，細胞壁作用而產生抗菌效果。又Sulfadiazine Silver之化學性質非碳酸苷酶抑制劑，不會引起全身性酸中毒。

10.2 藥效藥理特性

Sulfadiazine Silver具有廣泛之抗菌作用，對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌和真菌均有效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

112.06.13

1000公克以下塑膠管裝、塑膠罐裝、積層鋁管裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下保存。

13.4 儲存注意事項

應避光保存。

製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號