



"成大"漱淨漱口水

SUJIN GARGLE "CHEN TA"

衛署成製字 第 016214 號

乙類成藥

版本日期 2026-03-25

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each ml contains: Chlorhexidine gluconate.....2mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Glycerin、Cremophor RH-40、Propylene Glycol、Sucralose、Sorbitol Solution、Menthol、Peppermint oil、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Brilliant Blue FCF、Ethanol、Purified Water。

2 用途(適應症)

口腔內之殺菌、消毒、清潔、去除口臭。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.1.2 6歲以下。

3.1.3 口腔潰瘍者。

3.2 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.2.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3 其他使用上注意事項

3.3.1 六歲以上十二歲以下兒童需在大人指導下使用。

3.3.2 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.3.3 避免陽光直射。

3.3.4 勿超過建議使用量或使用次數。

3.3.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。


3.3.6 限使用於口腔漱洗不得內服，亦不得使用於眼睛四周或黏膜(如鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

3.3.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.3.8 避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

3.3.9 本品含酒精4.5%，宜謹慎使用。

3.3.10 如不慎過量使用及吞服後，感覺不適者，請立即就醫。



3.3.11 使用後三十分鐘內請勿進食、吸菸或服用飲料。

4 用法用量

每次以10~15ml之漱口水劑於口腔內漱洗並停留三十秒至六十秒後吐出，可於早晚或需要時使用。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
口腔	灼熱感及刺痛感等。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情形產生。

6 包裝

500毫升以下塑膠瓶裝。

7 類別

乙類成藥。

製造廠

成大藥品股份有限公司

台南市麻豆區南勢里關帝廟80號

藥商

成大藥品股份有限公司

台南市麻豆區南勢里關帝廟80號