



力克眼用軟膏

Devirus Ophthalmic Ointment

衛署藥製字 第 049558 號

須由醫師處方使用

版本日期 2023-08-04

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each Gram Contains :

Acyclovir30 mg

1.2 賦形劑

Liquid Petrolatum、White Petrolatum

1.3 劑型

眼用軟膏劑。

1.4 藥品外觀

白色至微黃色均質軟膏。

2 適應症

單純疱疹性角膜炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

下列劑量適用於各種年紀的患者。將軟膏擠出約 1 公分，塗於下結膜囊中，每天塗用 5 次，每次間隔約 4 小時，痊癒後，必須再繼續治療 3 天。

4 禁忌

已知對 Acyclovir 過敏者，不可使用。

5 警語及注意事項


依文獻記載

5.1 警語/注意事項

- 使用本藥後可能會產生短暫性之輕微刺痛。
- 致突變性：在體內及體外所做廣泛之基因突變試驗結果指出 Acyclovir 對人類沒有遺傳基因改變之危險。
- 致癌性：對大鼠及小鼠的長期研究中，並沒發現 Acyclovir 有致癌性。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕



對兔子或老鼠的投藥試驗中，並沒有發現胚胎毒性或畸胎性。但在人體使用的臨床經驗仍屬有限，因此只有在衡量過可能的效果會大於未知的危險性時，才可使用本藥。

6.2 哺乳

目前有限的數據顯示本藥會由乳汁分泌出來。

6.3 有生育能力的女性與男性

對老鼠和狗投與超過治療劑量的大量 Acyclovir 時，在毒性反應中包括會對精子生成有可逆性的不良作用。經由兩代的老鼠研究中，發現口服投與 Acyclovir 對生育力沒有任何不良作用。本藥對人類女性生育力的影響，尚無任何資料。

7 交互作用

Probenecid 會使 Acyclovir 的平均半衰期和血漿濃度曲線下的面積增加。其他影響腎生理功能的藥物，有可能會改變 Acyclovir 的藥品動力學。但是，臨床經驗並沒有發現其藥物會與 Acyclovir 發生交互反應。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

少部分的病人使用本藥會產生短暫之輕微刺痛。曾有報告指出，使用本藥後發生表面斑點狀角膜病變，但曾報導使用本藥後有局部刺激及發炎現象，如：瞼炎及結膜炎。

9 過量

有人誤食整條含有 135mg Acyclovir 的軟膏，沒發現有不良反應。口服每次 800mg，一天 5 次（即每天 4 公克），連續 5 天，也沒有副作用報告。甚至不小心靜脈注射 80mg/kg 的高劑量，並無不良反應發生，Acyclovir 可被透析。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Acyclovir 是一種抗病毒藥物，在體外試驗中，對單純性疱疹 (HSV) 第一、二型與水痘帶狀疱疹病毒非常有效。Acyclovir 在進入被疱疹感染的細胞後，會磷酸化成活性化合物。這第一步驟的反應須依賴病毒生成的 Thymidine Kinase 酵素。Acyclovir 三磷酸化合物會成為疱疹特異性 DNA Polymerase 的抑制劑和受質，因此可以中止病毒 DNA 的合成，而不會干擾正常細胞的代謝作用。眼藥膏中的 Acyclovir 可經由角膜上皮及眼球表面組織很快地吸收，在眼前房水的濃度即可有效的抵抗病毒。本藥局部投與時，使用目前的方法無法偵測 Acyclovir 在血液中的濃度，在尿液中的量可以偵測得出，但不具意義。


10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性



目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

100 公克以下鋁管裝、積層管裝、塑膠管裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

本藥應貯存於 25°C 以下。

13.4 儲存注意事項

經打開一個月後之本藥必須丟棄。

製造廠

溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街117號

藥商

溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街 1 1 7 號