

“愛爾康比利時廠”淚膜眼藥膏

DURATEARS* Sterile Oph Oint

衛署藥輸字第 017121 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

【產品特性】

DURATEARS*眼藥膏經特殊設計，在晚上的期間，當使用人工淚液無法達預期效果時，DURATEARS*對於保持眼睛的潤滑及舒適是很理想的。

DURATEARS*眼藥膏為一種平滑舒適的眼藥膏基劑，能夠快速溶解以防止乾燥和不舒服。

【成分】

每克中：

有效成分及含量： mineral oil ... 30 mg

其他成分(賦形劑)： white petrolatum ... 1 g、anhydrous liquid lanolin ... 30 mg

【用途(適應症)】

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

三、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 以下情形，請勿繼續使用。
 - 過期眼藥膏，請勿使用。
 - 藥膏混濁、變色或出現異物時請丟棄。
6. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸容器開口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
7. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，隔開 10 分鐘以上再用藥膏。
8. 本品不適合配戴隱形眼鏡時使用，使用前請卸下隱形眼鏡。
9. 使用眼藥膏時可能有視線模糊之現象產生，故建議在睡前使用較適宜。
10. 若眼部過量使用本藥，可使用溫水沖洗眼部。
11. 暫時性視力模糊或其他的視覺干擾現象可能會影響駕駛或機械操作能力。若患者使用本品後出現視力模糊，請待視力清楚後再行駕駛或操作機械。

【用法用量】

需要時使用。

【使用步驟】

1. 將頭往後仰。
2. 以一隻手指置於眼睛下之臉頰處，輕輕地向下拉以使眼球及下眼瞼形成“V”形的眼袋。

3. 擠少量（大約 1 公分）的眼藥膏於“V”形眼袋中。勿使容器開口接觸眼睛。

【警 語】

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 下列為已經通報的不良反應，其發生頻率無法由現有資料評估。

身體部位	症狀
神經系統	頭痛
眼睛、視力	眼睛疼痛、眼睛持續腫脹、搔癢、刺激、充血發紅、具有灼熱感、異物感及視力持續模糊

2. 連續使用三天 (或 72 小時) 症狀未改善。

3. 若有其他任何不適情況產生。

4. 使用後發生過敏反應。

【包裝】

100 毫克以下軟管裝。

【儲存】

儲存於 25°C 以下。

【藥品劑型及形狀】

軟管裝淡黃、透明眼用藥膏。

Alcon[®]

a Novartis company

製造廠： s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

廠 址： Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium.

藥 商： 台灣諾華股份有限公司

地 址： 台北市中正區仁愛路二段 99 號 11 樓

英文版次：CCSI v.2.0 / 75210-0 / 09-2015

© 2016, 2018 Novartis

* 商標為 Novartis 公司所有