

# 護眼眼藥水 0.01%

## EYEHELP EYE DROPS 0.01%

衛署藥製字 第 046990 號

須由醫師處方使用

版本日期 2023-12-25

### 1 性狀

#### 1.1 有效成分及含量

Each mL contains:

**Neostigmine Methylsulfate .....0.1mg**

#### 1.2 賦形劑

Boric Acid, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, Distilled Water

#### 1.3 劑型

點眼液劑。

#### 1.4 藥品外觀

無色無味澄清水溶液。

### 2 適應症

眼球肌肉症狀之改善。

### 3 用法及用量

#### 3.1 用法用量

每次2滴，一日三次，視症狀適宜增減。

### 4 禁忌

請參閱[警語及注意事項]。

### 5 警語及注意事項

#### 5.1 警語/注意事項

5.1.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

5.1.2 過期眼藥水，請勿使用。瓶裝之眼藥水，開瓶30天後請勿繼續使用。

5.1.3 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。

5.1.4 使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。

5.1.5 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再使用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

5.1.6 以下情況應停藥立即就醫：

A. 連續使用三天（或72小時）症狀未解除。

B. 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

C. 發生過敏反應。

D. 青光眼 ( Glaucoma ) 患者。

5.1.7 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。

5.1.8 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

5.1.9 過度使用血管收縮劑會增加眼睛紅腫。

5.1.10 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用含血管收縮成分之製劑。

## 7 交互作用

目前尚無資訊。

## 8 副作用/不良反應

### 8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

## 9 過量

目前尚無資訊。

## 10 藥理特性

### 10.1 作用機轉

Neostigmine 是將Cholinesterase暫時不活化，以抑制Acetylcholine之被分解，同時間接增加Acetylcholine之作用，為自然促進類似Acetylcholine作用之副交感神經興奮劑。

### 10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

### 10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

## 11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

## 12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

## 13 包裝及儲存

### 13.1 包裝

100公撮以下塑膠瓶裝。

### 13.2 效期

批號( Lot )與保存期限( Exp )請見外盒包裝。

### 13.3 儲存條件

請儲存於25°C以下。

### 13.4 儲存注意事項

13.4.1 避免陽光及日光燈直射，宜保存於陰涼之處。

13.4.2 不要置於高溫度環境或冰箱中。

13.4.3 瓶蓋應緊蓋。需置於小孩接觸不到之處。

### 14 病人使用須知

14.1 請依照藥品標示使用。

14.2 使用前，請洗淨雙手。

14.3 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。

14.4 開瓶注意事項：產品於開啟使用前，先以順時針方向往下旋緊一圈後再逆時針旋轉開瓶使用，以利藥液滴出。

14.5 保管時，若容器的前端和蓋子出現結晶，請以乾淨的紗布擦拭後使用。

### 15 其他


#### 15.1 性狀

15.1.1 pH值：5.0~7.0

15.1.2 滲透壓比：1.0（與生理食鹽水比）

15.1.3 性狀：白色結晶性粉末，無味，略溶於水，易溶於Ethanol。

15.1.4 有效成分Neostigmine methylsulfate之化學構造式：



15.1.5 一般名：Neostigmine methylsulfate

15.1.6 化學名：3-dimethyl carbamoxypheyl trimethylammonium methylsulfate

15.1.7 分子式：C<sub>13</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>S

15.1.8 分子量：334.39

15.1.9 融點：145~149°

### 製造廠

麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠 桃園市桃園區桃鶯路445之2號

藥商

麥迪森醫藥股份有限公司

臺北市中正區林森南路10號5樓