

Size: 150x98mm

衛署藥製字第045145號
健保號碼A045145421(5ml)
健保號碼A045145423(6ml)
Code No.31311 G-7757

“溫士頓”

好視多

眼用懸浮液
0.2公絲/公撮

"Winston"

Foxone Ophthalmic Suspension
0.2mg/ml

【成分】

每1公撮中含有

Fluorometholone.....0.2mg

賦形劑: Sodium Phosphate Monobasic 2H₂O、Sodium Phosphate Dibasic 12H₂O、
Benzalkonium Chloride、Tween 80、Disodium Edetate、
Sodium Chloride、Carmellose Sodium、Water For Injection

【適應症】

眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎。

【用法用量】

使用前請徹底振搖。

滴入1~2滴在眼結膜囊中，每日2~4次。

在最初的24~48小時這段期間，劑量可增加至每小時2滴。

使用時壓住淚管，可將藥物被身體吸收的可能性降至最低。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

急性表面單純疱疹性角膜炎、牛痘、水痘或眼球角膜及結膜因其他
病毒所造成的疾病、眼部組織的黴菌感染、眼結核、對
Fluorometholone過敏患者。

【警語】

1.敏感患者長期使用可能會造成眼內壓升高，導致視神經受損，視力
衰退，視野變窄，形成囊下後部白內障或因眼部組織釋出黴菌或病
毒而造成二次感染。

- 2.許多眼疾及長期使用皮質類固醇會導致角膜和鞏膜變薄。
- 3.使用皮質類固醇在變薄的角膜或鞏膜組織上可能會引起穿孔。
- 4.類固醇會遮蔽或惡化急性化膿性而未作治療的眼部感染。
- 5.曾有單純疱疹性角膜炎病史的患者使用類固醇應格外謹慎；並經常
進行強制性的裂隙燈顯微檢查。
- 6.局部、長期地使用類固醇特別容易發生角膜黴菌感染，因此，使用
中或曾使用過類固醇的患者一旦發現任何頑固的角膜潰瘍，切勿忽
略黴菌入侵的可能性。
- 7.需經常檢查眼內壓。

【副作用】

- 1.眼內壓過高可能會造成青光眼，視神經受損，使視力衰退或視野變窄
，形成囊下後部白內障及造成復原遲緩。
- 2.外用皮質類固醇曾有下列報告：
 - a.從眼部組織釋出的致病菌造成眼部二度感染。
 - b.由於角膜或鞏膜變薄而導致眼球穿孔。

【注意事項】

- 1.根據動物試驗報告，使用Fluorometholone會導致動物胎兒畸形。由
於在孕婦使用上的安全性尚未確立，故對於孕婦或可能懷孕的婦女
及授乳婦人不要投與。
- 2.對2歲以下嬰幼兒使用的安全性及有效性尚未確立。
- 3.使用本產品時，應避免瓶子內塞接觸眼睛及眼瞼。並應避免用手或
身體其他部位觸碰瓶子內塞。
- 4.使用前請徹底振搖。
- 5.使用完畢或不用時，應鎖緊瓶蓋，以防止污染。
- 6.請於開瓶後四星期內使用完畢，逾期未用完的部份請丟棄不用。

【包裝貯存】

100 ml以下，塑膠瓶裝。避光儲存於25℃下。

1406-01



Made in Taiwan
溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號