



睛潤眼用凝膠

Ginsol Gel (Sterile Ophthalmic Gel)

衛署藥製字 第 049459 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-12-06

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gram contains :

Carbomer..... 2 mg

1.2 賦形劑

Cetrimide、Sorbitol、Sodium Hydroxide、Sodium Chloride、Tromethamine、Water For Injection

1.3 劑型

眼用凝膠劑。

1.4 藥品外觀

無色透明凝膠。

2 適應症

乾眼症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

依照病情輕重，白天及睡前約使用 3~5 次，若有需要可增加使用次數，每次一滴點於結膜囊內，使用時隱形眼鏡需取下。

【用法說明】請詳見 14. 病人使用須知。

4 禁忌

4.1 對本藥任何成分過敏者應禁用。

4.2 對 Cetrimide 過敏者應禁用。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

使用前應把隱形眼鏡取下，點後隔 30 分鐘再戴上。

5.3 操作機械能力

縱使依指示使用，本藥點後會有大約 5 分鐘的視力模糊現象，故駕車和操作機器者宜注意。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

假如醫師認為有需要時方可使用於孕婦。

6.2 哺乳

假如醫師認為有需要時方可使用於授乳婦。

7 交互作用

假如與其他點眼液併用，請至少隔開 5 分鐘，且本藥應最後使用。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

本藥通常不會造成任何副作用，極少病人偶有眼睛暫時的刺激感和發癢。

9 過量

應避免使用時接觸到眼瞼，應避免任何過量使用。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

100 公克以下塑膠滴管裝、積層管裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

不要存放於溫度 25°C 以上。

13.4 儲存注意事項


- (1) 產品逾期不要使用。
- (2) 和其他眼睛用藥一樣，開啟後一個月未用完應丟棄。
- (3) 置於兒童伸手不及之處。

14 病人使用須知

111.12.06

(1) 使用本藥時，隱形眼鏡需取下。

(2) 本藥點眼時，管子請拿直，擠壓時，形成小滴，順管口落下。



溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街117號

藥商

萱草堂有限公司

台南市南區賢南街95號