

優麗舒保濕型單支裝點眼液

Optive Fusion Lubricant Eye Drops (Unit Dose)

衛部藥輸字 第 026926 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2026-02-02

優麗舒™保濕型單支裝點眼液(Optive Fusion® Lubricant Eye Drops Unit Dose)，可暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感，亦可暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每ml含Carboxymethylcellulose Sodium (Type 7LFPH) 5mg，Glycerin 10 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium Hyaluronate, Erythritol, Levocarnitine, Sodium Lactate, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium Hydroxide/ Hydrochloric Acid, Purified Water

2 用途(適應症)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

3.3 其他使用上注意事項

3.3.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.3.2 避免陽光直射，宜保存陰涼之處。

3.3.3 使用前，請洗淨雙手。

3.3.4 請依照藥品標示使用。

3.3.5 請勿吞食本品。

3.3.6 以下情形，請勿繼續使用：

(1) 超過保存期限的眼藥水。

(2) 藥液混濁、變色或出現異物時。

3.3.7 首次使用前，須注意包裝且未拆封，方可使用。

3.3.8 可回蓋式不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，須24小時內使用完畢，未使用完之溶液請勿繼續使用。

3.3.9 為避免污染藥品或傷及眼睛，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口或直接碰觸到患眼，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝

3.3.10 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

(1) 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。

(2) 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。

3.3.11 使用本藥後可能出現短暫視力模糊的現象，而影響駕車或操作機械的能力。應等視力恢復清晰後再行駕車或操作機械。

3.4 下列副作用為本藥上市後自發性通報，無法確定其人數及發生頻率：

視覺異常

眼睛刺激感、眼睛充血、眼睛痛、眼睛癢

中毒與醫療傷害

眼睛表面損傷

4 用法用量

需要時使用	每次1至2滴
-------	--------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 連續使用三天症狀沒有改善。

5.1.2 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

5.1.3 若有任何不適情況產生。

5.1.4 產生過敏性反應。

6 包裝

0.4毫升LDPE塑膠瓶裝，100支以下盒裝

7 儲存條件

25°C以下, 未使用之單支裝點眼液應存放原包裝內。

8 保存期限

標示於外盒。

譯自CCDS V5.0 TW2

製造廠

: Allergan Pharmaceuticals
Ireland

製造廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland

藥商

: 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣
分公司

地址：臺北市中山區遼寧街179號17及19樓

