



安心平注射液 2 公絲/公撮（樂必寧）

Anxicam Injection 2 mg（Lorazepam）

衛署藥製字第 039626 號 G-5158

本品屬 Benzodiazepine 類藥物，且是同類藥物中，使用劑量最低就能產生鎮靜，解除焦慮的藥效。本品於手術前給藥，對大多數患者會產生暫時性、可逆健忘反應，使患者難想起近手術的事情，以緩解手術前焦慮。

「成份」：Each ml contains：

Lorazepam 2mg

「適應症」：焦慮狀態。

「用法用量」：

1. IM 時：常用劑量是 0.05mg/kg，最大劑量為 4 mg。在手術前 2 小時給藥。
2. IV 時：常用劑量是 0.02mg/1b(0.044mg/kg)或總量 2mg。在手術前 15-20 分鐘給藥。大部份用於成人病患，但通常不含 50 歲以上者。
3. IM 注射時：不經稀釋直接行深部肌肉注射。
4. IV 注射時：用等體積的生理食鹽水或注射用水稀釋。IV 給藥須緩慢，限 1 分鐘 2mg 以下的速率。
5. 18 歲以下的孩童：施量未確定。本藥限由醫師使

用。

「注意事項」：

1. 不列患者禁用：對 Benzodiazepaine 過敏。急性狹角性青光眼、急性酒精中毒、昏迷、，休克、懷孕、授乳婦。

2. 副作用：

- a. 神經系統—嗜眠、頭疼、眩暈、耳鳴、視覺模糊。
- b. 循環系統—低血壓。
- c. 皮膚—搔癢發疹。

3. 50 歲以上的病人，好時會有更長、更深的鎮靜作用，通常起始劑量不能超過 2 mg。

4. IV 時，需重複抽吸以確定藥物進入靜脈中，若意外的動脈內注射可能發生動脈痙攣、壞死。

「包裝」：

1 ml/vial，10 ml/vial，1ml/amp，100 支以下盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO. LTD.

台南縣永康市四維街 164 號