



衛署藥製字第 022272 號

躁狂症·精神分裂症治療劑

易寧優[®] 注射液(哈羅哩利杜)

Binin-U[®] injection (Haloperidol)

成 份：Each ml contains：

Haloperidol.....5mg

作 用：

- 一、Haloperidol 經由大腦中 Dopamine 之抑制而對中樞神經系產生選擇性抑制作用，故對精神運動系之抑制較 Chlorpromazine 為強，而少有睡眠及低血壓之副作用故對躁狂症及激動精神病之控制極具療效。
- 二、Haloperidol 之有效時間較長，通常一日一次至二次之投予即可維持 24 小時之藥效。
- 三、Haloperidol 同時具有抗憂鬱作用，對精神，神經性不安分裂症有效，而無外錐體症候群副作用。
- 四、Haloperidol 具有拮抗 Apomorphine 之鎮吐作用。
- 五、肌肉注射之作用在數分鐘內即發生，持效約 8 小時之久。

吸收分佈及代謝：

成人一次 2mg 肌肉注射，20 分鐘內獲得最高血中濃度，其生物半減期為平均 20.7 小時 (12.8~35.5 小時)。

五天內約有 15%排泄於膽汁，40%排泄於尿中。

適應症：

躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

用法用量：

下列建議的劑量只是一般的平均用法，必須因應病患的反應來調整劑量，通常在急性期應調高劑量，在穩定期則必逐漸調低劑量，以便決定有效的最低劑量，高劑量僅使用於那些對低劑量反映欠佳的病患。

成人：當作神經安定劑時：

急性期：精神分裂的急性發作，譫妄性震顫(delirium termens)，妄想症，急性混亂，高沙可夫症候群(Kroskoffs syndrome)，急性妄想症。5-10 毫克靜脈或肌注，可每小時重複使用直到症狀有效控制或達到每天最高劑量 60 毫克/天。

當作精神運動抗激奮劑時：

急性期：躁症(mania)，癡呆症，酒精中毒，人格異常，行為和個性異常，打嗝，舞蹈症動作，肌肉抽搐，口吃.....。5-10 毫克靜脈或肌肉注射。

當作止吐劑時：

因中樞神經引起的：5 毫克靜脈或肌肉注射。預防手術後嘔吐：2.5-5 毫克靜脈或肌肉注射，在手術結束時。

老年病患：治療必須以成人劑量的半量開始，並因結果需要而加以調整。

本藥限由醫生使用。

注意事項(Precaution)：

一、下列患者使用應加小心

- a. 嚴重心血管病患者：因為可能發生過性低血壓和(或)心絞痛。低血壓發生時須使用升壓劑，但不能使用 epinephrine，因為本品會阻斷其升壓活性，而且相反地可能還會發生血壓降低。
- b. 使用抗痙攣劑患者：因為本品會降低痙攣閾值，因此應同時維持適當之抗痙攣治療。
- c. 過敏患者或對藥物有過敏病例患者。
- d. 使用抗凝血劑患者：因為曾發生一個使用本品及 phenindione 產生干擾的單獨例子。

二、假使同時使用 antiparkinson 劑時，在本品終止給予後，antiparkinson 劑必須繼續給予，因為兩者之排泄速率不同，假使同時終止給藥，可能發生錐體外的 (anticholinergic) 症狀。

三、醫師須謹記，本品與抗膽鹼素劑(anticholinergic)，包括 antiparkinson 劑使用時可能使眼壓增高。

四、當本品用於控制週期性不正常之狂躁症時，患者之情緒可能很快傾向抑鬱。

五、具有甲狀腺毒症(thyrotoxicosis)患者使用包括本品在內之抗精神病劑時，可能發生嚴重之神經毒性(例如僵硬，不能說話或走路)。

包 裝：

1ml/Amp，2ml/Amp，10Amps，50Amps，100Amps，5Amps。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD

台南縣永康市四維街 164 號