

“台裕” 鹽酸二苯胺明 注射液

Diphenhydramine HCl Injection “Tai Yu”

衛署藥製字第 022049 號

本藥限由醫師使用

1. 性狀

1.1 有效成分及含量

Each ml contains:

Diphenhydramine HCl.....30mg

1.2 賦形劑

Sodium Chloride、Sodium Hydroxide、Hydrochloric Acid、Water for Injection。

1.3 劑型

注射劑

1.4 藥品外觀

本劑為無色澄清透明之水溶液

2. 適應症

皮膚疾患(濕疹、皮膚炎)枯草熱、過敏性鼻炎、急性鼻炎、血管神經性鼻炎。

3. 用法及用量 (依文獻記載)

3.1 用法用量

3.1.1 成人一日 2~3 次，每次 1ml (30mg)，皮下或肌肉注射，但必要時亦可靜脈注射。

3.1.2 本品以靜脈注射時，每次 diphenhydramine 之劑量以 10mg-50mg 為宜，且其注射速率不宜超過 25mg/min。

3.3 特殊族群用法用量

3.3.1 老人宜以最低有效起始劑量開始治療。

3.3.2 腎功能不全者應延長給藥間隔(interval)；輕度(GFR>50mL/min)：間隔 6 小時；中度(GFR 10-50mL/min)：間隔 6-12 小時；重度(GFR<10mL/min)：間隔 12-18 小時。

4. 禁忌

兒童不宜使用本品。

5. 警語及注意事項 (依文獻記載)

5.1 警語/注意事項

5.1.1 注射時患者身體部位之選擇及注意：

(a).肌肉注射時盡量避免傷及神經組織。

(b).神經分佈區域避免注射。

5.1.2 皮下或皮內注射有造成組織局部壞死的可能性，應盡量避免。

5.3 操作機械能力

本品有嗜睡催眠之作用，故凡投予本品之患者，不宜從事機械之操作或開車、摩托車及自行車等，以免發生意外事件。

6. 特殊族群注意事項 (依文獻記載)

6.1 懷孕

妊婦或有妊娠可能性之婦女，使用本品時，應特別慎重。

6.4 小兒

早產兒(premature infants)及新生兒(neonate)不建議使用。

7. 交互作用

目前尚無資訊。

8. 副作用/不良反應 (依文獻記載)

8.1 臨床重要副作用/不良反應 (依文獻記載)

本品有下列之副作用：

(a).精神神經系倦怠感、神經過敏、頭痛、口渴等。

(b).消化系-噁心、嘔吐、下痢等症狀之出現。

9. 過量

目前尚無資訊。

10. 藥理特性

目前尚無資訊。

11. 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12. 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13. 包裝及儲存

13.1 包裝

1 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。

13.2 效期

如外包装所示。

13.3 儲存條件

25°C以下密封貯存。

製造廠：台裕化學製藥廠股份有限公司

藥商：台裕化學製藥廠股份有限公司



台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL：(03)5826655

FAX：(03)5822389

