


使用說明書
杜避炎注射劑 300毫克
DUPIXENT solution for injection 300mg
注射劑，皮下注射使用
附有針頭防護套的單劑量預填注射筆

使用 DUPIXENT 300mg 預填注射筆前，請先閱讀使用說明書。在未經示範該如何施打 DUPIXENT 之前，請勿自行注射或替他人注射。在您第一次嘗試自行注射前，您的醫療人員可先向您或您的照護者示範如何準備和注射 DUPIXENT。12 歲以上的青少年建議由成人或在成人的監督下使用 DUPIXENT。12 歲以下的兒童，應由照護者注射 DUPIXENT。DUPIXENT 預填注射筆僅可用於成人及2歲(含)以上的兒童。

請保存這份說明書以作為未來使用。有任何問題嗎？請諮詢您的醫療人員。

這是一個單劑量的預填注射筆(說明中稱之為“注射筆”)。它內含 DUPIXENT 300 mg，注射於皮膚下(皮下注射)。

DUPIXENT 注射筆的各個部位如下圖所示。



重要資訊

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 使用注射筆之前，請先仔細閱讀所有說明。• 詢問您的醫療人員，您應多久注射一次藥物。• 12 歲以上的青少年建議由成人或在成人的監督下使用 DUPIXENT。• 2歲以上12 歲以下的兒童，應由照護者注射 DUPIXENT。• 每次注射都應更換注射部位。 | <ul style="list-style-type: none">• 如果綠蓋遺失或沒有牢固連接，請勿使用預填注射筆。• 請勿用手指按壓或觸碰黃色針蓋。• 請勿透過衣物注射。• 除非即將開始注射，請勿取下綠蓋。• 請勿嘗試將綠色蓋放回預填注射筆上。• 使用後請立即丟棄(棄置)預填注射筆。請參閱下方“步驟 D：棄置”。• 請勿重複使用預填注射筆。 |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 若注射筆掉落於堅硬表面或已損壞，請勿使用。 | |
|---|--|

113.10.14



DUPIXENT 的儲存方式

- DUPIXENT 注射筆及所有藥品應置於兒童無法觸及處。
- DUPIXENT 注射筆應儲存於冰箱 2°C - 8°C (36°F - 46°F)的環境中。
- 請將 DUPIXENT 注射筆存放於原裝紙盒內，以防止光線照射。
- DUPIXENT 注射筆可以在室溫最高至 25°C (77°F)的環境下保存 14 天。請丟棄（棄置）任何在室溫下放置超過 14 天的 DUPIXENT 注射筆。
- 任何時間都不可震搖注射筆。
- 注射筆不可加熱。
- 注射筆不可冷凍。
- 注射筆不可直接照日光。

步驟如下：

A：準備

A1. 準備用品

確保您有以下項目：

Dupixent 預填注射筆

- 1 片酒精棉片*
- 1 個棉球或紗布*
- 尖銳物品（防穿刺）棄置容器*（見步驟 D）

* 外盒中未包含的物品



• the DUPIXENT 注射筆



- 1 片酒精棉片*



- 1 個棉球或紗布*



- 尖銳物品（防穿刺）棄置容器*（見步驟 D）

* 外盒中未包含的物品

A2. 查看標籤

- 確認您擁有正確的產品和劑量。

查看標籤



A3. 檢查有效期限

- 檢查有效期限。

⚠ 若已超過有效期限，請勿使用預填注射筆。

檢查有效期限



A4. 檢查藥物

113.10.14

透過預填注射筆的劑量窗口查看藥物：


檢查液體是否清澈無色至淺黃色。

附註：您可能會看到氣泡；這是正常現象。

⚠ 若液體變色或混濁，或含有肉眼可見的碎片或顆粒，請勿使用預填注射筆。

⚠ 若劑量窗口為黃色，請勿使用預填注射筆。

檢查藥物



A5：等待 45 分鐘

將預填注射筆放在平坦表面，
並自然回溫至室溫（低於 77°F
或低於 25°C）至少 45 分鐘。

⚠ 請勿加熱預填注射筆。

⚠ 請勿將預填注射筆置於陽光直射處。

⚠ 請勿將 Dupixent 置於室溫下超過 14 天。任何 Dupixent 注射筆置於室溫下放置超過 14 天應立即丟棄(棄置)。



B. 選擇您的注射部位

B1. 建議注射部位為：


- 大腿
- 肚子: 除了肚臍外周圍 2 吋 (5 公分) 的範圍。
- 上臂 若由照顧者為您給藥，其也可使用上臂外側部位。

請為每次Dupixent注射選擇不同的注射部位。

⚠ 請勿透過衣物注射。

⚠ 請勿注射於有壓痛、受損、瘀青或有疤痕的皮膚。

請由照顧者給藥



照顧者給藥或
自行注射

Self-injection or by caregiver
Injection by caregiver only


B2. 洗手



B3. 準備注射部位

- 使用酒精棉片清潔注射部位。
- 注射前請先讓您的皮膚乾燥。

⚠ 在注射前，請勿再次觸碰注射部位或對其吹氣。



C. 注射


C1. 取下綠蓋

請勿轉開綠蓋。

在您準備好注射之前，請勿取下綠蓋。

請勿用手指按壓或觸碰黃色針蓋。針頭在裡面。

⚠ 取下綠蓋後，請勿將其放回預填注射筆上。




C2. 捏起皮膚並放置

- 在注射之前和期間捏起皮膚。
- 成人和 12 歲以上的兒童無需捏起皮膚。
- 將黃色針蓋放在皮膚上時，請握住預填注射筆，以便看見劑量窗口。
- 將黃色針蓋以大約 90 度角放在皮膚上。



請勿用手指按壓或觸碰黃色針蓋。針頭在裡面。




C3. 壓下

將預填注射筆緊緊按在您的皮膚上，直至看不到黃色針蓋，並維持。

- 開始注射時，將會發出咔噠聲。
- 劑量窗口將開始變成黃色。

注射可能需要長達 15 秒。

成人和 12 歲以上的兒童無需捏起皮膚。



C4. 緊握

持續將預填注射筆緊靠在您的皮膚上。

- 您可能會聽到第二聲咔嚓聲。
- 檢查整個劑量窗口是否變成黃色。
- 然後慢慢數到5。
- 然後將注射筆從皮膚上拿起，您的注射就完成了。

如果劑量窗口沒有完全變黃，請取出注射筆並致電您的醫療人員。

 未與醫療人員討論前，請勿自行注射第二劑。

成人和12歲以上的兒童無需捏起皮膚。




C5. 移除

- 在您完成注射後，請直直往上拉，以將預填注射筆自皮膚取出。
- 若您在注射部位發現任何血液，請以棉球或紗布輕輕拍打。



請勿在注射後搓揉您的皮膚。



D. 棄置

- 使用後，請立即將使用過的 Dupixent 預填注射筆（內含針頭）和綠蓋丟棄（棄置）於防穿刺（尖銳物品丟棄）容器內。

請勿將使用過的預填注射筆（內含針頭）和綠蓋丟棄（棄置）於至您的家庭垃圾中。



請勿重新蓋上綠蓋。

