



抑癌寧注射劑

IMFINZI Injection 50 mg/ml

衛部菌疫輸字第 001088 號

限由醫師使用

版本日期 2026-03-23

1 性狀

Durvalumab是一種程序性死亡配體1 (PD-L1) 阻斷抗體。Durvalumab是通過DNA重組技術在懸浮培養的中國倉鼠卵巢 (CHO) 細胞中製造的人類免疫球蛋白G1κ (IgG1κ) 單株抗體。IMFINZI (durvalumab)靜脈注射用注射劑是一種無菌，無防腐劑，清澈至乳白色，無色至微黃色溶液，無可見顆粒。

每個IMFINZI 500 mg小瓶含500 mg的durvalumab在10 mL溶液中。每mL含durvalumab 50 mg、L-histidine (2 mg)、L-histidine hydrochloride monohydrate (2.7 mg)、α,α-trehalose dihydrate (104 mg)、Polysorbate 80 (0.2 mg) 和注射用水(USP)。

每個IMFINZI 120 mg小瓶含120 mg的durvalumab在2.4 mL溶液中。每mL含durvalumab 50 mg、L-histidine (2 mg)、L-histidine hydrochloride monohydrate (2.7 mg)、α,α-trehalose dihydrate (104 mg)、Polysorbate 80 (0.2 mg) 和注射用水(USP等級)。

1.1 有效成分及含量

每個IMFINZI 500 mg小瓶含500 mg的durvalumab在10 mL溶液中。

每個IMFINZI 120 mg小瓶含120 mg的durvalumab在2.4 mL溶液中。

1.2 賦形劑

L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, α,α-trehalose dihydrate, Polysorbate 80, 注射用水(USP)。

1.3 劑型

注射液劑

1.4 藥品外觀

在單劑量小瓶中呈清澈至乳白色，無色至微黃色之溶液。

2 適應症

2.1 非小細胞肺癌 (NSCLC)

- 與含鉑化療藥物併用，作為可切除(腫瘤大小>4公分且/或 (and/or) 淋巴結分期 N1及N2)、無已知的表皮生長因子受體 (EGFR) 突變或間變性淋巴瘤激酶 (ALK) 重組的非小細胞肺癌成人病人的前導性治療用藥(neoadjuvant therapy)，並於手術後繼續單獨使用作為輔助治療用藥(adjuvant therapy)。
- 作為單一療法，治療患有局部晚期、無法手術切除的非小細胞肺癌，且接受放射治療併含鉑化療後病情未惡化的病人。

2.2 小細胞肺癌



- 作為單一療法，治療患有侷限期小細胞肺癌 (LS-SCLC)，且接受同步含鉑化療及放射治療 (cCRT) 後病情未惡化的成人病人。
- 併用 etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一，適用於擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC) 病人的第一線治療。

2.3 膽道癌

與cisplatin及 gemcitabine併用於治療局部晚期或轉移性膽道癌 (biliary tract cancer) 之成人病人。

2.4 肝細胞癌

與tremelimumab併用，適用於治療未曾接受全身性療法之晚期或無法切除之肝細胞癌成人病人。

說明: 本適應症之樞紐性試驗(HIMALAYA試驗)所納入的試驗族群中，在以Child-Pugh評分，主要為Child-Pugh class A病人，少數為Child-Pugh class B病人。

2.5 子宮內膜癌

適用於可接受全身性治療的原發性晚期或復發性子宮內膜癌成人病人之第一線治療，與含鉑化療合併治療後，若未惡化的病人接續以下維持治療：

- 單一療法用於錯配修復功能缺陷 (Mismatch Repair Deficient, dMMR) 的子宮內膜癌病人。
- 併用Olaparib用於錯配修復功能正常 (Mismatch Repair Proficient, pMMR) 的子宮內膜癌病人。

2.6 膀胱癌

與gemcitabine及cisplatin併用，作為成人可切除之肌肉層侵犯型膀胱癌的前導性治療用藥(neoadjuvant therapy)，並於根除性膀胱切除術後，繼續單獨使用作為輔助治療用藥(adjuvant therapy)。

2.7 胃腺癌或胃食道接合處腺癌

與 fluorouracil、leucovorin、oxaliplatin和docetaxel (FLOT)併用，作為可手術切除的胃腺癌或胃食道接合處(GEJ)腺癌成人病人的前導性治療用藥(neoadjuvant therapy)及術後輔助治療用藥(adjuvant therapy)，並作為單一療法接續使用。

3 用法及用量


3.1 用法用量

IMFINZI 單一藥物治療及 IMFINZI 併用其他治療劑，建議劑量請見表 1。[見臨床試驗資料(12)]


IMFINZI稀釋後採靜脈輸注給藥超過60分鐘。[見用法及用量(3.2)]

表1：IMFINZI 建議劑量


適應症	IMFINZI 建議劑量	治療持續時間
-----	--------------	--------



可切除的非小細胞肺癌 (NSCLC) 的前導性及手術後輔助治療	體重30公斤以上之病人： 手術前：每3週一次1500 mg併用含鉑化療*，最多4個週期。 手術後：每4週一次1500 mg單一療法，最多12個週期。 體重未滿30公斤之病人： 手術前：每3週一次20 mg/kg併用含鉑化療*，最多4個週期。 手術後：每4週一次20 mg/kg單一療法，最多12個週期。	直到認定無法手術切除、復發、發生無法耐受毒性為止，或最多術後12個週期。
局部晚期非小細胞肺癌 (NSCLC)	體重30公斤以上之病人： 10 mg/kg，每2週一次，或1500 mg，每4週一次。 體重未滿30公斤之病人： 10 mg/kg，每2週一次。	直到疾病惡化、發生無法耐受的毒性、或最長12個月
侷限期小細胞肺癌 (LS-SCLC)	接受同步含鉑化療及放射治療 (cCRT) 後： 體重30公斤以上的病人： 1,500 mg，每4週一次。 體重未滿30公斤的病人： 20 mg/kg，每4週一次。	直到疾病惡化、發生無法耐受的毒性，或最長24個月
擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC)	體重30公斤以上之病人： 每3週一次 (21 天) 1500 mg併用化療*，共4個週期。之後每4週一次1500 mg單一藥物治療 體重未滿30公斤之病人： 每3週一次 (21 天) 20 mg/kg併用化療，共4個週期。之後每4週一次20 mg/kg單一藥物治療，直到體重增加至30 kg以上為止。	直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止



膽道癌(BTC)	體重30公斤以上的病人： 每3週一次 (21 天) 1500 mg併用化療*，最多8個週期。之後每4週一次1500 mg單一療法。 體重未滿30公斤的病人： 每3週一次 (21 天) 20 mg/kg併用化療*，最多8個週期。之後每4週一次20 mg/kg單一療法。	直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止
晚期或無法切除之肝細胞癌 (uHCC)	體重30公斤以上的病人： 第一週期的第一天給予單一劑量300 mg之 tremelimumab^{\$}，隨後給予1500 mg的IMFINZI。之後每4週使用IMFINZI 1500 mg做為單一治療劑。 體重未滿30 公斤的病人： 第一週期的第一天給予4 mg/kg之 tremelimumab^{\$}，隨後給予20 mg/kg的IMFINZI。之後每4週使用IMFINZI 20 mg/kg做為單一治療劑。	第一週期的合併療法後，每4週給予IMFINZI做為單一治療劑直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止
子宮內膜癌	體重30公斤以上的病人： IMFINZI 1120 mg併用含鉑化療*，每3週 (21 天) 一次，至少4個週期而最多6個週期。隨後每 4 週一次 1500 mg 作為單一療法 (dMMR病人)，或併用 olaparib[#] 300 mg 每日兩次 (pMMR病人)。	直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止
肌肉層侵犯型膀胱癌的術前前導性治療及術後輔助治療用藥	體重 30 公斤以上的病人： 術前前導性治療：手術前每 3 週一次 1500 mg 併用	直到疾病惡化阻礙進行根治性手術、復發、發生無法耐受的毒性為止，或最多術後8個週期。




	gemcitabine及 cisplatin[*]，共 4 個週期。 術後輔助治療：手術後每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg 單一藥物治療，最多 8 個週期。 體重未滿 30 公斤的病人： 術前前導性治療：手術前 每 3 週一次 20 mg/kg 併 用gemcitabine及 cisplatin[*]，共 4 個週期。 術後輔助治療：手術後每 4 週一次 IMFINZI 20 mg/kg 單一藥物治療，最 多 8 個週期。	
胃腺癌或胃食道接合處腺癌的前導性及手術後輔助治療	體重 30 公斤以上的病人： 手術前：每 4 週一次1500 mg 併用 FLOT ^{*±}，最多 2 個週期。 手術後：每 4 週一次1500 mg 併用 FLOT ^{*±}，最多 2 個週期，接著每 4 週一次 1500 mg 單一療法，最多 10 個週期。 體重未滿 30 公斤的病人： 手術前：每 4 週一次 20 mg/kg 併用 FLOT ^{*±}，最 多 2 個週期。 手術後：每 4 週一次 20 mg/kg 併用 FLOT ^{*±}，最 多 2 個週期，接著每 4 週 一次 20 mg/kg 單一療 法，最多 10 個週期。	手術前： 直到疾病惡化而無法進行 根治性手術或無法耐受毒 性為止。 手術後： 直到惡化或復發、無法耐 受毒性，或手術後最多 12 個週期。

*同一天內必須先施用 IMFINZI，再進行化療。與IMFINZI併用的化療藥物用藥劑量請參閱對應之仿單資訊。

\$同一天內必須先施用tremelimumab，再施用IMFINZI。當施用tremelimumab於併用IMFINZI時，參見tremelimumab的仿單劑量資訊。

#當olaparib與IMFINZI併用時，參見olaparib的仿單劑量資訊。



± FLOT化療在每個為期 4 週療程中的第 1 天與第 15 天給藥。[見臨床試驗資料(12.7)]

3.2 調製方式

備藥

- 給藥前，在溶液和藥瓶允許情況下，須檢視藥物產品是否有顆粒物質和變色。如果溶液渾濁、變色或有可見的顆粒，則丟棄小瓶。
- 請勿搖晃小瓶。
- 從IMFINZI小瓶中抽取所需藥量，注入含有0.9%氯化鈉注射液或5%葡萄糖注射液的靜脈注射袋中。輕柔地翻轉以混合稀釋溶液。不要搖晃溶液。稀釋溶液的最終濃度應該在1 mg/mL和15 mg/mL之間。
- 丟棄部分用過或空的IMFINZI小瓶。

輸液的儲存

IMFINZI不含防腐劑。

- 備好的輸液保存在2°C 至 8°C其物理和化學性質已證明可維持 30 天穩定，而保存在室溫（不超過 25°C）其物理和化學性質則已證明可維持 24 小時穩定。但從微生物學的觀點，配製好的輸液應立即使用；如果無法立即使用，則輸液在使用前的存儲時間及條件由使用者負責，從配製起算，在 2°C 至 8°C不應超過 24 小時或在室溫下（最高 25°C）不超過8小時，除非輸液是在受控和經過驗證的無菌條件下進行配製。
- 不要凍結。
- 不要搖晃。

給藥

- 輸液須以具有無菌，低蛋白結合率之0.2或0.22微米(micron)管內過濾器的靜脈輸注管線輸注60分鐘。
- 每個藥品使用單獨的輸注袋、輸注管線和過濾器。

當IMFINZI於併用其他藥品時

- 將所有靜脈輸注藥品分開輸注。
- 不要通過同一條輸注管線同時給予其他藥物。
- 有關含鉑化療，請參閱仿單取得用法用量資訊。
- 有關pemetrexed，請參閱仿單取得用法用量資訊。

合併療法：輸注順序

當IMFINZI於併用tremelimumab時

- 先輸注tremelimumab，接著在同一天輸注IMFINZI。

當IMFINZI於併用化療時

- 先輸注IMFINZI，接著在同一天給予化療。


合併療法：輸注說明

當IMFINZI於併用tremelimumab時

- 給予tremelimumab輸注60分鐘後，觀察60分鐘。隨後於同一天再另外輸注IMFINZI 60分鐘。

3.3 特殊族群用法用量

建議不要減少 IMFINZI 劑量。一般而言，對於嚴重 (第 3 級) 免疫介導性不良反應，IMFINZI 應暫不給藥。對於有生命危險 (第 4 級) 的免疫介導性不良反應、復發且需要




全身性免疫抑制治療的嚴重 (第 3 級) 免疫介導性不良反應，或開始使用皮質類固醇後 12 週內無法將皮質類固醇劑量降至小於等於每天 10 mg prednisone 或等效劑量，IMFINZI 應永久停用。

不適用 IMFINZI 單一療法或是IMFINZI併用tremelimumab 或化療之劑量調整一般準則的不良反應，請見表 2 的說明。

表2：不良反應的建議劑量調整

不良反應	嚴重程度*	劑量調整
免疫介導性不良反應 [見警語及注意事項 (5.1)]		
肺炎	2級	暫不給藥 [†]
	3或4級	永久停藥
結腸炎	2級	暫不給藥 [†]
	3 級	暫不給藥 [†] 或永久停藥 [‡]
	4級	永久停藥
腸穿孔	任何級別	永久停藥
肝炎且腫瘤未侵犯肝臟	ALT或AST增加大於3倍至8倍ULN 或 總膽紅素增加大於1.5倍至3倍ULN	暫不給藥 [†]
	ALT或AST增加大於8倍ULN或總膽紅素增加大於3倍ULN	永久停藥
肝炎且腫瘤侵犯肝臟 [§]	基準點 ALT 或 AST 大於 1 倍至 3 倍 ULN 且增加大於 5 倍至 10 倍 ULN 或 基準點 ALT 或 AST 大於 3 倍至 5 倍 ULN 且增加大於 8 倍至 10 倍 ULN	暫不給藥 [†]
	ALT 或 AST 增加大於 10 倍 ULN 或 總膽紅素增加大於 3 倍 ULN	永久停藥



內分泌異常	第 3 或 4 級	暫不給藥直到臨床狀況穩定或依嚴重度永久停藥
腎炎伴隨腎功能障礙	2 或 3 級血中肌酸酐升高	暫不給藥 [†]
	4 級血中肌酸酐升高	永久停藥
剝落性皮膚病症 (包括類天皰瘡)	疑似 SJS、TEN 或 DRESS	暫不給藥 [†]
	確認 SJS、TEN 或 DRESS	永久停藥
心肌炎 [見警語及注意事項 (5.1)]	2、3或4級	永久停藥
神經學毒性	第 2 級	暫不給藥 [†]
	第 3 或 4 級	永久停藥
其他副作用		
輸注相關反應 [見警語及注意事項 (5.1)]	1或2級	中斷輸注或減緩輸注速度
	3或4級	永久停藥

ALT = 丙胺酸轉胺酶，AST = 天門冬胺酸轉胺酶，DRESS = 藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀，SJS = 史蒂芬強森症候群，TEN = 毒性表皮溶解症，ULN = 正常值上限

*依據美國國家癌症研究所常見不良事件評價標準4.03版。

[†] 逐漸降低皮質類固醇劑量後完全或部分恢復 (0 至 1 級) 的病人，恢復給藥。開始皮質類固醇治療後 12 週內未完全或部分恢復，或開始皮質類固醇後 12 週內劑量無法降至每天 10 mg prednisone 以下 (或等效劑量)，永久停藥。

[‡]IMFINZI與tremelimumab併用時若發生第三級結腸炎時，則永久停用IMFINZI。

§侵犯肝臟的病人，如果基準點 AST 和 ALT 小於等於 ULN，則依據未侵犯肝臟的肝炎病人決定 IMFINZI 暫不給藥或永久停藥。

4 禁忌

無


5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

免疫介導性不良反應

IMFINZI 是單株抗體，此類藥物可與計畫性死亡受體 1 (PD-1) 或計畫性細胞死亡配體 1 (PD-L1) 結合，阻斷 PD-1/PD-L1 路徑而消除免疫抑制，可能破壞周邊耐受性並造成免疫介導性不良反應。警語及注意事項中列出重要的免疫介導性不良反應，但未必涵蓋所有可能的嚴重和致死免疫介導性不良反應。

當 IMFINZI 作為單一療法或與化療併用，或含鉑化療後再IMFINZI單一療法或是IMFINZI與olaparib併用時，其免疫介導性不良反應的發生率和嚴重程度相似，除非另有說明。



免疫介導性不良反應可能嚴重或致命，可發生於任何器官系統或組織。開始 PD-1/PD-L1 阻斷抗體治療後的任何時間，皆有可能發生免疫介導性不良反應。免疫介導性不良反應雖然通常在 PD-1/PD-L1 阻斷抗體治療過程中出現，但也可能在停藥之後出現。

務必及早識別並處置免疫介導性不良反應，確保安全使用 PD-1/PD-L1 阻斷抗體。密切監測病人是否出現可能反映免疫介導性不良反應的臨床表徵和症狀。在基準點和治療期間，應定期評估肝臟酵素、肌酸酐及甲狀腺功能。如果疑似免疫介導性不良反應，應進行適當的診斷檢查以排除其他病因，包括感染。立即進行醫療處置，包括適當的專科諮詢。

根據嚴重程度暫不給藥或永久停用 IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。一般而言，若需要暫停或停止 IMFINZI，應使用全身性皮質類固醇治療 (每日 prednisone 1 mg 至 2 mg/kg 或等效劑量) 直到改善至 1 級以下。改善至 1 級以下後，開始逐步降低皮質類固醇劑量，持續至少 1 個月。病人的免疫介導性不良反應若無法以皮質類固醇治療控制，應考慮使用其他全身性免疫抑制劑。

不一定需要全身性類固醇的不良反應 (例如內分泌異常和皮膚反應)，毒性處置準則討論如下：

免疫性非感染性肺炎

IMFINZI 可能引起免疫介導性肺炎，曾接受過胸腔放射治療的病人，肺炎發生率較高。

使用IMFINZI單一治療劑

近期末接受放射治療的病人

在臨床試驗中使用 IMFINZI 的病人，開始 IMFINZI 治療前通常未進行放射線療法，其免疫介導性肺炎的發生率為 2.4% (34/1414)，包括致命 (<0.1%) 和 3-4 級 (0.4%) 不良反應。34 名病人中有 19 人緩解，有 5 人永久停藥。19 名 (19/34) 在開始 IMFINZI 治療前未接受放化療的肺炎病人，需要全身性皮質類固醇。

開始IMFINZI治療前未接受放化療的病人，IMFINZI不論用於合併分析資料集的各類癌症病人做為單一治療、ES-SCLC 或BTC病人的合併化療，免疫介導性肺炎的發生頻率和嚴重度皆相似。


近期接受過放射治療的病人

在 PACIFIC 試驗中，不可切除的第三期非小細胞肺癌 (NSCLC) 病人在開始 IMFINZI 治療前 42 天內完成根治性放化療，其肺炎 (包括放射性肺炎) 發生率在 IMFINZI 組為 18.3% (87/475)，安慰劑組為 12.8% (30/234)。接受 IMFINZI 的病人中 (475)，1.1% 為致死，2.7% 為 3 級不良反應。87 名病人中有 50 人 (57%) 緩解，有 27 (31%) 人永久停藥。

64 名 (64/87) 在開始 IMFINZI 治療前接受放化療的肺炎病人，需要全身性皮質類固醇，2 人需使用 infliximab 加高劑量類固醇。

在ADRIATIC試驗中，侷限期小細胞肺癌 (LC-SCLC) 病人在開始IMFINZI治療前42天內完成放化療，其肺炎 (包括放射性肺炎) 發生率在IMFINZI組為14.1% (37/262)，安慰劑組為6% (16/265)。接受IMFINZI的病人中 (262)，0.4%為致死性不良反應，2.7%為第3級不良反應。37名病人中有19人 (51%)緩解，有18人 (49%)永久停藥。所有病人皆需要全身性皮質類固醇治療，有1人需使用infliximab加高劑量類固醇。

IMFINZI與Tremelimumab併用



1.3%(5/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性非感染性肺炎，包括致死(0.3%)和第3級不良反應(0.2%)。5位病人中有3位復原，有1位永久停用。所有病人都需接受全身性皮質類固醇，其中4位病人接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。1 位病人(1/5)需要接受其他免疫抑制劑。

免疫介導性結腸炎

IMFINZI 可能引起免疫介導性結腸炎，常伴隨腹瀉。皮質類固醇難治型免疫介導性結腸炎病人，曾有巨細胞病毒 (CMV) 感染/再活化的案例報告。如果發生皮質類固醇難治型結腸炎，應考慮重複進行感染診斷檢查，以排除其他病因。

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，2% (37/1889) 發生免疫介導性結腸炎，包括 4 級 (<0.1%) 和 3 級 (0.4%) 不良反應。37 名病人中有 27 人緩解，有 8 人永久停藥。所有免疫介導性結腸炎病人皆需要全身性皮質類固醇治療，有 2 人 (2/37) 需要其他免疫抑制劑 (如 infliximab、mycophenolate)。

IMFINZI與Tremelimumab併用

6%(23/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性結腸炎或腹瀉，包括第3級不良反應(3.6%)。23位病人中有22位復原，有5位永久停用。所有病人都接受全身性皮質類固醇，23 位病人中有 20 位接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。3 名病人也接受其他免疫抑制劑。在IMFINZI與Tremelimumab併用治療的其他試驗中，病人曾通報腸穿孔。

免疫介導性肝炎

IMFINZI 可能引起免疫介導性肝炎。

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，2.8% (52/1889) 發生免疫介導性肝炎，包括致命 (0.2%)、4 級 (0.3%) 和 3 級 (1.4%) 不良反應。52 名病人有 21 人緩解，有 6 人永久停用 IMFINZI。所有免疫介導性肝炎病人皆需要全身性皮質類固醇治療，有 2 人 (2/52) 需使用 mycophenolate 加高劑量類固醇。


IMFINZI與Tremelimumab併用

7.5%(29/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性肝炎，包括致死(0.8%)、第4級不良反應(0.3%)和第3級不良反應(4.1%)。29位病人中有12位復原，有9位永久停用。所有29位病人都接受全身性皮質類固醇，而全部29位病人都需接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。8 位病人 (8/29)需要接受其他免疫抑制劑。

免疫介導性內分泌病變

腎上腺功能不全：

IMFINZI 可能引起原發性或繼發性腎上腺功能不全。2 級以上腎上腺功能不全，應進行症狀治療，包括視臨床需要使用激素補充療法。根據嚴重程度暫不給藥或永久停用



IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，0.5% (9/1889) 發生免疫介導性腎上腺功能不全，包括 3 級 (<0.1%) 不良反應。9名病人有1人緩解，且未造成任何病人永久停用 IMFINZI。所有腎上腺功能不全病人皆需要全身性皮質類固醇治療；其中大多數仍使用全身性皮質類固醇。

IMFINZI與Tremelimumab併用

1.5%(6/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性腎上腺功能不全，包括第 3 級不良反應(0.3%)。6位病人中有2位復原。所有6位病人都需要接受全身性皮質類固醇，其中有1位接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。

垂體炎：

IMFINZI 可能引起免疫介導性垂體炎。垂體炎可能出現與腫塊效應相關的急性症狀，例如頭痛、畏光或視野缺損。垂體炎可能造成腦下垂體功能低下。視臨床需要展開症狀治療，包括使用激素補充療法。根據嚴重程度暫不給藥或永久停用 IMFINZI[見用法及用量 (3.3)]。

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，<0.1% (1/1889) 發生 3 級垂體炎/腦下垂體功能低下。該病人以全身性皮質類固醇治療，此事件並未造成永久停用 IMFINZI。

IMFINZI與Tremelimumab併用

1%(4/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性腦下垂體炎/腦下垂體功能低下。4位病人中有2位復原。3位病人需接受全身性皮質類固醇，而其中 1 位接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。2位病人另需要內分泌治療。

甲狀腺疾病：


IMFINZI 可能引起免疫介導性甲狀腺疾病。甲狀腺炎可能伴隨或未伴隨內分泌異常，甲狀腺功能亢進之後可能發生甲狀腺功能低下。視臨床需要對甲狀腺功能低下展開激素補充療法，或對甲狀腺功能亢進的醫療處置。根據嚴重程度暫不給藥或停用 IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。

甲狀腺炎：

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，0.5% (9/1889) 發生免疫介導性甲狀腺炎，包括3級 (<0.1%) 不良反應。9 名病人有 4 人緩解，1人永久停藥。免疫介導性甲狀腺炎病人中，有 3 人 (3/9) 需要全身性皮質類固醇治療，8 人 (8/9) 需要內分泌療法。

IMFINZI與Tremelimumab併用



1.5%(6/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性甲狀腺炎。6位病人中有2位復原。2名病人(2/6)需接受全身性皮質類固醇，其中1名接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。所有病人都需要其他治療，包括激素補充療法、thiamazole、carbimazole、propylthiouracil、perchlorate、鈣離子通道阻斷劑或 β 阻斷劑。

甲狀腺功能亢進：

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，2.1% (39/1889) 發生免疫介導性甲狀腺功能亢進。39 名病人中有 30 人緩解，皆未造成永久停藥。免疫介導性甲狀腺功能亢進病人中，有 9 人 (9/39) 需要全身性皮質類固醇治療，35 人 (35/39) 需要內分泌療法。

IMFINZI與Tremelimumab併用

4.6%(18/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性甲狀腺功能亢進，包括第 3 級不良反應(0.3%)。18位病人中有15位復原。2位病人(2/18)需接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。17位病人需要其他治療(thiamazole、carbimazole、propylthiouracil、perchlorate、鈣離子通道阻斷劑或 β 阻斷劑)。

甲狀腺功能低下：

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，8.3% (156/1889) 發生免疫介導性甲狀腺功能低下，包括 3 級 (<0.1%) 不良反應。156名病人有31人緩解，皆未造成永久停藥。有 11 人 (11/156) 需要全身性皮質類固醇治療，而大多數 (152/156) 病人需要長期甲狀腺素補充療法。

IMFINZI與Tremelimumab併用

11%(42/388) 接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性甲狀腺功能低下。42位病人中有5位復原。1 位病人需接受高劑量皮質類固醇治療(每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。所有病人都需要其他治療(thiamazole、carbimazole、propylthiouracil、perchlorate、鈣離子通道阻斷劑或 β 阻斷劑)。


IMFINZI與Carboplatin and Paclitaxel併用

在接受IMFINZI與carboplatin and paclitaxel併用治療的病人中，有14% (34/235) 出現了免疫介導性甲狀腺功能低下。這34名病人中有8位復原。這34名病人中有34名需要進行內分泌療法。

第一型糖尿病，可能伴隨糖尿病酮酸中毒：

監測病人高血糖或其他糖尿病表徵和症狀。視臨床需要開始胰島素治療。根據嚴重程度暫不給藥或永久停用 IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。

使用IMFINZI單一治療劑



接受 IMFINZI 的病人中，<0.1% (1/1889) 發生 3 級免疫介導性第一型糖尿病。該病人需要長期胰島素治療，且永久停用 IMFINZI。另有 2 名病人 (0.1%, 2/1889) 發生需要胰島素治療的高血糖事件，於回報時仍未緩解。

IMFINZI與Tremelimumab併用

2位(0.5% · 2/388)接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾觀察到需要胰島素治療的高血糖，且於最後追蹤時未恢復。

免疫介導性腎炎伴隨腎功能障礙

使用IMFINZI單一治療劑

IMFINZI 可能引起免疫介導性腎炎。

接受 IMFINZI 的病人中，0.5% (10/1889) 發生免疫介導性腎炎，包括 3 級 (<0.1%) 不良反應。10 名病人中有 5 人緩解，有 3 人永久停藥。所有免疫介導性腎炎病人皆需要全身性皮質類固醇治療。

IMFINZI與Tremelimumab併用

1%(4/388)接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性腎炎，包括第 3 級不良反應(0.5%)。4位病人中有3位復原，有2位永久停用。所有病人都需接受全身性皮質類固醇，其中有 3 位接受高劑量皮質類固醇治療 (每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。

免疫介導性皮膚反應

IMFINZI 可能引起免疫介導性皮疹或皮膚炎(包括類天皰瘡)。使用 PD-1/L-1 阻斷抗體曾發生剝落性皮膚炎，包括史蒂芬強森症候群 (SJS)、藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀 (DRESS)、毒性表皮溶解症 (TEN)。外用潤膚劑及/或外用類固醇可能治療輕度至中度非剝落性皮疹。根據嚴重程度暫不給藥或永久停用 IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。

使用IMFINZI單一治療劑

接受 IMFINZI 的病人中，1.8% (34/1889) 發生免疫介導性皮疹或皮膚炎，包括 3 級 (0.4%) 不良反應。34 名病人中有 19 人緩解，有 2 人永久停藥。所有免疫介導性皮疹或皮膚炎病人皆需要全身性皮質類固醇治療。

IMFINZI與Tremelimumab併用

4.9%(19/388)接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性皮疹或皮膚炎，包括第4級(0.3%)和第3級(1.5%)不良反應。19位病人中有13位復原，有2位永久停用。所有病人都需接受全身性皮質類固醇，其中有12位接受高劑量皮質類固醇治療 (每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。有1位病人接受其他免疫抑制劑。

免疫介導性胰臟炎

IMFINZI與Tremelimumab併用可能引起免疫介導性胰臟炎。

IMFINZI與Tremelimumab併用

2.3%(9/388)接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生免疫介導性胰臟炎，包括第4級(0.3%)和第3級(1.5%)不良反應。9位病人中有6位復原。所有9位病人都需接受



全身性皮質類固醇，其中7位接受高劑量皮質類固醇治療 (每天至少 40 毫克 prednisone 或等效藥物)。

其他免疫介導性不良反應

下列臨床上顯著的免疫介導性不良反應，在接受 IMFINZI、IMFINZI與 Tremelimumab併用、或使用其他 PD-1/PD-L1 阻斷抗體的病人中，發生率皆低於 1%。

心臟/血管：心肌炎、心包膜炎、血管炎。

神經系統：腦膜炎、腦炎、脊髓炎和髓鞘脫失、肌無力症候群/重症肌無力 (包括惡化)、格巴二氏症候群、神經麻痺、自體免疫神經病變。

眼部：可能發生葡萄膜炎、虹膜炎及其他眼部發炎毒性。某些個案可能伴隨視網膜剝離。可能發生不同程度的視力受損，包括失明。如果葡萄膜炎伴隨其他免疫介導性不良反應，應評估是否為原田氏症 (Vogt-Koyanagi-Harada 症候群)，可能需使用全身性類固醇治療，以減少永久失明的風險。

胃腸反應：胰臟炎，包括血清澱粉酶及脂酶升高、胃炎、十二指腸炎。

肌肉骨骼和結締組織問題：肌炎/多肌炎、橫紋肌溶解症及相關後遺症包括腎衰竭、關節炎、風濕性多發性肌痛症。

內分泌：副甲狀腺功能低下

其他 (血液/免疫)：溶血性貧血、再生不良性貧血、噬血球性淋巴組織球增生、全身發炎反應症候群、組織球壞死性淋巴結炎 (Kikuchi 淋巴腺炎)、類肉瘤病、免疫性血小板低下、實體器官移植排斥、其他移植排斥 (包括角膜移植)。

輸注相關反應

IMFINZI可能引起嚴重或危及生命的輸注相關反應。

監測輸注相關反應的徵候和症狀。根據嚴重程度中斷，減緩輸注速率或永久停用 IMFINZI [見用法及用量 (3.3)]。對於1級或2級輸注相關反應，考慮在投予後續劑量前先給予預防性藥物 (pre-medications)。

使用IMFINZI單一治療劑

2.2%(42/1889) 接受 IMFINZI的病人發生輸注相關反應，包括3級 (0.3%)不良反應。

IMFINZI與Tremelimumab併用


10位(2.6%)接受IMFINZI併用tremelimumab之病人曾發生輸注相關反應。

使用 IMFINZI 後的異體 HSCT 併發症

病人接受異體造血幹細胞移植 (HSCT) 前後，若使用 PD-1/L-1 阻斷抗體治療，可能發生致死或嚴重併發症。移植相關併發症包括移植物抗宿主疾病 (GVHD)、急性 GVHD、慢性 GVHD、減低劑量調節療法後的肝臟靜脈阻塞疾病，以及需要類固醇的發熱症候群 (未查出感染原因)。即使在 HSCT 和使用 PD-1/L-1 阻斷劑之間，使用介入性療法，仍有可能發生這類併發症。

密切追蹤病人是否發生移植相關併發症，並及時介入治療。異體 HSCT 前後，應考量使用 PD-1/L-1 阻斷抗體治療的效益風險比。

胚胎-胎兒毒性



根據其作用機制和來自動物研究的數據，當給予孕婦時，IMFINZI可能導致胎兒危害。在動物生殖研究中，對食蟹猴從器官形成期開始到分娩給予durvalumab導致早產、胎兒流失和早產新生兒死亡增加。告知孕婦對胎兒的潛在風險。建議有生殖能力的婦女，在使用IMFINZI治療期間和投予IMFINZI末次劑量後3個月都要使用有效的避孕措施[見特殊族群注意事項 (6.1，6.3)]。

血液毒性

當使用olaparib維持治療併用IMFINZI時，接續IMFINZI併用含鉑化療後，出現純紅血球再生不良 (pure red cell aplasia, PRCA) 的案例報告。如果確認為PRCA，應停止IMFINZI及olaparib治療。

當使用olaparib維持治療併用IMFINZI時，接續IMFINZI併用含鉑化療後，出現自體免疫型溶血性貧血 (autoimmune hemolytic anemia, AIHA) 的案例報告。如果確認AIHA，應停止IMFINZI及olaparib治療。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

風險摘要

根據來自動物研究的發現和其作用機制，當給予孕婦時，IMFINZI可能導致胎兒危害[見藥理特性 (10.1)]。沒有關於孕婦使用IMFINZI的可用數據。

在動物生殖研究中，對食蟹猴從確認懷孕起到分娩期間給予durvalumab在比臨床劑量10 mg/kg (以AUC計算) 的暴露量高約6至20倍時，可觀察到早產、胎兒流失和早產新生兒死亡增加(見數據)。已知人免疫球蛋白G1 (IgG1)會穿過胎盤屏障；因此，durvalumab可能會經由母體傳給發育中的胎兒。應告知孕婦本藥品對胎兒的潛在風險。

在美國一般大眾，臨床認定懷孕的主要先天性缺陷和流產的估計背景風險分別為2-4%和15-20%。

數據


動物數據

如文獻中所報導，PD-1/PD-L1途徑藉由維持母體對胎兒的免疫耐受性而扮演維持妊娠的主要作用。在小鼠同種異體懷孕模式中，顯示阻斷PD-L1訊息傳遞會增加胎兒的流失。以食蟹猴的生殖研究評估durvalumab對周產期發育的影響，從確認懷孕起給予durvalumab直到分娩，所給予劑量之暴露量約為臨床劑量10 mg/kg的6至20倍高(以AUC計算)。給予durvalumab導致早產、胎兒流失(流產和死產)和新生兒死亡增加。出生第一天的新生動物血清中可檢測到durvalumab，顯示durvalumab會穿過胎盤。根據其作用機制，胎兒暴露於durvalumab可能會增加免疫調節疾病發生或改變正常免疫反應的風險，而在PD-1基因剔除小鼠中已有免疫調節疾病之報告。

6.2 哺乳

風險摘要

目前沒有關於人類乳汁中存在durvalumab、對哺餵母乳嬰兒的影響、或對乳汁製造影響的數據。已知母體的IgG會分泌至人乳中。尚不清楚IMFINZI局部胃腸道暴露和有限的全身暴露對於哺餵母乳嬰兒造成的影響。Durvalumab存在於哺乳食蟹猴的乳汁中，並且與早產新生兒死亡有關(見數據)。



因為哺餵母乳嬰兒可能會出現不良反應，建議婦女在使用IMFINZI治療期間和給予末次劑量後3個月不要餵母乳。

數據

從食蟹猴確認懷孕起直到分娩給予durvalumab，其暴露量約比在建議臨床劑量10 mg/kg觀察到的水平高6至20倍 (以AUC計算)，則durvalumab會存在於哺乳食蟹猴的乳汁，濃度約為母體血清濃度的0.15%。投予durvalumab導致早產新生兒死亡。

6.3 有生育能力的女性與男性

懷孕檢測

在開始使用 IMFINZI 治療之前應檢查具有生殖能力婦女的懷孕狀態。

避孕

女性

孕婦使用 IMFINZI 可導致胎兒危害[見特殊族群注意事項(6.1)]。建議有生殖能力的婦女，在IMFINZI治療期間和投予最後一次IMFINZI劑量後3個月使用有效的避孕措施。請參閱與IMFINZI併用藥物的仿單，以取得建議避孕持續時間的相關資訊。

6.4 小兒

尚未確立IMFINZI用於小兒病人的安全性和有效性。

6.5 老年人

在 AEGEAN 試驗中，401 名使用 IMFINZI 併用化療治療可手術切除的非小細胞肺癌 (NSCLC) 的病人中，209 名病人 (52%) 年齡在 65 歲以上，49 名病人 (12%) 在 75 歲以上。在安全性或療效方面，65 歲以上病人與較年輕病人之間沒有整體具臨床意義的差異。

在PACIFIC研究中使用IMFINZI治療的476名病人中，45%的年齡是65歲或以上，7.6%的年齡是75歲或以上。在65歲或以上病人和比較年輕的病人之間，沒有觀察到安全性或有效性的總體差異。75歲以上的受試者人數過少，不足以評估75歲以上的病人與相對年輕的病人之間是否有安全性及有效性的差異。


262名LS-SCLC病人接受IMFINZI治療，其中103人 (39%) 為65歲以上，15人 (6%) 為75歲以上。65歲以上病人相對於較年輕的病人，安全性及療效沒有具臨床意義的差異。

265 名 ES-SCLC 病人接受 IMFINZI 併用化療，其中 101 (38%) 人為 65 歲以上，19 (7.2%) 人為 75 歲以上。65 歲以上病人相對於較年輕的病人，在安全性或療效方面並沒有具臨床意義的差異。

在TOPAZ-1試驗中，338名使用IMFINZI併用化療藥物治療BTC的病人中，158名病人 (47%)年齡在65歲以上，38名病人(11%)在75歲以上。65歲以上病人相對於較年輕的病人，沒有觀察到安全性或有效性的總體差異。

393名使用IMFINZI併用tremelimumab治療無法切除之肝細胞癌的病人中，50%病人年齡在65歲以上，13%在75歲以上。65歲以上病人相對於較年輕的病人，在安全性或療效方面並沒有顯著差異。

接受 IMFINZI 併用含鉑化療治療的 235 名子宮內膜癌病人中，49% 的病人年齡為 65 歲以上，12% 為 75 歲以上。在 65 歲以上的病人和較年輕的成人病人之間，未觀察到 IMFINZI 的安全性或有效性的總體差異。



在 NIAGARA 試驗中，共有530 名 MIBC 病人接受 IMFINZI 併用gemcitabine and cisplatin治療，其中 272 人 (51%) 年齡為 65 歲以上，57人 (11%) 為 75 歲以上。在 65 歲以上的病人和較年輕的成人病人之間，未觀察到IMFINZI的安全性或有效性的整體差異。

在 MATTERHORN 試驗中，475 名可手術切除的 GC/GEJC 病人使用 IMFINZI 併用 FLOT 化療，其中 184 人 (39%) 年齡在 65 歲以上，37 人 (8%) 在 75 歲以上。65 歲以上病人相對於較年輕的病人，未觀察到安全性或有效性的整體差異。

7 交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

下列不良反應在說明書的其他部分中有更詳細的討論。

- 免疫介導性不良反應[見警語及注意事項 (5.1)]。
- 輸注相關反應[見警語及注意事項 (5.1)]。


8.2 臨床試驗經驗

由於臨床試驗是在差異很大的條件下進行的，一種藥物臨床試驗中觀察到的不良反應發生率，無法與另一種藥物臨床試驗中的不良反應發生率直接比較，而且可能不會反映在臨床上觀察到的發生率。

在「警語和注意事項」描述的數據反映1889名病人使用IMFINZI作為單一療法的安全性資訊，這些病人來自臨床試驗PACIFIC(一項隨機，安慰劑對照研究，納入475名第三期非小細胞肺癌病人)、臨床試驗1108(一項開放性，非對照研究，納入970名晚期實體腫瘤的病人)，以及臨床試驗ATLANTIC(一項納入444名晚期實體瘤，包含非小細胞肺癌病人的開放性單組試驗)。在這些試驗中，IMFINZI以10 mg/kg的劑量給藥，每2週一次。在1889名病人中，38% 暴露了6個月以上的時間，18%暴露了12個月以上的時間。數據反映來自 ADRIATIC 試驗 (LS-SCLC 病人的隨機分配、雙盲試驗) 的262 名病人對 IMFINZI 1500 mg 單一治療的暴露情況。數據也反映來自 CASPIAN 試驗 (ES-SCLC 病人的隨機、開放性試驗) 的265 名病人、來自TOPAZ-1試驗(BTC病人的隨機、雙盲試驗)的338 名病人及來自AEGEAN試驗(可手術切除NSCLC病人的隨機、雙盲試驗)的401 名病人對 IMFINZI 併用化療的暴露情況。在CASPIAN、TOPAZ-1 及 AEGEAN的試驗中，IMFINZI以1500 mg的劑量給藥，每3或4週一次。

此外，資料顯示在DUO-E試驗中 (一項隨機分配、安慰劑對照的子宮內膜癌試驗)，235名病人接受IMFINZI 1120 mg併用含鉑化療 (每 3 週一次，最多 6 個週期)，接續 IMFINZI 1500 mg單一藥物治療 (每 4 週一次)。在這235名病人中，77% (181 名病人) 接受IMFINZI治療 6 個月以上，41% (96 名病人) 接受治療12個月以上。數據也反映來自HIMALAYA試驗的388名病人對IMFINZI 1500 mg併用 tremelimumab 300 mg的暴露情況。在HIMALAYA試驗中，病人接受IMFINZI 1500 mg併用tremelimumab單次靜脈輸注300mg，接續每4週一次IMFINZI 1500 mg 單一藥物治療。

本節中描述的數據反映在試驗 PACIFIC研究收案的無法手術切除的第三期非小細胞肺癌病人、ADRIATIC試驗收案的侷限期小細胞肺癌 (LS-SCLC) 病人、CASPIAN試驗收



案的擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC) 病人、TOPAZ-1 試驗收案的膽道癌(BTC)病人、HIMALAYA 試驗收案的無法切除之肝細胞癌病人、DUO-E 試驗收案的dMMR子宮內膜癌病人、AEGEAN 試驗收案的可手術切除非小細胞肺癌(NSCLC)病人、NIAGARA 試驗收案的肌肉層侵犯型膀胱癌(MIBC)病人以及MATTERHORN 試驗收案的可手術切除的胃腺癌或胃食道接合處腺癌病人對IMFINZI的暴露。

非小細胞肺癌(NSCLC)


可手術切除的非小細胞肺癌 (NSCLC) – AEGEAN

AEGEAN為一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗，評估 IMFINZI 併用含鉑化療做為前導性治療(neoadjuvant therapy)，並在手術後繼續以 IMFINZI 單獨使用做為輔助治療(adjuvant therapy)的安全性，納入 802 名可手術切除的非小細胞肺癌病人 (第 IIA 期至特定第 IIIB 期 [美國癌症聯合委員會 (AJCC) 第 8 版]；鱗狀或非鱗狀)。安全性資料來自接受 IMFINZI 併用含鉑化療 (n=401) 或安慰劑併用含鉑化療 (n=398) 的 799 名病人。

12.0% 接受 IMFINZI 併用含鉑化療的病人因不良反應而停用 IMFINZI。這些不良反應包括 ($\geq 0.5\%$) 非感染性肺炎、皮疹、周邊神經病變、丙胺酸轉胺酶 (ALT) 升高、免疫介導性肝炎及腹瀉。37.7% 接受 IMFINZI 併用含鉑化療的病人發生嚴重不良反應。至少有 1% 的病人發生之最常見的嚴重不良反應是肺炎、貧血、COVID-19、骨髓抑制、嘔吐、藥物性肝損傷、非感染性肺炎及氣胸。5.7% 接受 IMFINZI 併用含鉑化療的病人發生致死性不良反應。這些致死性不良反應包括 (至少 2 名病人) 肺炎、COVID-19肺炎、COVID-19、敗血症、敗血性休克及間質性肺病。39.9% 病人因不良反應而中斷或延後 IMFINZI 劑量。造成超過 1% 病人需要中斷或延後 IMFINZI 劑量的不良反應包括嗜中性白血球減少、貧血、COVID-19、丙胺酸轉胺酶 (ALT) 升高、非感染性肺炎、天冬胺酸轉胺酶 (AST) 升高、血小板減少、無力、白血球減少、放射性肺炎、上呼吸道感染及肺炎。最常見的不良反應 ($\geq 20\%$ 病人發生) 為貧血、噁心及便秘。

表 3 總結接受 IMFINZI 併用含鉑化療治療病人 ($\geq 10\%$) 發生的不良反應。


表 3：AEGEAN 試驗中發生在 10% 以上病人的不良反應



	IMFINZI併用含鉑化療 N=401		安慰劑併用含鉑化療 N=398	
不良反應	所有級別(%)	第3或第4級 (%)	所有級別(%)	第3或第4級 (%)
任何不良反應	96.5	42.4	94.7	43.2
貧血	33.9	6.5	31.7	6.5
噁心	25.2	0.2	28.9	0.3
便秘	24.9	0.2	21.1	0
食慾減退	18.2	0.2	17.6	0.3
禿頭	17.2	0	15.8	0.3
嗜中性白血球 低下	17.0	9.0	17.8	9.5
嗜中性白血球 數目下降	16.0	9.7	14.3	10.8
皮疹	14.0	0.5	8.5	0.3
腹瀉	13.0	0.7	12.3	0.8
疲勞	13.0	0	11.6	0.3
無力	12.6	0	13.6	1.3
搔癢	11.7	0.2	5.5	0
嘔吐	11.2	0.7	10.6	1.0
處置疼痛	11.0	0.2	12.1	0.5
失眠	10.2	0	11.6	0
COVID-19	10.2	0.2	8.0	0.3
關節炎	9.2	0.2	12.1	0.3
咳嗽	8.2	0	10.8	0

表 4 總結接受 IMFINZI 併用含鉑化療治療的病人所發生的實驗室檢驗值異常。

表 4：AEGEAN 試驗中發生在 20% 以上*病人的實驗室檢驗值異常 (與基準點相比惡化)



	IMFINZI 併用含鉑化療	安慰劑併用含鉑化療
實驗室檢驗值異常	第 3 或第 4 級 [†] (%) [‡]	第 3 或第 4 級 [†] (%) [‡]
化學		
低血鈉症	5.3	5.8
低血鎂症	2.8	3.6
低血鈣症	3.3	4.5
低血鉀症	3.5	5.1
高血鉀症	1.5	2.0
肌酸酐濃度升高	2.3	3.3
ALT 升高	5.8	2.0
AST 升高	3.5	1.8
GGT 升高	4.7	2.1
澱粉酶升高	4.7	3.6
脂酶升高	4.9	6.9
血液學		
嗜中性白血球減少症	24	27
白血球減少	12	11
淋巴球減少	11	9
貧血	10	9
血小板減少	7	8

*頻率的切點計算是基於任一級別與基準點相比的改變。


[†]依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 5.0 版分級。

[‡] 每一個檢測事件是依據同時有基準點和至少一個在研究中可取得實驗室檢驗值的病人數：IMFINZI (範圍：202 至 399) 和安慰劑併用化療 (範圍：212 至 398)。

第三期非小細胞肺癌(NSCLC)- PACIFIC

PACIFIC研究評估了IMFINZI用於在啟用研究藥物前的42天內完成同步含鉑藥物放化療的第三期NSCLC病人的安全性，其為一項多中心，隨機，雙盲，安慰劑對照試驗。總共475名病人接受IMFINZI 10 mg/kg靜脈注射，每2週一次。該研究排除了放化療後疾病惡化、患有活動性自體免疫疾病或在進入試驗前2年內有自體免疫疾病、或患有需要全身性免疫抑制劑的疾病的人[見臨床試驗資料(12.1)]。

研究人群特徵為：中位年齡64歲 (範圍：23-90歲)，45%年滿65歲或以上，70%男性，69%白人，27%亞洲人，75%先前吸煙者，16%目前吸煙者，51%病人的WHO




表現狀態為1分。所有病人均按照研究計畫接受根治性放療，其中92%的病人接受的總放射劑量為54 Gy至66 Gy。暴露於IMFINZI的中位時間為10個月 (範圍：0.2至12.6個月)。

15%的病人因為不良反應停用IMFINZI。最常導致IMFINZI停藥的不良反應是在6%的病人發生的肺炎或放射性肺炎。29%接受IMFINZI的病人發生了嚴重不良反應。至少有2%的病人發生之最常見的嚴重不良反應是肺炎或放射性肺炎(pneumonitis or radiation pneumonitis，7%) 和肺炎 (pneumonia，6%)。小於2%的病人發生致死性肺炎(pneumonitis)或放射性肺炎和致死性肺炎(pneumonia)，發生率在兩組相似。最常見的不良反應 (≥20%的病人發生) 為咳嗽、疲勞、肺炎(pneumonitis)或放射性肺炎、上呼吸道感染、呼吸困難和皮疹。表5總結了使用IMFINZI治療的病人至少有10%發生的不良反應。

表5：PACIFIC研究中≥10%病人發生的不良反應

	IMFINZI N=475		安慰劑 N=234	
不良反應	所有級別 (%)	3-4 級 (%)	所有級別 (%)	3-4 級 (%)
呼吸道、胸部和縱膈發生異常				
咳嗽/咳嗽有痰	40	0.6	30	0.4
肺炎 (pneumonitis) */放射性肺炎	34	3.4	25	3
呼吸困難†	25	1.5	25	2.6
胃腸消化系統的異常				
腹瀉	18	0.6	19	1.3
腹痛‡	10	0.4	6	0.4
內分泌異常				
甲狀腺低能症§	12	0.2	1.7	0
皮膚和皮下組織產生異常				
皮疹¶	23	0.6	12	0
搔癢#	12	0	6	0
全身性的障礙				
疲倦P	34	0.8	32	1.3
發熱	15	0.2	9	0



感染				
上呼吸道感染 ^β	26	0.4	19	0
肺炎 (pneumonia) ^à	17	7	12	6

*包括急性間質性肺炎、間質性肺病、肺炎(pneumonitis)、肺纖維化

†包括呼吸困難和運動性呼吸困難 (exertional dyspnea)

#包括腹痛、下腹痛、上腹痛和腰痛

§包括自體免疫性甲狀腺低能症和甲狀腺低能症

¶包括紅疹、泛發性皮疹、斑疹、斑丘疹、丘疹、搔癢性皮疹、膿皰疹、紅斑、濕疹、皮疹和皮炎

#包括泛發性搔癢症和搔癢症

▷ 包括虛弱和疲勞


β 包括喉炎、鼻咽炎、扁桃體周圍膿腫、咽炎、鼻炎、鼻竇炎、扁桃體炎、氣管支氣管炎和上呼吸道感染

à 包括肺部感染、肺囊蟲肺炎、肺炎(pneumonia)、腺病毒性肺炎、細菌性肺炎、巨細胞病毒性肺炎、嗜血桿菌性肺炎、克雷白氏肺炎、壞死性肺炎、肺炎球菌性肺炎和鏈球菌性肺炎

在使用IMFINZI治療的病人中，不到10%病人發生的其他不良反應是發聲困難、排尿困難、夜間盜汗、周邊水腫和增加感染機會。表6總結了在使用IMFINZI治療的病人中，至少20%的病人發生的實驗室異常。

表6：PACIFIC研究中≥20%病人發生的實驗室異常(與基期相比惡化)

	IMFINZI		安慰劑	
實驗室異常	所有級別 * (%) [†]	3或4級 (%)	所有級別* (%) [†]	3或4級 (%)
化學				
高血糖	52	8	51	8
低鈣血症	46	0.2	41	0
ALT升高	39	2.3	22	0.4
AST升高	36	2.8	21	0.4
低鈉血症	33	3.6	30	3.1
高鉀血症	32	1.1	29	1.8
GGT升高	24	3.4	22	1.7
血液學				



淋巴球減少	43	17	39	18
-------	----	----	----	----

*根據NCI CTCAE 4.0版分級

†各項檢查的發生率是根據具有基線值和至少一次研究期間可用實驗室測量值的病人數：IMFINZI (範圍：464至470) 和安慰劑 (範圍：224至228)

小細胞肺癌

侷限期小細胞肺癌 – ADRIATIC

ADRIATIC是一項多中心、隨機分配、雙盲的安慰劑對照試驗，評估了IMFINZI單一療法用於未發生疾病惡化的LC-SCLC病人的安全性，病人在開始接受試驗藥物之前42天內完成同步含鉑藥物放化療 (60-66 Gy，每日一次 (QD)，持續6週；或45 Gy，每日兩次 (BID)，持續3週)。總計262名病人接受IMFINZI 1,500 mg，每4週一次。治療持續進行，直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性，或最多24個月。試驗排除了放化療後可接受手術的病人、有活動性或先前確診的自體免疫疾病，或需要全身性皮質類固醇或免疫抑制劑治療的病人[參見臨床試驗 12.2]。

試驗人口特性資料為：中位年齡62歲 (範圍：28-84 歲)，39%年滿65歲以上，6%年滿75歲以上，69%男性，50%白人，48%亞洲人，1.3%其他種族，4.2%西語裔或拉丁裔，68%先前吸煙者，22%目前吸煙者，51%病人的WHO體能狀態為1分。67%病人接受的總放射劑量為60 Gy 至66 Gy QD，27%病人接受的總放射劑量為45 Gy BID。

IMFINZI組暴露於IMFINZI的持續時間中位數為9.2個月 (範圍：0.92至25個月)。


30%接受IMFINZI的病人發生嚴重不良反應。接受IMFINZI的病人發生之最常見($\geq 1\%$)的嚴重不良反應為非感染性或放射性肺炎 (pneumonitis or radiation pneumonitis, 12%)及肺炎(5%)。2.7%接受IMFINZI的病人發生致命的不良反應，包括肺炎 (1.5%)、心臟衰竭、腦病變、及非感染性肺炎 (pneumonitis, 0.4%)。

16%接受IMFINZI的病人由於不良反應而永久停用IMFINZI。導致1%以上病人停用IMFINZI的不良反應包括非感染性肺炎或放射性肺炎(pneumonitis or radiation pneumonitis, 4.6%)、和肺炎 (1.5%)。35%病人因不良反應而中斷IMFINZI劑量。造成5%以上病人需要中斷IMFINZI劑量的不良反應包括非感染性肺炎或放射性肺炎 (pneumonitis or radiation pneumonitis, 17%)。最常見的不良反應 ($\geq 20\%$ 病人發生) 為非感染性肺炎或放射性肺炎(pneumonitis or radiation pneumonitis, 38%)及疲倦(21%)。

表7總結ADRIATIC試驗中，病人使用IMFINZI治療發生的不良反應。

表7：ADRIATIC試驗中接受IMFINZI治療的LS-SCLC病人的不良反應($\geq 10\%$)

	IMFINZI (n=262)		安慰劑 (n=265)	
不良反應	所有級別(%)	第3-4級(%)	所有級別(%)	第3-4級(%)
呼吸道、胸腔及縱膈腔異常				
非感染性肺炎或放射性肺炎*	38	3.1	30	2.6
咳嗽/咳嗽有痰	17	0	14	0



	IMFINZI (n=262)		安慰劑 (n=265)	
不良反應	所有級別(%)	第3-4級(%)	所有級別(%)	第3-4級(%)
呼吸困難 [†]	11	0.4	7	0
全身性的障礙				
疲倦 ^è	21	0.4	20	2.3
皮膚和皮下組織產生異常				
皮疹 [‡]	18	0.4	11	0
搔癢	13	0	7	0
內分泌系統異常				
甲狀腺功能低下 [¶]	17	0	4.9	0
甲狀腺功能亢進 [#]	12	0	1.9	0
代謝和營養方面的異常				
食慾降低	17	0	13	0
神經系統異常				
暈眩 ^β	14	0	9	0
感染及寄生蟲				
肺炎 [§]	13	3.1	9	4.2
胃腸道異常				
嘔吐	13	0	11	0
腹瀉	11	1.9	8	0
便秘	10	0	10	0

* 包括非感染性肺炎、免疫介導型肺炎、間質性肺病、放射性肺炎及放射性肺纖維化。


[†] 包括呼吸困難和運動性呼吸困難 (exertional dyspnea)。

^è 包括疲勞和虛弱。

[‡] 包括皮膚炎、痤瘡樣皮膚炎、濕疹、皮疹、斑丘疹、丘疹、搔癢性皮炎和皮膚剝脫。

[¶] 包括甲狀腺功能低下，血中促甲狀腺激素升高，以及遊離甲狀腺素降低。

[#] 包括甲狀腺功能亢進、血中促甲狀腺激素降低、遊離甲狀腺素升高、甲狀腺素增加、遊離三碘甲狀腺原氨酸升高和三碘甲狀腺原氨酸升高。



§ 包括肺炎、非典型肺炎、下呼吸道感染、細菌性肺炎、肺囊蟲肺炎、退伍軍人菌性肺炎、病毒性肺炎。

β 包括暈眩、姿勢性暈眩、眩暈和位置眩暈。

表8總結了使用IMFINZI治療的病人中，至少20%病人發生的實驗室異常。

表8：ADRIATIC試驗中，接受IMFINZI治療的LS-SCLC病人，發生比基準點惡化(20%以上)實驗室檢驗值

實驗室檢驗值 異常*	IMFINZI(n=262) [†]		安慰劑(n=265) [‡]	
	所有級別(%)	第3或4級(%)	所有級別(%)	第3或4級(%)
化學				
肌酸酐升高	86	0	81	0.8
低血鈣症	43	0	43	0.8
高血糖	38	3.2	45	1.5
丙胺酸轉胺酶(ALT)升高	36	2.3	29	2.3
天冬胺酸轉胺酶(AST)升高	33	2.3	28	1.5
丙麩胺酸轉移酶升高	32	7	27	2.9
血鈉降低	32	5	29	6.2
血鉀升高	23	1.2	17	0.8
血液學				
淋巴球減少	34	10	33	10
白血球減少	26	0.4	33	1.1


* 依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 4.03 版分級。

[†] 以具有基準點和至少一個治療後數值的病人人數做為分母計算發生率，人數從63至259不等。

[‡] 以具有基準點和至少一個治療後數值的病人人數做為分母計算發生率，人數從65至262不等。

擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC) – CASPIAN

一項隨機、開放性、多中心、有效療法對照的 CASPIAN 試驗，針對之前未治療的擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC) 病人，評估 IMFINZI 併用 etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一的安全性。總計 265 名病人每 3 週一次接受 IMFINZI 1500 mg 併



用化療，共 4 個週期，之後接受 IMFINZI 每 4 週一次 1500 mg，直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止。試驗排除有活動性或先前確診的自體免疫疾病、或需要全身性類固醇或免疫抑制劑治療的病人 [見臨床試驗資料 (12.2)]。在 265 名接受 IMFINZI 治療的病人中，49% 暴露了 6 個月以上的時間，19% 暴露了 12 個月以上的時間。


在 266 名只接受化療的病人中，57% 接受了 6 次化療，8% 在化療後接受了 PCI (預防性腦部放射治療)。

7% 接受 IMFINZI 加化療的病人因不良反應而停用 IMFINZI。這些包括非感染性肺炎、肝毒性、神經毒性、敗血症、糖尿病酮酸中毒和全血球減少症 (各一位病人)。31% 接受 IMFINZI 加化療的病人發生嚴重不良反應。至少有 1% 的病人發生之最常見的嚴重不良反應是嗜中性白血球減少合併發燒 (4.5%)、肺炎 (2.3%)、貧血 (1.9%)、全血球減少 (1.5%)、非感染性肺炎 (1.1%) 和慢性阻塞性肺病 (1%)。4.9% 接受 IMFINZI 加化療的病人發生致死性不良反應。這些包括全血球減少、敗血症、敗血性休克、肺動脈栓塞、肺栓塞和肝炎 (各一位病人)，以及猝死 (2 位病人)。最常見的不良反應 ($\geq 20\%$ 的病人發生) 為噁心、疲倦/虛弱和掉髮。

表 9 總結病人使用 IMFINZI 加化療治療發生的不良反應。

表 9：CASPIAN 試驗中發生在 10% 以上病人的不良反應

	IMFINZI 併用 etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一 N=265		Etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一 N=266	
不良反應	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)
呼吸道、胸部和縱膈發生異常				
咳嗽/咳嗽有痰	15	0.8	9	0
胃腸道異常				
噁心	34	0.4	34	1.9
便秘	17	0.8	19	0
嘔吐	15	0	17	1.1
腹瀉	10	1.1	11	1.1
內分泌系統異常				
甲狀腺功能亢進*	10	0	0.4	0
皮膚和皮下組織的異常				
禿髮	31	1.1	34	0.8
皮疹 [†]	11	0	6	0
全身性問題及施用部位症狀				



	IMFINZI 併用 etoposide以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一 N=265		Etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一 N=266	
不良反應	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)
疲倦/虛弱	32	3.4	32	2.3
代謝和營養方面的異常				
食慾降低	18	0.8	17	0.8


* 包括甲狀腺功能亢進和巴塞多氏症 (Basedow's disease)

† 包括紅疹、泛發性皮疹、斑疹、斑丘疹、丘疹、搔癢性皮疹、膿疱疹、紅斑、濕疹、皮疹和皮炎

表10 總結發生在20%以上病人使用 IMFINZI 加化療治療發生的實驗室檢驗值異常

表10：CASPIAN 試驗中發生在20%以上*病人的實驗室檢驗值異常 (與基準點相比惡化)

	IMFINZI 併用 Etoposide 以及 Carboplatin 或 Cisplatin 兩者之一 (N=265)	Etoposide 以及 Carboplatin 或 Cisplatin 兩者之一 (N=266)
實驗室檢驗值異常	3 或 4 級 [†] (%) [‡]	3 或 4 級 [†] (%) [‡]
化學		
低血鈉	11	13
低血鎂	11	6
高血糖	5	5
鹼性磷酸酶 (ALP) 升高	4.9	3.5
ALT升高	4.9	2.7
AST升高	4.6	1.2
低血鈣	3.5	2.4
血中肌酸酐升高	3.4	1.1
高血鉀	1.5	3.1
促甲狀腺激素降低 <LLN [§] 且在基準點時 ≥LLN	不適用	不適用
血液學		



嗜中性白血球減少	41	48
淋巴球減少	14	13
貧血	13	22
血小板減少	12	15

* 頻率的切點計算是基於任一級別與基準點相比的改變

† 根據NCI CTCAE 4.03版分級

‡ 每一個檢測事件是依據同時有基準點和至少一個在研究中可取得實驗室檢驗值的病人數: IMFINZI (範圍: 258到263) 和化療 (範圍: 253到262), 除了鎂: IMFINZI加化療 (18)和化療 (16)


§ LLN: 正常值下限

膽道癌

一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心的 TOPAZ-1 試驗, 評估 IMFINZI 併用 gemcitabine 及 cisplatin 治療局部晚期或轉移性 BTC 的安全性。338 名病人每 3 週一次接受 IMFINZI 1500 mg 併用gemcitabine及cisplatin, 最多 8 個週期, 之後每 4 週一次接受 IMFINZI 1500 mg, 直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止。本試驗排除患有活性或病歷記載曾患自體免疫或發炎性疾病、人類免疫缺乏病毒感染或其他活性感染的病人, 包括結核病或 C 型肝炎 [參見臨床試驗 (12.2)]。

6% 接受 IMFINZI 併用化療的病人因不良反應而停用 IMFINZI, 最常導致停藥的事件為敗血症 (3 名病人) 及缺血性中風 (2 名病人)。其餘事件分布於各系統器官分類, 各有一名病人通報。47% 接受 IMFINZI 併用化療的病人發生嚴重不良反應, 最常見的嚴重不良反應 (發生於至少 2% 病人) 為膽管炎 (7%)、發熱 (3.8%)、貧血 (3.6%)、敗血症 (3.3%)、急性腎損傷 (2.4%)。3.6% 接受 IMFINZI 併用化療的病人發生致命不良反應, 包括缺血性或出血性中風(4名病人)、敗血症(2名病人)、上胃腸道出血(2名病人)。最常見的不良反應 (發生於 $\geq 20\%$ 病人) 為倦怠、噁心、便秘、食慾減退、腹痛、紅疹及發熱。表11總結接受 IMFINZI 併用化療的病人所發生的不良反應。

表 11 : TOPAZ-1 試驗中發生於 $\geq 10\%$ 病人的不良反應



	IMFINZI 併用 Gemcitabine 及 Cisplatin (N = 338)		安慰劑併用 Gemcitabine 及 Cisplatin (N = 342)	
不良反應	所有級別* (%)	第 3-4 級* (%)	所有級別* (%)	第 3-4 級* (%)
全身性的障礙和投藥部位狀況				
倦怠 [†]	42	6	43	6
發熱	20	1.5	16	0.6
胃腸道異常				
噁心	40	1.5	34	1.8
便秘	32	0.6	29	0.3
腹痛 [‡]	24	0.6	23	2.9
嘔吐	18	1.5	18	2.0
腹瀉	17	1.2	15	1.8
代謝和營養方面的異常				
食慾減退	26	2.1	23	0.9
皮膚/皮下組織的異常				
皮疹 [§]	23	0.9	14	0
搔癢	11	0	8	0
精神方面的異常				
失眠	10	0	11	0

* 依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 5.0 版分級


† 包括倦怠、無力、癌症疲倦及虛弱。

‡ 包括腹痛、下腹部疼痛、上腹部疼痛及腰痛。

§ 包括斑疹、斑丘疹、麻疹、丘疹、搔癢性皮疹、膿疱疹、紅斑疹、痤瘡樣皮膚炎、大皰性皮膚炎、藥疹、濕疹、紅斑、皮膚炎及皮疹。

表12總結接受 IMFINZI 併用化療的病人所發生的實驗室檢驗異常。

表12：TOPAZ-1試驗中發生在20%以上*病人的實驗室檢驗值異常 (與基準點相比惡化)




	IMFINZI 併用 Gemcitabine 及 Cisplatin	安慰劑併用 Gemcitabine 及 Cisplatin
實驗室檢驗值異常	第 3 或 4 級 [†] (%)	第 3 或 4 級 [†] (%)
化學		
低血鈉	18	13
丙麩胺醯轉移酶(GGT)升高	12	13
膽紅素升高	10	14
低血鉀	8	4.4
AST升高	8	8
ALT升高	7	6
血中肌酸酐升高	5	2.1
低血鎂	4.5	2.2
低白蛋白血症	3.6	2.9
高血鉀	2.1	2.1
鹼性磷酸酶(ALP)升高	1.8	3.8
低血鈣	1.8	2.4
血液學		
嗜中性白血球減少	48	49
貧血	31	28
白血球減少	28	28
淋巴細胞減少	23	15
血小板減少	18	18

*頻率是基於自基準點的所有等級變化

†依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 5.0 版分級。每種檢驗的發生率依據有基準值及至少一次試驗期間實驗室檢驗測量值的病人數：IMFINZI 併用 Gem/Cis (範圍：312-335) 及安慰劑併用 Gem/Cis (範圍：319-341)。

肝細胞癌

經由隨機分配、開放性、多中心的HIMALAYA 試驗，評估388位 IMFINZI 併用 tremelimumab治療肝細胞癌病人的安全性 [參見臨床試驗 (12.4)]。病人於同一天接受



單一次IMFINZI 1500 mg靜脈輸注併用tremelimumab 300 mg及之後每 4 週接受IMFINZI 或每日口服兩次sorafenib 400 mg。

41%接受IMFINZI 併用tremelimumab治療的病人發生嚴重不良反應。超過1%病人的嚴重不良反應包括出血 (6%)、腹瀉 (4%)、敗血症 (2.1%)、肺炎 (pneumonia, 2.1%)、皮疹 (1.5%)、嘔吐 (1.3%)、急性腎損傷 (1.3%) 和貧血 (1.3%)。8%接受IMFINZI 併用tremelimumab治療的病人發生致死性的不良反應，包括死亡 (1%)、顱內出血 (0.5%)、心臟驟停 (0.5%)、肺炎 (pneumonitis, 0.5%)、肝衰竭 (0.5%) 和免疫介導性肝炎 (0.5%)。最常見的不良反應($\geq 20\%$ 病人)是皮疹、腹瀉、疲勞、瘙癢、肌肉骨骼疼痛和腹痛。


14%的病人因不良反應永久終止治療；導致治療中斷($\geq 1\%$)的最常見不良反應是出血 (1.8%)、腹瀉(1.5%)、AST升高(1%)和肝炎(1%)。

35% 的病人因不良反應導致劑量中斷或治療延遲。 $\geq 1\%$ 的病人需要中斷或延遲給藥的不良反應包括ALT升高(3.6%)、腹瀉(3.6%)、皮疹(3.6%)、澱粉酶升高(3.4%)、AST升高(3.1%)、脂肪酶升高(2.8%)、肺炎(pneumonia, 1.5%)、肝炎(1.5%)、發熱(1.5%)、貧血(1.3%)、血小板減少(1%)、甲狀腺功能亢進(1%)、肺炎(pneumonitis, 1%) 和血肌酐增加(1%)。

表13為 HIMALAYA 試驗中接受IMFINZI與tremelimumab併用治療的病人所發生不良反應之摘要。

表 13：HIMALAYA 試驗中 $\geq 10\%$ 的病人發生的不良反應

	IMFINZI與tremelimumab併用 (N=388)		Sorafenib (N=374)	
不良反應	全部級別(%)	3-4級(%)	全部級別(%)	3-4級 (%)
腸胃道疾病				
腹瀉*	27	6	45	4.3
腹痛*	20	1.8	24	4
噁心	12	0	14	0
皮膚和皮下組織疾病				
皮疹*	32	2.8	57	12
瘙癢	23	0	6	0.3
代謝和營養疾病				
食慾下降	17	1.3	18	0.8
一般疾病和施打部位狀況				
疲勞*	26	3.9	30	6
發熱*	13	0.3	9	0.3




	IMFINZI與tremelimumab併用 (N=388)		Sorafenib (N=374)	
不良反應	全部級別(%)	3-4級(%)	全部級別(%)	3-4級 (%)
精神疾病				
失眠	10	0.3	4.3	0
內分泌失調				
甲狀腺功能低下*	14	0	6	0
肌肉骨骼和結締組織疾病				
肌肉骨骼疼痛*	22	2.6	17	0.8

* 表示為多個相關名詞的組合

表14為 HIMALAYA 試驗中接受 IMFINZI 與 tremelimumab併用治療的病人所發生的實驗室數據異常。

表 14：HIMALAYA 試驗中≥20%的病人出現的實驗室數據異常(與基期相比惡化)

	IMFINZI與tremelimumab併用		Sorafenib	
實驗室數據異常	任何級別 [†] (%) [‡]	等級3 [†] 或4 (%) [‡]	任何級別 [†] (%) [‡]	等級3 [†] 或4 (%) [‡]
化學				
天冬氨酸轉氨酶(AST)升高	63	27	55	21
丙氨酸轉氨酶(ALT)升高	56	18	53	12
鈉降低	46	15	40	11
膽紅素升高	41	8	47	11
鹼性磷酸酶(ALP)升高	41	8	44	5
血糖升高	39	14	29	4
鈣降低	34	0	43	0.3
白蛋白降低	31	0.5	37	1.7
鉀升高	28	3.8	21	2.6



	IMFINZI與tremelimumab併用		Sorafenib	
實驗室數據異常	任何級別 [†] (%) [‡]	等級3 [†] 或4 (%) [‡]	任何級別 [†] (%) [‡]	等級3 [†] 或4 (%) [‡]
肌酐 (creatinine)升高	21	1.3	15	0.9
血液學				
血紅素減少	52	4.8	40	6
淋巴球減少	41	11	39	10
血小板減少	29	1.6	35	3.1
白血球減少	20	0.8	30	1.1

[†] 根據 NCI CTCAE 4.03 版分級。

[‡] 每項測試的發生率均基於同時具有基期和至少一項研究實驗室數據測量值的病人數量：IMFINZI 與 tremelimumab (367-378)和sorafenib (344-352)。

子宮內膜癌

晚期或復發性子宮內膜癌 – DUO-E 試驗

DUO-E 是一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗，探討晚期或復發性子宮內膜癌成人病人接受 IMFINZI 併用含鉑化療，接續 IMFINZI 單一療法或併用 olaparib 的安全性 [請見臨床試驗 (12.5)]。病人接受以下任一治療：

- 含鉑化療 + IMFINZI + olaparib：含鉑化療併用 IMFINZI (每 3 週一次 1120 mg) 最多 6 個 21 天週期，接續 IMFINZI (每 4 週一次 1,500 mg) 併用 olaparib 錠劑 300 mg，每日兩次口服 (N=238)
- 含鉑化療 + IMFINZI：含鉑化療併用 IMFINZI (每 3 週一次 1120 mg) 最多 6 個 21 天週期，接續 IMFINZI (每 4 週一次 1,500 mg) (N=235)，或
- 含鉑化療：含鉑化療單一療法 (N=236)。

持續治療直到疾病惡化，或發生無法耐受的毒性。


在整體試驗中，含鉑化療 + IMFINZI 組病人的停藥或死亡時間中位數為 9.9 個月，含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組為 15.1 個月，含鉑化療組為 8.8 個月。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人

在整體試驗中，隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人，未發生與任一治療具有因果關係的致命不良反應。

在整體試驗中，隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人，有 17% 發生與任一治療具有因果關係的嚴重不良反應。最常見的嚴重不良反應 (≥2%) 為嗜中性白血球減少 (包括嗜中性白血球減少合併發燒) (4%)。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人，有 34% 由於發生不良反應而中斷 IMFINZI 給藥。造成 IMFINZI 中斷給藥的最常見 (≥2%) 不良反應，包括血小板減少 (13%)、嗜中性白血球減少 (10%)、貧血 (9%)、甲狀腺功能低下 (2.6%)、皮疹 (2.1%)、AST/ALT 升高 (2.1%)。



隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人，有 7% 由於發生不良反應而停用 IMFINZI。造成停用 IMFINZI 的最常見 ($\geq 1\%$) 不良反應為貧血 (1.7%) 和皮疹 (1.3%)。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI 組接受試驗治療的病人，對任一試驗治療最常見的不良反應 (發生於 $\geq 20\%$ 的病人)，包括周邊神經病變、掉髮、倦怠、噁心、腹瀉、便秘、皮疹、腹痛、嘔吐。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人

在整體試驗中，隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人，未發生與任一治療具有因果關係的致命不良反應。

在整體試驗中，隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人，有 23% 發生與任一治療具有因果關係的嚴重不良反應。最常見的嚴重不良反應 ($\geq 2\%$) 為貧血 (7%) 及嗜中性白血球減少 (包括嗜中性白血球減少合併發燒) (4%)。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人，有 38% 由於發生不良反應而中斷 IMFINZI 給藥。造成 IMFINZI 中斷給藥的最常見 ($\geq 2\%$) 不良反應，包括貧血 (13%)、嗜中性白血球減少 (10%)、血小板減少 (12%)、白血球減少 (2.9%)、上呼吸道感染 (2.1%)、甲狀腺功能低下 (2.1%)。


隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人，有 4% 由於發生不良反應而停用 IMFINZI。造成停用 IMFINZI 的最常見 ($\geq 1\%$) 不良反應為非感染性肺炎 (1.7%)。

隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人，對任一試驗治療最常見的不良反應 (發生於 $\geq 20\%$ 的病人)，包括噁心、倦怠、周邊神經病變、掉髮、便秘、腹瀉、嘔吐、皮疹、腹痛、食慾減退。


表 15 及表 16 分別摘述 DUO-E 試驗中的不良反應及實驗室檢驗異常。關於 DUO-E 試驗中的不良反應，詳細資訊請見 olaparib 或含鉑化療處方資訊。

表 15：DUO-E 試驗中 $\geq 10\%$ 病人報告的不良反應*

不良反應	含鉑化療 + IMFINZI + Olaparib [†] (N=238)		含鉑化療 + IMFINZI [‡] (N=235)		含鉑化療 (N=236)	
	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)
內分泌系統異常						
甲狀腺功能低下 [^]	16	0	17	0	4.7	0
胃腸道異常						
噁心 ^δ	55	2.9	41	0.4	44	1.3
便秘 ^δ	33	0	27	0.9	34	2.1
腹瀉	28	1.3	31	1.7	28	2.5
嘔吐 ^δ	26	0.4	21	1.7	18	1.3



不良反應	含鉑化療 + IMFINZI + Olaparib [†] (N=238)		含鉑化療 + IMFINZI [‡] (N=235)		含鉑化療 (N=236)	
	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)
腹痛 [@]	24	1.3	25	0.4	25	1.3
口腔炎 ^δ	11	0	9	0	10	0
全身性異常及施用部位症狀						
倦怠 ^δ	54	5	43	3.4	44	3
周邊水腫 [#]	16	0.4	15	0.9	11	0.4
發熱	10	0	9	0.4	8	0.4
感染及寄生蟲						
上呼吸道 感染 [§]	10	0	9	0	10	0
代謝及營養異常						
食慾減 退 ^δ	23	1.3	18	0	19	0
肌肉骨骼及結締組織異常						
肌痛	13	0	14	0	19	0.4
神經系統異常						
周邊神經 病變 ^δ	52	2.5	54	1.3	59	3
頭暈 ^p	17	0.4	14	0	13	0
頭痛 ^p	16	0	13	0	15	0
味覺障 礙 ^{p,π}	13	0	11	0	13	0
呼吸道、胸腔及縱膈腔異常						
咳嗽/咳嗽 有痰	14	0	16	0	12	0



不良反應	含鉑化療 + IMFINZI + Olaparib [†] (N=238)		含鉑化療 + IMFINZI [‡] (N=235)		含鉑化療 (N=236)	
	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)	所有級別 (%)	第 3-4 級 (%)
呼吸困難 ^{p,Σ}	14	0.8	14	0.9	14	0.4
皮膚及皮下組織異常						
掉髮 ^δ	51	0	50	0	50	0
皮疹 ^{&}	24	0.8	27	1.7	20	1.3
搔癢	16	0.8	15	0	12	0

* 依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 5.0 版分級。

[†] 整體試驗治療包括最多 6 個 21 天週期的含鉑化療併用 IMFINZI，接續 IMFINZI 併用 olaparib。

[‡] 整體試驗治療包括最多 6 個 21 天週期的含鉑化療併用 IMFINZI，接續 IMFINZI 單一療法。

^δ DUO-E 試驗中的不良反應僅適用於化療藥物不良反應。

^p DUO-E 試驗中的不良反應僅適用於 olaparib 藥物不良反應。

[^] 包括血中促甲狀腺素升高和甲狀腺功能低下。

[@] 包括腹痛、下腹部疼痛、腰痛、上腹部疼痛。

[#] 包括周邊水腫和周邊腫脹。

[§] 包括鼻咽炎、咽喉炎、鼻炎、鼻竇炎、氣管支氣管炎、上呼吸道感染。


^π 包括味覺障礙和味覺異常。

^Σ 包括呼吸困難和運動性呼吸困難。

[&] 包括濕疹、紅斑、皮疹、紅斑疹、斑疹、斑丘疹、丘疹、搔癢性皮炎。

此外在整體試驗中，隨機分配至含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組接受試驗治療的病人有 <10% 發生的臨床相關不良反應包括消化不良 (9%)、靜脈血栓栓塞 ([VTE] 8%)、淋巴球減少 (7%)、過敏 (5%)、皮膚炎 (2%)、單純紅血球再生不良 (1%)。

表 16：DUO-E 試驗中 ≥20%* 病人發生的實驗室檢驗值異常 (比基準點惡化)



	含鉑化療 + IMFINZI + Olaparib	含鉑化療 + IMFINZI	含鉑化療
實驗室檢驗值異常	第 3 或第 4 級 [†] (%) [‡]	第 3 或第 4 級 [†] (%) [‡]	第 3 或第 4 級 [†] (%) [‡]
實驗室檢驗值異常			
低血鈉	3.8	6	4.8
低血鎂	1.8	3.3	1.9
高血鎂	0.9	2.3	0.9
低血鉀	5	3.9	1.7
肌酸酐升高	1.7	0.4	1.7
丙胺酸轉胺酶 (ALT) 升高	3.8	3.5	1.3
天冬胺酸轉胺酶 (AST) 升高	3.4	3.0	0.4
丙麩胺醯轉移酶 (GGT) 升高	4.2	4.7	2.9
鹼性磷酸酶升高	0.4	0.4	0.4
血液學			
嗜中性白血球減少	28	22	23
白血球減少	21	15	16
淋巴球減少	24	11	16
貧血	25	17	14
血小板減少	7	9	6


* 實驗室異常為相對於隨機分配時的基準值。

[†] 依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》(CTCAE) 5.0 版分級。

[‡] 每一實驗室檢驗事件皆依據有基準值及至少一次檢驗測量值的病人人數：化療 + IMFINZI + olaparib (範圍：215 至 238)、化療 + IMFINZI (範圍：202 至 231)、化療 (範圍：205 至 231)。

肌肉層侵犯型膀胱癌(MIBC)

MIBC 術前前導性治療及術後輔助治療 – NIAGARA




IMFINZI 併用 gemcitabine 及 cisplatin 作為前導性治療，之後進行手術，再繼續使用 IMFINZI 單一藥物作為輔助治療，其安全性已在隨機分配、開放性、多中心試驗 NIAGARA 中完成評估。病人接受 IMFINZI 併用化療 (n=530) 或單獨接受化療 (n=526) [請見臨床試驗資料 (12.6)]。

在術前前導性治療部分，每 3 週一次 IMFINZI 1500 mg 的中位暴露時間為 12 週 (範圍：1.1 至 84 週)。在術後輔助治療部分，每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg 的中位暴露時間為 32 週 (範圍：2.4 至 50 週)。


整體試驗中，最常見的不良反應，包含實驗室數據異常 (發生於 $\geq 20\%$ 的病人) 為血紅素減少、嗜中性白血球減少、血中肌酸酐升高、血鈉降低、噁心、ALT 升高、血鈣降低、血小板減少、倦怠、血鉀升高、淋巴球減少、AST 升高、便秘、血鎂降低、食慾減退、鹼性磷酸鹽升高、皮疹、發熱、腹瀉、嘔吐及腹痛。

表 17 摘述接受 IMFINZI 併用化療的病人發生的不良反應。

表 17：NIAGARA 試驗中發生於 $\geq 10\%$ 病人的不良反應



	IMFINZI併用gemcitabine及 cisplatin N = 530		Gemcitabine及cisplatin N = 526	
不良反應	所有級別* (%)	第 3-4 級* (%)	所有級別* (%)	第 3-4 級* (%)
胃腸道異常				
噁心	54	1.5	48	1.0
便秘	39	0.8	39	0.8
腹瀉	21	1.5	14	0.4
嘔吐 [†]	20	0.9	19	0.2
腹痛 [†]	20	0.9	13	1.0
全身性異常及施用部位症狀				
倦怠 [†]	52	2.3	49	3
發熱 [†]	22	0.4	17	0
水腫 [†]	13	0.4	13	0
代謝及營養異常				
食慾減退	27	0.6	25	0.6
皮膚及皮下組織異常				
皮疹 [†]	23	1.3	12	0.6
搔癢	15	0	7	0
神經系統異常				
周邊神經病變 [†]	16	0.2	14	0
頭痛 [†]	11	0	11	0
暈眩 [†]	11	0	10	0.2
內分泌系統異常				
甲狀腺功能低下 [†]	13	0.4	2.3	0
血管疾病				
高血壓 [†]	12	4.5	9	2.9



出血 [†]	11	0.9	10	2.1
-----------------	----	-----	----	-----

* 依美國國家癌症研究院《不良事件常用術語標準》5.0 版分級。

[†] 包括多個相似術語。

表 18 摘述接受 IMFINZI 併用化療的病人發生的實驗室檢驗異常。

表 18：NIAGARA 試驗中，比基準值惡化且發生於≥ 20%接受 IMFINZI 併用化療的病人之特定實驗室檢驗異常

實驗室檢驗異常	IMFINZI 併用gemcitabine及cisplatin [‡]		Gemcitabine及cisplatin [‡]	
	所有級別 [†] (%)	第 3-4 級 [†] (%)	所有級別 [†] (%)	第 3-4 級 [†] (%)
生化學				
血中肌酸酐升高	63	9	58	7
血鈉降低	54	9	55	10
ALT 升高	53	2.3	54	4.0
血鈣降低	52	1.3	43	1.2
血鉀升高	51	4.2	49	4.4
AST 升高	42	1.5	39	2.1
血鎂降低	38	1.9	37	2.3
鹼性磷酸鹽升高	26	0.8	25	0.4
血液學				
血紅素減少	88	13	87	13
嗜中性白血球減少	76	31	74	34
血小板減少	52	6	50	7
淋巴球減少	44	10	40	8

[‡] 各項檢查的發生率，依據有基準值和至少一次試驗期間實驗室測量值的病人數計算：IMFINZI 併用化療 (範圍：482 至 528)；化療 (範圍：467 至 521)。

[†] 依 NCI CTCAE V5 分級。



NIAGARA 術前前導性治療階段

在IMFINZI 治療組，共有 530 名病人接受至少 1 劑 IMFINZI 併用化療藥物作為術前前導性治療；化療組有 526 名病人接受至少 1 劑化療藥物作為術前前導性治療。在術前前導性治療部分，IMFINZI 併用化療的病人有 24% 發生嚴重不良反應；最常見的嚴重不良反應 ($\geq 1\%$) 為肺栓塞 (1.9%)、嗜中性白血球低下合併發燒 (1.5%)、急性腎損傷 (1.3%)、血小板低下 (1.3%)、泌尿道感染 (1.3%)及肺炎 (1.3%)。1.1%的病人發生致命不良反應，包括敗血症 (0.2%)、心肌梗塞 (0.2%) 及肺栓塞 (0.2%)。1名 (0.2%)病人在手術後、但尚未開始術後輔助治療的期間發生肺炎致命不良反應。

在術前前導性治療階段，接受 IMFINZI 併用化療的病人中，9% 因不良反應而永久停用 IMFINZI。導致永久停用 IMFINZI 的不良反應中，最常見 ($\geq 0.5\%$) 為血中肌酸酐升高 (0.9%)、嗜中性白血球低下 (0.6%)、急性腎損傷 (0.6%)、無力(0.6%)及倦怠 (0.6%)。

IMFINZI 治療組有 530 名病人接受術前前導性治療，化療組有 526 名病人接受術前前導性治療，兩組各有 1 人 (0.2%) 因不良反應而未進行手術。IMFINZI 治療組導致手術取消的不良反應為間質性肺病。

IMFINZI 治療組有 469 名病人接受根除性膀胱切除術，其中 4 人 (0.8%) 因不良反應而延後手術 (定義為最後一劑術前前導性治療後超過 56 天才進行)。

NIAGARA 術後輔助治療階段

IMFINZI 治療組總計 383 名病人(72%)接受至少 1 劑術後輔助治療。

26% 接受 IMFINZI 術後輔助治療的病人發生嚴重不良反應，最常見的嚴重不良反應 (發生率 $\geq 1\%$) 為泌尿道感染 (7%)、急性腎損傷 (3.7%)、腎積水(2.1%)、腎盂腎炎 (2.1%)、泌尿道敗血症 (1.8%)及敗血症 (1.6%)。1.8%的病人發生致命不良反應，包括 COVID-19 (0.3%)、嚴重急性呼吸道症候群 (0.3%)、心肺衰竭 (0.3%)、腸胃道出血 (0.3%)及慢性肝衰竭 (0.3%)。

5% 的病人因不良反應而永久停用 IMFINZI 術後輔助治療。導致永久停用 IMFINZI 輔助治療的不良反應中，最常見 ($\geq 0.5\%$) 為腎炎 (0.8%)、倦怠 (0.5%)、腹瀉 (0.5%)、食慾減退 (0.5%)、非感染性肺炎 (0.5%)。

胃腺癌或胃食道接合處腺癌(GC/GELC)


可手術切除的胃腺癌或胃食道接合處腺癌的術前前導性及術後輔助治療—

MATTERHORN

MATTERHORN為一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗，評估 IMFINZI 併用 FLOT 作為術前前導性治療與術後輔助治療，並接著繼續以 IMFINZI單獨輔助治療，用於可手術切除的胃腺癌或胃食道接合處腺癌病人 (第 II 期至第 IVA 期 [美國癌症聯合委員會 (AJCC) 第 8 版]) 的安全性 [見臨床試驗 (12.7)]。安全性資料來自 944 名接受 IMFINZI 併用 FLOT (n=475) 或安慰劑併用 FLOT (n=469) 的病人。

在術前前導性治療階段，每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg 的暴露時間中位數為 8 週 (範圍：1.4 至 8.7 週)。在術後輔助治療階段，每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg 的暴露時間中位數為 48 週 (範圍：1.9 至 50.1週)。


最常見的不良反應 (發生於 $\geq 20\%$ 的病人) 為腹瀉、噁心、周邊神經病變、倦怠、掉髮、食慾減退、皮疹、腹痛、嘔吐、肌肉骨骼疼痛、發熱以及口腔炎。表 19 摘述 $\geq$



10% 接受 IMFINZI 併用 FLOT 化療治療的病人發生的不良反應。

表 19：MATTERHORN 試驗中發生於 ≥ 10% 病人的不良反應

不良反應	IMFINZI 併用 FLOT 化療 N=475		安慰劑併用 FLOT 化療 N=469	
	所有級別 (%)	第3或第4級 (%)	所有級別 (%)	第3或第4級 (%)
胃腸道異常				
腹瀉 [†]	64	8	59	7
噁心	51	2.5	51	1.5
嘔吐 [†]	26	2.1	26	3
腹痛 [†]	27	2.3	29	1.3
口腔炎 [†]	20	1.1	15	0.6
便秘	16	0	17	0.9
吞嚥困難	10	1.5	8	1.5
神經系統異常				
周邊神經病變 [†]	51	3.6	47	2.3
味覺障礙 [†]	19	0	15	0
全身性異常及施用部位症狀				
倦怠 [†]	47	5	45	5
發熱 [†]	20	0.8	16	1.3
皮膚及皮下組織異常				
掉髮	31	0	32	0
皮疹 [†]	30	1.5	20	0.4
搔癢 [†]	11	0	5	0
代謝及營養異常				
食慾減退 [†]	31	3.2	30	2.1
肌肉骨骼及結締組織異常				
肌肉骨骼痛 [†]	21	1.5	19	0.6




不良反應	IMFINZI 併用 FLOT 化療 N=475		安慰劑併用 FLOT 化療 N=469	
	所有級別 (%)	第3或第4級 (%)	所有級別 (%)	第3或第4級 (%)
感染與寄生蟲感染				
COVID-19 [†]	19	1.7	16	0.6
感染性肺炎 [†]	11	3.8	10	4.3
檢查				
體重減輕	15	2.1	19	3.4
血管疾病				
出血 [†]	14	2.5	15	2.8
呼吸道、胸腔及縱膈腔異常				
咳嗽 [†]	10	0	10	0

[†]包含多個相似術語

表 20 摘述接受 IMFINZI 併用 FLOT 化療治療的病人發生的實驗室檢驗值異常。

表 20：MATTERHORN 試驗中，比基準值惡化且發生於≥20%接受 IMFINZI 併用 FLOT 化療的病人之實驗室檢驗異常

實驗室檢驗異常 [*]	IMFINZI 併用 FLOT 化療 [†]		安慰劑併用 FLOT 化療 [‡]	
	所有級別(%)	第3-4級(%)	所有級別(%)	第3-4級 (%)
血液學				
白血球減少	75	14	79	17
嗜中性白血球減少	70	41	74	44
血紅素減少	68	7	73	8
淋巴球減少	49	13	45	13
血小板減少	47	1.1	46	1.9
生化學				
天冬胺酸轉胺酶 (AST) 升高	72	6	69	6



丙胺酸轉胺酶 (ALT) 升高	70	7	65	6
丙麩胺醯轉移酶 (GGT) 升高	57	10	51	6
脂肪酶升高	55	16	55	15
鹼性磷酸酶升高	53	3.2	51	1.5
血鈣降低	45	0.8	47	2.6
澱粉酶升高	42	6	39	4.5
血鉀降低	39	8	40	8
血鈉降低	33	4.4	32	4.7
白蛋白減少	31	1.5	31	0.2
血鉀升高	22	0.6	26	1.3

* 依 NCI CTCAE 5.0 版分級。

† 用於計算發生率的分母，為具有基準點數值和至少一次治療後數值的病人數，從 444 至 472 不等。


‡ 用於計算發生率的分母，為具有基準點數值和至少一次治療後數值的病人數，從 443 至 468 不等。

依治療階段的不良反應

表21總結了各治療階段的安全性概況。

表21：各治療階段的安全性概況

	IMFINZI 併用 FLOT 化療	安慰劑併用 FLOT 化療
術前前導性治療階段		
病人數	475	469
嚴重不良反應	21%	18%
治療期間死亡	1.9%	1.7%
永久停用IMFINZI 或安慰劑	2.5%	2.1%
因不良反應而未進行手術	0.6%	0.4%
因不良反應而延遲手術	2.3%	2.6%
術後輔助治療階段		



病人數	365	351
嚴重不良反應	29%	26%
治療期間死亡	2.2%	2.6%
永久停用IMFINZI 或安慰劑	7%	4.6%
術後輔助治療階段(單獨使用 IMFINZI)		
病人數	345	331
嚴重不良反應	14%	15%
治療期間死亡	1.7%	2.4%
永久停用IMFINZI 或安慰劑	6%	2.7%

在 IMFINZI 治療組中，嚴重不良反應 ($\geq 2\%$) 為在術前前導性治療階段出現腹瀉 (2.5%)，以及在術後輔助治療階段出現肺炎 (pneumonia) (2.5%)。

在 IMFINZI 治療組中，死亡 (≥ 2 名病人) 包括在術前前導性治療階段的敗血性休克 (0.6%) 與急性冠心症 (0.4%)；術後輔助治療階段的胃腸道穿孔 (0.5%) 與 COVID-19 (0.5%)；單獨使用IMFINZI的術後輔助治療階段的胃腸道穿孔 (0.6%) 與 COVID-19 (0.6%)。

在 IMFINZI 治療組中，因不良反應而永久停用 IMFINZI (≥ 2 名病人) 包括在術前前導性治療階段的腎炎 (0.4%)；術後輔助治療階段的肝炎 (1.1%)、非感染性肺炎 (pneumonitis, 1.1%)、皮疹 (0.8%)、肌肉骨骼疼痛 (0.5%) 以及腎功能衰竭 (0.5%)；單獨使用IMFINZI的術後輔助治療階段的肝炎 (0.9%)、非感染性肺炎 (0.9%)、肌肉骨骼疼痛 (0.6%) 以及腎功能衰竭 (0.6%)。

9 過量


目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

程序性細胞死亡配體-1 (PD-L1)的表達可能被炎症信號 (例如IFN- γ) 所誘導，並且可表現在腫瘤微環境中的腫瘤細胞及腫瘤相關免疫細胞。PD-L1與PD-1和CD80 (B7.1)交互作用，從而阻斷T細胞功能和活化。PD-L1與其受體結合，藉此減低具細胞毒性的T細胞活化，增殖和細胞激素的產生。

Durvalumab是一種人類免疫球蛋白G1 kappa (IgG1 κ) 單株抗體，與PD-L1結合並且阻斷PD-L1與PD-1和CD80 (B7.1)的交互作用。阻斷PD-L1/PD-1和PD-L1/CD80的交互作用釋放了對免疫反應的抑制作用，但不會誘導抗體依賴型細胞調節的細胞毒性作用(ADCC)。



以durvalumab阻斷PD-L1可導致體外T細胞活化增加，並且在共同移植的人類腫瘤和免疫細胞異體移植小鼠模式中可減少腫瘤大小。

10.2 藥效藥理特性

每4週服用一次1500mg給藥方案相較於每2週10mg/kg給藥方案病人之藥物動力學參數模擬比較，其穩定狀態下的曲線面積(AUC)高6%，給藥前血中濃度(C_{trough})低19%、最高血中濃度(C_{max})高55%。基於藥物動力學參數和暴露量與安全性的相關性，預期在體重>30公斤的非小細胞肺癌病人，每4週服用一次1500mg與每2週10mg/kg，未有臨床上療效和安全性的差異。

免疫原性

觀察到的抗藥物抗體發生率，高度依賴於檢測方法的敏感性和特異性。檢測方法的差異排除了下述試驗與其他試驗中抗藥物抗體 (ADAs) 發生率進行有意義的比較。

2280 位接受每 2 週一次 10 mg/kg 或是每 4 週一次 20 mg/kg IMFINZI 單一藥物的病人中，有69 名病人 (3%) 對治療產生的抗藥物抗體 (ADAs) 檢測呈陽性，有12名病人 (0.5%) 對中和抗體檢測呈陽性。抗 durvalumab ADAs 的形成似乎在其藥動學或安全性上沒有臨床相關影響。

在 AEGEAN 試驗中，375名病人於術前接受每 3 週一次 IMFINZI 1500 mg 併用含鉑化療，並於術後接受每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg，且可評估是否出現抗藥抗體 (ADA)，其中 25 名病人 (6.7%) 對治療產生的抗藥抗體檢測呈陽性。2 名病人 (0.5%) 有抗 durvalumab 的中和抗體。抗藥抗體出現對於 IMFINZI 的藥物動力學或安全性並未造成明顯影響。


在 ADRIATIC 試驗中，206 位接受每 4 週一次 20 mg/kg IMFINZI 單一藥物的病人，7 人 (3.4%) 的 ADAs 檢測呈陽性，2 人 (1%) 的中和抗體檢測呈陽性。ADAs 出現對於藥動學或安全性並未造成明顯影響。

在 CASPIAN 試驗中，201 位接受每 3 週一次 1500 mg IMFINZI併用四劑化療，然後再每4週一次1500 mg IMFINZI的病人，沒有任何人對治療產生的 ADAs 檢測呈陽性。

在TOPAZ-1試驗中，240名病人接受每 3 週一次 1500 mg IMFINZI併用化療，最多8 個周期，之後每 4 週一次接受 IMFINZI 1500 mg，其中2名病人(0.8%)對治療產生的抗藥物抗體 (ADAs)及中和抗體檢測呈陽性。沒有足夠的病人數(各兩名病人)可判定 IMFINZI治療產生的ADAs或中和抗體對藥效學、藥動學、安全性及有效性是否有影響。

在HIMALAYA試驗的 12 週治療期間，每 4 週接受一次 IMFINZI 併用單劑 tremelimumab的 294 名病人中，於給藥前第 0 週、第 4 週和第12週評估了針對 IMFINZI 的 ADAs檢測，其中3.1% (9/294) 的病人抗 durvalumab 抗體檢測呈陽性。在 ADAs 檢測呈陽性的 9 名病人中，55.6% (5/9) 檢測出針對 durvalumab 的中和抗體呈陽性。沒有發現抗 durvalumab 抗體對 durvalumab 安全性的臨床顯著影響；然而，ADAs 對 durvalumab 的藥物動力學和療效的影響尚不清楚。

在 DUO-E 試驗中，198名可評估有無 ADA 且接受含鉑化療 + IMFINZI 治療的病人中，8 人 (4.0%) 檢測出 ADA 陽性。在這 8 名 ADA 檢測陽性的病人中，有 1 人檢測出 durvalumab 的中和抗體陽性。在接受含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 的 207 名病人中，9 人 (4.3%) 檢測出 ADA 陽性。在這 9 名 ADA 檢測陽性的病人中，無人檢測



出 durvalumab 的中和抗體陽性。尚未發現抗 durvalumab 抗體對 durvalumab 的安全性有臨床相關的顯著影響，且目前數據不足以評估 ADA 對 durvalumab 的藥物動力學和療效之影響。

在 NIAGARA 試驗中，共有453 位病人於術前接受每 3 週一次 IMFINZI 1500 mg 併用化療，並於術後接受每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg，且可評估是否出現抗藥抗體 (ADA)。其中8人 (1.8%) 的 ADAs 檢測呈陽性，6 人 (1.3%) 的中和抗體檢測呈陽性。ADAs 出現對於IMFINZI的藥物動力學或安全性並未造成明顯影響。由於治療中出現的 ADA 陽性病人人數有限，尚無法評估 ADA 是否會影響 IMFINZI 的療效。

在 MATTERHORN 試驗中，441 名病人接受 IMFINZI 1500 mg 併用 FLOT 化療作為術前前導性和術後輔助治療，接著繼續以 IMFINZI 作為單一輔助療法，且可評估是否出現抗藥抗體 (ADA)，其中 40 名病人 (9.1%) 檢測治療中出現 ADA 結果呈陽性。2 名病人 (0.5%) 有抗 durvalumab 的中和抗體。ADA 出現對於 IMFINZI 的藥物動力學或安全性並未造成明顯影響。

10.3 臨床前安全性資料

致癌性，致突變性，生育力損害

尚未評估durvalumab的致癌性和基因毒性。

尚未以durvalumab進行動物生育力研究。在重複劑量毒性試驗中，對性發育成熟之食蟹猴給予durvalumab長達3個月，durvalumab對雄性和雌性動物之生殖器官沒有顯著影響。

動物毒理學和/或藥理學

在動物模式中，抑制PD-L1/PD-1訊息傳遞會增加某些感染的嚴重度，以及增強炎症反應。感染結核分枝桿菌 (*Mycobacterium tuberculosis*) 的PD-1基因剔除小鼠與野生型對照組比較，生存率顯著降低，這與這些動物中的細菌增殖及炎症反應增加有關。使用靈長類動物抗 PD-1 抗體會阻斷 PD-1，並顯示會加重恒河獼猴中的結核分枝桿菌感染。PD-L1和PD-1基因剔除小鼠在感染淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒(lymphocytic choriomeningitis virus) 之後，也顯示生存率降低。

11 藥物動力學特性

每2、3或4週給病人一次0.1 mg/kg (核准建議劑量的0.01倍)至20 mg/kg (核准建議劑量的2倍) 的藥物劑量，來進行Durvalumab單一藥物治療的藥動學研究。

當劑量<3 mg/kg (核准建議劑量的0.3倍)，PK暴露量增加超過劑量增加比例，而當劑量≥3 mg/kg每2週一次，PK暴露量增加與劑量增加成正比。穩定狀態在約16週達到。

Durvalumab 單一藥物治療、併用化療和併用tremelimumab有類似的藥動學。

分佈

穩定狀態分佈體積(V_{ss})的幾何平均數 (%變異係數[CV%])為5.4 (13.1%) L。

排除

Durvalumab清除率隨時間降低，從基線值最大降低量的平均值(CV%)約為23% (57%)，導致在第365天的穩定狀態清除率 (CL_{ss}) 的幾何平均數(CV%)為8.2 mL/h (39%)； CL_{ss} 降低不被認為與臨床相關。根據基線CL，末相半衰期的幾何平均數(CV%)約21 (26%) 天。

特殊族群

年齡 (18-96歲)、體重 (31-175公斤)、性別、種族(白人、黑人、亞洲人、夏威夷原住民、太平洋島原住民或美洲原住民)、白蛋白濃度(4-57 g/L)、乳酸脫氫酶濃度、可溶性PD-L1(67-3,470

pg/mL)、腫瘤類型(NSCLC、SCLC、BTC和HCC)、輕度至中度腎功能不全(CL_{cr} 30-89 mL/min)、輕度至中度肝功能不全 (膽紅素 $\leq$ 3倍ULN和任何AST)對durvalumab的藥動學沒有臨床上顯著的影響。

尚不清楚重度腎功能不全 (CL_{cr} 15-29 mL/min)或重度肝功能不全 (膽紅素 $>$ 3倍ULN和任何AST) 對durvalumab藥動學的影響。

12 臨床試驗資料

12.1 非小細胞肺癌 (NSCLC)

可手術切除的非小細胞肺癌(NSCLC) – AEGEAN

AEGEAN 試驗 (NCT03800134) 為一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗，評估 IMFINZI 併用含鉑化療做為前導性治療(neoadjuvant therapy)，並在手術後繼續以 IMFINZI 單獨使用做為輔助治療(adjuvant therapy)的療效。試驗納入可手術切除的鱗狀或非鱗狀非小細胞肺癌(第 IIA 期至特定第 IIIB 期 [美國癌症聯合委員會 (AJCC) 第 8 版])且先前未曾接受治療的病人，WHO/ECOG 體能狀態為 0 或 1 分，而且至少有一處符合 RECIST 1.1 版定義的目標病灶。病人在隨機分配前已使用 Ventana PD-L1 (SP263) 分析確認過腫瘤 PD-L1 表現狀態。

患有活動性或先前病歷記載有自體免疫疾病，或在第一劑 IMFINZI 的前 14 天內曾使用任何免疫抑制藥物者不符合資格。試驗主要療效分析族群排除具有已知 EGFR 突變或 ALK 重組的病人 (修訂版意圖治療 [mITT])。


試驗的主要療效指標為盲性中央病理審查之病理完全反應 (pCR)，以及盲性獨立中央審查 (BICR) 評估之無事件存活期 (EFS)。重要次要療效指標為盲性中央病理審查之主要病理反應 (MPR)、盲性獨立中央審查之無疾病存活期 (DFS)，以及整體存活期 (OS)。

隨機分配依疾病期別 (第 II 期 vs. 第 III 期) 及 PD-L1 表現狀態 (TC $<$ 1% vs. TC $\geq$ 1%)分層。

AEGEAN 試驗依 1:1 的比例將 802 名病人隨機分配至接受手術前後IMFINZI 治療 (第 1 組) 或安慰劑 (第 2 組) 併用術前含鉑化療(鱗狀非小細胞肺癌：cisplatin [75 mg/m² on Day 1] + gemcitabine [1250 mg/m² on Day 1 and 8]、carboplatin [AUC 5 on Day 1] + gemcitabine [1250 mg/m² on Day 1 and 8] 或carboplatin [AUC 6 on Day 1] + paclitaxel [200 mg/m² on Day 1]；非鱗狀非小細胞肺癌：cisplatin [75 mg/m² on Day 1] + pemetrexed [500 mg/m² on Day 1] 或carboplatin [AUC 5 on Day 1] + pemetrexed [500 mg/m² on Day 1])。兩試驗組之間不得轉換。依據 mITT 族群的 740 名病人進行療效分析。

- 第 1 組：術前每 3 週一次 IMFINZI 1500 mg 併用含鉑化療，最多 4 個週期，術後每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg，最多 12 個週期。
- 第 2 組：術前每 3 週一次安慰劑併用含鉑化療，最多 4 個週期，術後每 4 週一次安慰劑，最多 12 個週期。

在基準點及前導性治療完成時 (術前) 進行腫瘤評估。在手術後 5 週 $\pm$ 2 週且在輔助治療開始之前 (盡可能靠近輔助治療開始之時) 進行初次的術後胸部及腹部 CT/MRI 掃描 (包括整個肝臟及雙側腎上腺)。之後的腫瘤評估為每 12 週一次 (相對於手術日期) 直到第 48 週，之後每 24 週一次 (相對於手術日期) 直到第 192 週 (約 4 年)，之後每 48 週



一次 (相對於手術日期) , 直到發生試驗主持人依據 RECIST 1.1 版判定的疾病惡化、撤回同意書或死亡為止。停止治療之後, 在第 2、3、4 個月進行存活評估, 而後每 2 個月一次直到第 12 個月, 之後為每 3 個月一次。

兩試驗組之間的人口學資料及基準點疾病特性相似。療效分析族群 (mITT: 第 1 組 366 名病人, 第 2 組 374 名病人) 的基準點人口學資料及疾病特性如下: 男性 (71.6%)、女性 (28.4%)、65 歲以上 (51.6%)、年齡中位數 65 歲 (範圍: 30-88)、WHO/ECOG 體能狀態 0 分 (68.4%)、WHO/ECOG 體能狀態 1 分 (31.6)、白人 (53.6%)、亞洲人 (41.5%)、黑人或非裔美國人 (0.9%)、美洲印第安人或阿拉斯加原住民 (1.4%)、其他族裔 (2.6%)、目前或過去吸菸 (85.5%)、從未吸菸 (14.5%)、腫瘤組織學形態為鱗狀 (48.6%)、非鱗狀 (50.7%)、第 II 期 (28.4%)、第 III 期 (71.6%)、PD-L1 表現狀態 TC $\geq$ 1% (66.6%)、TC < 1% (33.4%)。


在 mITT 族群中, 進行根治性目的手術的病人人數, 第 1 組為 295 (80.6%) 人, 第 2 組為 302 (80.7%) 人。完成根治性目的手術的病人人數, 第 1 組為 284 (77.6%) 人, 第 2 組為 287 (76.7%) 人。完成根治性目的手術病人當中的腫瘤切緣狀況為 (第 1 組 vs. 第 2 組):

- R0 (無殘餘腫瘤): 94.7% vs. 91.3%
- R1 (顯微殘餘腫瘤): 4.2% vs. 7.7%
- R2 (目視可見殘餘腫瘤): 0.7% vs. 0.7%

根據預定的期中分析顯示, 相對於安慰劑組, IMFINZI 組在 pCR 和 EFS 方面達到統計顯著且具臨床意義的改善。期中分析時整體存活期 (OS) 數據尚未成熟。表 22 及圖 1 總結 AEGEAN 試驗的療效結果。

表 22: AEGEAN 試驗的療效結果 (mITT)

	IMFINZI + 化療 (N=366)	安慰劑 + 化療 (N = 374)
無事件存活期 (EFS) ^a		
事件數 · n (%)	98 (26.8)	138 (36.9)
無事件存活期中位數 (95% CI) (月)	NR (31.9, NR)	25.9 (18.9, NR)
危險比 (95% CI)	0.68 (0.53, 0.88)	
雙側 p 值 ^d	0.003902	
病理完全反應 (pCR) ^{a,b,d}		
達到反應的病人數	63	16
反應率 · % (95% CI)	17.21 (13.49, 21.48)	4.28 (2.46, 6.85)
比例差異 · % (95% CI)	12.96 (8.67, 17.57)	
主要病理反應 (MPR) ^{a,c,d}		



	IMFINZI + 化療 (N=366)	安慰劑 + 化療 (N = 374)
達到反應的病人數	122	46
反應率，% (95% CI)	33.33 (28.52, 38.42)	12.30 (9.15, 16.06)
比例差異，% (95% CI)	21.03 (15.14, 26.93)	

a 結果係依據預定的 EFS 期中分析及 pCR/MPR 最終分析 (資料截止日期：2022 年 11 月 10 日)，於試驗開始後 46.3 個月進行。


b 依據預定的 pCR 期中分析 (資料截止日期：2022 年 1 月 14 日)， $n = 402$ ，相對於 0.0082% 顯著水準，pCR 率達到統計顯著 ($p = 0.000036$)。

c 依據預定的 MPR 期中分析 (資料截止日期：2022 年 1 月 14 日)， $n = 402$ ，相對於 0.0082% 顯著水準，MPR 率達到統計顯著 ($p = 0.000002$)。

d pCR 和 MPR 的雙側 p 值根據分層 CMH 檢定計算而得。EFS 的雙側 p 值根據分層對數秩檢定計算而得。分層因子包括 PD-L1 及疾病期別。

各項療效評估指標據以宣告統計顯著之界限係由 Lan-DeMets α 消耗函數決定，近似 O'Brien Fleming 法 (EFS = 0.9899%，pCR = 0.0082%，MPR = 0.0082%，雙側)。

圖 1：EFS 的 Kaplan-Meier 曲線




在依據人口學資料及基準點疾病特性、組織學及預定化療的預先指定次群組中，第 1 組相較於第 2 組的 EFS 和 pCR 均得到改善。

依據較期中分析時間點額外 9 個月的追蹤，整體存活期危險比為 0.91 (95% CI : 0.69, 1.19)。

不可手術切除的第三期 NSCLC- PACIFIC

PACIFIC 研究 (NCT02125461) 評估了 IMFINZI 的療效，其為一項在不可切除的第三期 NSCLC 病人進行的多中心，隨機，雙盲，安慰劑對照研究，這些病人在啟用研究藥物前的 42 天內完成至少 2 個週期的同步含鉑化療和根治性放療，並且 WHO 體能狀況為 0 或 1 分。該研究排除了在同步放化療後疾病惡化的病人、患有活動性自體免疫疾病或在進入研究前 2 年內有自體免疫疾病的病人、或患有需要全身性免疫抑制劑之疾病的病



人。隨機分組按性別、年齡 (<65歲對≥65歲)和吸煙史 (吸煙者對非吸煙者) 分層。病人以2:1的比例隨機接受IMFINZI 10 mg/kg或安慰劑靜脈注射，每2週一次，最多12個月或直到發生不可接受的毒性或確認有RECIST 1.1版定義的惡化。每8週進行一次腫瘤狀態評估。主要療效結果指標為由盲性獨立中央評估委員會(BICR)根據RECIST 1.1版評估的無惡化存活期 (PFS) 和整體存活期 (OS)。其他的療效結果指標包括由BICR評估的總緩解率(ORR)和反應持續時間(DoR)。

總共713名病人被隨機分配：476名病人進入IMFINZI組，237名病人進入安慰劑組。研究人群特徵為：中位年齡64歲 (範圍：23至90歲)；70% 男性；69%白人，27%亞洲人；16%目前吸煙者，75%以前吸煙者，9%從未吸煙者；51%的WHO體能狀態是1分；53% IIIA期，45% IIIB期；組織學型態46%為鱗狀，54%為非鱗狀。所有病人均按照研究計劃書接受根治性放療，其中92%接受的總放射劑量為54 Gy至66 Gy；99%的病人接受含鉑化療 (55%為含cisplatin化療，42%為含carboplatin化療，2%在cisplatin和carboplatin之間轉換)。

根據 299 起事件 (預估總惡化事件數的 61%) 進行的預設期中 OS 分析，試驗結果顯示接受 IMFINZI 的病人相對於安慰劑組，OS 有統計學顯著之改善。根據 371 起事件 (預估總惡化事件數的 81%) 進行的預設期中 PFS 分析，顯示接受 IMFINZI 的病人相對於安慰劑組，PFS 有統計學顯著之改善。表23和圖 2 總結 PACIFIC 試驗的療效結果。


表23：PACIFIC研究的療效結果

療效指標	IMFINZI (N=476) [*]	安慰劑 (N=237) [*]
整體存活期 (OS) [†]		
死亡人數	183 (38%)	116 (49%)
中位月數 (95% CI)	NR (34.7, NR)	28.7 (22.9, NR)
危險比 (95% CI) [‡]	0.68 (0.53, 0.87)	
p 值 ^{‡, §}	0.0025	
無惡化存活期 (PFS) ^{¶, #}		
發生事件的病人數 (%)	214 (45%)	157 (66%)
中位月數 (95% CI)	16.8 (13, 18.1)	5.6 (4.6, 7.8)
危險比 (95% CI) ^{‡, p}	0.52 (0.42, 0.65)	
p 值 ^{‡, β}	<0.0001	

*在ITT群體中，經盲性獨立中央評估委員會根據RECIST 1.1版評估，IMFINZI組中7%和安慰劑組10%的受試者不具有可測量的病灶

†OS 結果：根據 299 起 OS 事件 (發生於試驗開始後 46 個月) 進行的期中 OS 分析

‡雙側 p 值：根據按性別、年齡和吸菸史分層的對數秩檢定




§與期中分析分配的 α 值 0.00274 比較 (Lan DeMets 消耗函數近似 O'Brien Fleming 邊界)

†由盲性獨立中央評估委員會 (BICR) 根據實體腫瘤療效反應評估標準 (RECIST) 1.1 版進行評估

#PFS 結果：根據 371 起 PFS 事件 (發生於試驗開始後 33 個月) 進行的期中 PFS 分析
P Pike 估計量

β與期中分析分配的 α 值 0.011035 比較 (Lan DeMets 消耗函數近似 O'Brien Fleming 邊界)

圖2：PACIFIC研究中整體存活期的Kaplan-Meier曲線




有風險病人人數

月	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
IM	47	46	43	41	38	36	34	31	27	21	11	57	23	2	0	0
FI	6	4	1	5	5	4	3	9	4	0	5					
NZ																
I																
安	23	22	19	17	17	15	14	13	11	78	42	21	9	3	1	0
慰	7	0	8	8	0	5	1	0	7							
劑																

12.2 小細胞肺癌 (SCLC)

局限期小細胞肺癌 (LS-SCLC) – ADRIATIC

ADRIATIC試驗 (NCT03703297)是一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心試驗，評估 IMFINZI 的療效，試驗收納730名經組織學或細胞學確認患有LS-SCLC (依美國癌症聯合委員會 [AJCC] 第 8 版判定為第一至三期)，且在同步放化療後並未惡化的病人。第一或第二期的病人須經試驗主持人判斷為醫學上無法手術。符合條件的病人在接受第一劑IMFINZI或安慰劑治療前的42天內，需已完成同步放化療，包含4個週期的含鉑化療以及放射線治療，可以為60-66 Gy 每日一次 (QD)，持續6週，或45 Gy每日



兩次 (BID)，持續3週。預防性顱部放射線治療 (PCI) 可依試驗主持人決定，在放化療後和第一劑IMFINZI或安慰劑治療前的42天內進行。試驗排除在試驗開始之前5年內有活動性或曾患有自體免疫疾病者；有活動性原發免疫缺陷病史者；曾罹患 ≥ 第2級非感染性肺炎或開放性肺結核，或B型肝炎或C型肝炎或HIV感染者；活動性間質性肺病的病人。具有合併小細胞肺癌及非小細胞肺癌組織學型態的病人，也不可參加試驗。隨機分配依據腫瘤分期 (第一/二期或第三期) 及是否接受PCI (是、否) 進行分層。

病人按1:1:1的比例隨機分配接受IMFINZI單一藥物、IMFINZI併用其他治療劑，或是安慰劑。所有研究藥物皆以靜脈注射方式給藥。對於LS-SCLC的療效評估是比較以下兩組：

- 第1組：IMFINZI 1500 mg與安慰劑併用，每4週一次，持續4個週期，之後為IMFINZI 1500 mg，每4週一次。
- 第2組：安慰劑與第二種安慰劑併用，每4週一次，持續4個週期，之後為單一安慰劑，每4週一次。

530名病人被隨機分配到第1組和第2組，其中264名病人在IMFINZI組，266名病人在安慰劑組。治療持續進行直到疾病惡化、發生無法耐受的毒性，或最多24個月。最初72週，每8週一次進行腫瘤評估，接著為每12週一次，直到96週，之後為每24週一次。


主要療效評估指標為OS和PFS，由盲性獨立中央審查 (BICR) 依據RECIST v1.1進行評估。

IMFINZI組和安慰劑組的基準點人口特性及疾病特性如下：男性 (69%)、年齡 ≥ 65 歲 (39%)、白人 (50%)、黑人或非裔美國人 (0.8%)、亞洲人 (48%)、其他 (1.3%)、西語裔或拉丁裔 (4.2%)、目前吸煙者 (22%)、先前吸煙者 (68%)、未曾吸煙者 (9%)、WHO/ECOG 體能狀態 0 分 (49%)、WHO/ECOG 體能狀態 1 分 (51%)、第一期 (3.6%)、第二期 (9%)、第三期 (87%)。

隨機分配前，所有病人接受含鉑化療 (66% cisplatin-etoposide，34% carboplatin-etoposide)，其中88%病人接受了4個週期的治療；72%的病人接受放療QD (其中92% 接受 ≥ 60 至 ≤ 66 Gy QD)；28%接受放療BID (其中97% 接受 45 Gy BID)，54%的病人接受PCI。療效結果列於表24和圖3。

表24：ADRIATIC試驗的療效結果

	IMFINZI (N=264)	安慰劑 (N=266)
整體存活期 (OS)		
死亡人數 (%)	115 (44)	146 (55)
OS 中位數 (月) (95% CI) [†]	55.9 (37.3, NR)	33.4 (25.5, 39.9)
危險比 (95% CI) [‡]	0.73 (0.57, 0.93)	
p 值 [§]	0.0104	
無惡化存活期(PFS [¶])		
事件數 (%)	139 (53)	169 (64)



	IMFINZI (N=264)	安慰劑 (N=266)
PFS 中位數 (月) (95% CI) [†]	16.6 (10.2, 28.2)	9.2 (7.4, 12.9)
危險比 (95% CI) [#]	0.76 (0.61, 0.95)	
p 值 [§]	0.0161	

[†] 使用Kaplan-Meier方法計算。以Brookmeyer-Crowley方法計算中位數的信賴區間。


[‡] 使用Cox比例風險模型進行分析，依據是否接受PCI進行分層。

[§] 與其中分析中分配的 α 值進行比較，OS的 α 值為0.0168，PFS的 α 值為0.0280（使用Lan-DeMets消耗函數近似O'Brien Fleming邊界）。

[¶] 由BICR依據RECIST v1.1進行評估。

[#] 使用Cox比例風險模型進行分析，依據是否接受PCI進行分層。

圖3：ADRIATIC試驗之整體存活期的Kaplan-Meier曲線



擴散期小細胞肺癌 (ES-SCLC) – CASPIAN

CASPIAN 是一項隨機、多中心、有效療法對照、開放性的試驗，針對之前未治療的 ES-SCLC 病人，評估IMFINZI 併用 etoposide 以及 carboplatin 或 cisplatin 兩者之一的療效。符合試驗條件的病人其WHO 體能狀態分數為 0 或 1 分且適合接受含鉑化療作為 SCLC 第一線的治療；出現無症狀或治療過的腦轉移病人也是符合試驗條件的。含鉑化合物的選擇是依試驗主持人考量推算肌酸酐清除後的判斷。曾有胸部放射療法病史；有活動性原發性免疫不全病史；自體免疫疾病包括腫瘤伴隨症候群；活動性或先前確診的自體免疫或發炎性疾病；第一劑治療前 14 天內使用全身性免疫抑制劑但不包括全身性皮質類固醇的生理性劑量，以上病人均不符合試驗條件。

依第 1 週期預定的含鉑療法 (cisplatin 或 carboplatin) 分層隨機分配。

對於ES-SCLC的療效評估是比較以下兩組：

- 每 21 天週期的第 1 天使用 IMFINZI 1500 mg和依試驗主持人決定使用 carboplatin (AUC 5 或 6 mg/mL/min) 或 cisplatin (75-80 mg/m²) 兩者之一。



在每21天週期的第 1、2、3 天靜脈輸注 etoposide (80-100 mg/m²)，最多 4 個週期，之後接受 IMFINZI 每 4 週一次 1500 mg，直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止；或

- 每 21 天週期的第 1 天依試驗主持人決定使用 carboplatin (AUC 5 或 6 mg/mL/min) 或 cisplatin (75-80 mg/m²) 兩者之一，在每21天週期的第 1、2、3 天靜脈輸注 etoposide (80-100 mg/m²)，最多6 個週期。在化療完成後，依試驗主持人判斷是否接受預防性顱部放射治療 (PCI)。

若病人的臨床狀態穩定，並依試驗主持人判斷可獲得臨床效益，允許在疾病惡化後施用 IMFINZI 單一療法。

重要療效結果測量為 IMFINZI 加化療與單獨化療的整體存活期 (OS) 比較。其他療效結果測量為試驗主持人依 RECIST v1.1 評估無惡化存活期 (PFS) 與客觀治療反應率 (ORR)。

試驗人口特性資料為：中位年齡 63 歲 (範圍：28 至 82 歲)；40%病人年齡 ≥65 歲；70%為男性；84%為白人、15%為亞裔、0.9%為黑人；65%為WHO/ECOG PS 1 分；93%為目前吸菸或曾經吸菸者。在基準點有90%的病人有第四期疾病，10%的病人有轉移性腦癌。25% 的病人接受 cisplatin 及 74% 接受 carboplatin。在單獨化療的組別中，57% 的病人接受 6 個週期的化療，8% 接受 PCI。表 25及圖4總結OS的結果。


表25：CASPIAN 試驗的療效結果

療效指標	IMFINZI和Etoposide以及 Carboplatin或Cisplatin 兩者之一 (N=268)	Etoposide以及 Carboplatin或Cisplatin 兩者之一 (N=269)
整體存活期 (OS)		
死亡人數 (%) [*]	155 (57.8)	181 (67.3)
中位 OS (月) (95% CI)	13.0 (11.5, 14.8)	10.3 (9.3, 11.2)
危險比 (95% CI) [†]	0.73 (0.59, 0.91)	
p 值 [*]	0.0047	

^{*} 在事先擬定的期中分析中，觀察到336個OS事件 (佔預期事件的79%)，宣稱療效的邊界 (0.0178) 是依據Lan-Demets alpha消耗函數與O'Brien Fleming type邊界

[†] 使用分層對數秩檢定進行分析，調整第 1 週期預定的含鉑療法 (carboplatin 或 cisplatin)，並使用相關性排序檢定。

圖4：CASPIAN試驗之整體存活期的 Kaplan-Meier 曲線



有風險 病人人 數	0	3	6	9	12	15	18	21	24
IMFIN ZI + 化療	268	244	214	177	116	57	25	5	0
化療	269	242	209	153	82	44	17	1	0

在IMFINZI加化療的組別中，試驗主持人評估的PFS (佔預期事件的96%) 顯示風險比值為0.78 (95%信賴區間：0.65, 0.94)和5.1個月的中位PFS值；而單獨化療組別為5.4個月的中位PFS值。在IMFINZI加化療的組別中，試驗主持人評估確認的ORR為68% (95%信賴區間：62%, 73%)，而單獨化療組別為58% (95%信賴區間：52%, 63%)。依據預期第一期接受含鉑化療的OS探測性分層分析中，接受carboplatin的病人風險比值為0.70 (95%信賴區間：0.55, 0.89)，接受cisplatin的病人風險比值為0.88 (95%信賴區間：0.55, 1.41)。

12.3 膽道癌 (BTC)

一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照、多中心的 TOPAZ-1 試驗 (NCT03875235)，納入 685 名經組織學檢查確認為局部晚期無法切除或轉移性 BTC，且先前未曾接受全身性治療者，評估使用IMFINZI 併用 gemcitabine 及 cisplatin對局部晚期或轉移性BTC的療效。於手術及/或輔助療法完成後，疾病在 > 6 個月之後復發的病人符合試驗的參加資格。病人符合美國東岸癌症臨床研究合作組織 (ECOG) 體能狀態為 0 或 1 分，且必須至少有一處符合 RECIST 1.1 版定義的目標病灶。

有下列情形的病人不符合試驗參加資格：患有壺腹癌；患有活性或病歷記載曾患自體免疫或發炎性疾病；人類免疫缺乏病毒感染或活性感染 (包括結核病或 C 型肝炎)；目前或第 1 劑 IMFINZI 前 14 天內曾使用免疫抑制藥物。

隨機分配依據疾病狀態(復發或無法手術切除)及原發腫瘤位置(肝內膽管癌 intrahepatic cholangiocarcinoma [ICCA]、肝外膽管癌 extrahepatic cholangiocarcinoma [ECCA]或膽囊癌 gallbladder cancer [GBC])分層。

病人1:1隨機分配接受以下治療：



- 每 21 天週期的第 1 天施用 IMFINZI 1500 mg，第 1 天及第 8 天施用 gemcitabine 1000 mg/m² 及 cisplatin 25 mg/m²，最多 8 個週期，之後每 4 週施用一次 IMFINZI 1500 mg，或是
- 每 21 天週期的第 1 天施用安慰劑，第 1 天及第 8 天施用 gemcitabine 1000 mg/m² 及 cisplatin 25 mg/m²，最多 8 個週期，之後每 4 週施用一次安慰劑 1500 mg。

IMFINZI或是安慰劑的療程，持續直到疾病惡化或發生無法耐受的毒性為止。

經試驗主持人判定，若病人臨床狀態穩定且具臨床益處時，允許在疾病惡化後繼續治療。


主要療效評估指標為整體存活期 (OS)。

其他療效評估指標為試驗主持人評估的無惡化存活期 (PFS)、客觀治療反應率 (ORR) 及反應持續時間(DoR)。隨機分配日後的 24 週內，每 6 週進行一次腫瘤評估，之後每 8 週一次，直到確認客觀疾病惡化為止。

試驗族群的特徵為：50%男性、中位年齡64歲(範圍：20-85歲)、47%病人年齡為65歲以上、56%亞洲人、37%白人、2%黑人或非裔美洲人、0.1%美洲印第安人或阿拉斯加原住民及4%其他；51%ECOG 體能分數 1 分；原發性腫瘤位置：56% ICCA、18% ECCA、25% GBC；20 %病人有復發疾病、86%為轉移性及14%為局部晚期疾病。根據預定期中分析顯示，隨機分配至 IMFINZI 併用化療的病人相對於安慰劑併用化療的病人，OS及PFS有具統計意義的改善。表26總結 TOPAZ-1 試驗的療效結果。

表26：TOPAZ-1試驗的療效結果

療效指標	IMFINZI併用 Gemcitabine及Cisplatin (N=341)	安慰劑併用Gemcitabine 及Cisplatin (N=344)
整體存活期 (OS)		
死亡人數 (%)	198 (58)	226 (66)
OS 中位數 (月) (95% CI)*	12.8 (11.1, 14)	11.5 (10.1, 12.5)
危險比 (95% CI) [†]	0.80 (0.66, 0.97)	
p 值 [‡]	0.021	
無惡化存活期 (PFS)		
出現事件的病人數 (%)	276 (81)	297 (86)
中位數 (月) (95% CI)*	7.2 (6.7, 7.4)	5.7 (5.6, 6.7)
危險比 (95% CI) [†]	0.75 (0.63, 0.89)	



療效指標	IMFINZI併用 Gemcitabine及Cisplatin (N=341)	安慰劑併用Gemcitabine 及Cisplatin (N=344)
p 值§	0.001	

*使用 Kaplan-Meier 衍生Brookmeyer-Crowley方法計算95%信賴區間。


† 依據疾病狀態及原發性腫瘤位置使用分層 Cox 比例危險模型分層。

‡ 依據alpha邊界值(0.030)相比的分層對數秩檢定取得雙側 p 值；

§ 依據alpha邊界值(0.048)相比的分層對數秩檢定取得雙側 p 值。

試驗主持人評估IMFINZI 併用化療的組別ORR為27% (95%CI：22% - 32%)，僅用化療的組別ORR為19%(95%CI：15% - 23%)。


圖 5：TOPAZ-1 試驗的OS 的 Kaplan-Meier 曲線



12.4 肝細胞癌

在 HIMALAYA 試驗 (NCT03298451) 中評估了IMFINZI與tremelimumab併用的療效。該研究是一項隨機 (1:1:1)、開放標籤、多中心研究，對象為確診無法切除之肝細胞癌，且之前未接受過全身性肝細胞癌治療的病人。病人被隨機分配到兩個研究組之一(IMFINZI 加 tremelimumab或IMFINZI)或sorafenib。試驗的治療包括在同一天接受注射IMFINZI 1500 mg 併用單次靜脈注射tremelimumab 300mg，之後每 4 週接受一次IMFINZI；每 4 週一次IMFINZI 1500 mg (未經核准的uHCC治療方案)；或每天口服兩次sorafenib 400 mg，直到疾病惡化或出現不可接受的毒性。IMFINZI的療效評估是基於隨機分配到IMFINZI加tremelimumab組與sorafenib組的病人。而隨機分配的分層因子為大血管侵犯(MVI) (是或否)、肝病病因(B型肝炎病毒或C型肝炎病毒或其他)和ECOG表現狀態(0或1)。

該試驗納入BCLC C期或B期(不適合局部區域治療)的病人。該試驗排除了同時感染病毒性B型肝炎和C型肝炎的病人；12 個月內現行的或之前有記錄的胃腸道(GI)出血；6個月內需要非藥物介入的腹水；治療開始前12個月內發生肝性腦病變；現行的或之前有記錄的自體免疫性或炎症疾病。納入試驗前並未強制進行上消化道內視鏡檢查，但對



於有食道靜脈曲張出血史或經治療醫師評估為食道靜脈曲張出血高風險的病人，需要依據醫療院所之準則進行上消化道內視鏡檢查。

在疾病惡化後，如果病人的臨床狀況穩定且研究者認為有臨床益處，則允許繼續接受試驗藥物治療。


主要療效指標是IMFINZI加tremelimumab組與sorafenib組之間的整體存活期(OS)。

其他療效指標包括根據RECIST v1.1由研究者評估的疾病無惡化存活期(PFS)、客觀反應率(ORR)和反應持續時間(DoR)。腫瘤評估在前12個月每8週進行一次，之後每12週進行一次。

IMFINZI 加 tremelimumab組和sorafenib組的基期人口統計數據如下：男性(85%)，年齡<65 歲(50%)，中位年齡65歲(18 至 88 歲)，白人(46%)、亞洲人(49%)、黑人或非裔美國人(2%)，ECOG PS 0 (62%); Child-Pugh A級(99%)，大血管侵犯(26%)，肝外擴散(53%)，病毒病因包括B型肝炎(31%)、C型肝炎(27%)、未感染(42%)。療效結果見表27和圖6。

表27：HIMALAYA試驗的療效結果

指標	IMFINZI併用 Tremelimumab (N=393)	Sorafenib (N=389)
整體存活期		
死亡數(%)	262 (66.7)	293 (75.3)
OS中位數 (月) (95% CI)	16.4 (14.2, 19.6)	13.8 (12.3, 16.1)
HR (95% CI) *	0.78 (0.66, 0.92)	
p值 ^{†, ‡}	0.0035	
疾病無惡化存活期		
事件數量(%)	335 (85.2)	327 (84.1)
PFS中位數 (月) (95% CI)	3.8 (3.7, 5.3)	4.1 (3.7, 5.5)
HR (95% CI)*	0.90 (0.77, 1.05)	
客觀反應率		
ORR % (95% CI) ^{§, ¶}	20.1 (16.3, 24.4)	5.1 (3.2, 7.8)
完全反應 n (%)	12 (3.1)	0
部分反應 n (%)	67 (17.0)	20 (5.1)
反應持續時間		



指標	IMFINZI併用 Tremelimumab (N=393)	Sorafenib (N=389)
DoR中位數 (月) (95% CI)	22.3 (13.7, NR)	18.4 (6.5, 26.0)
持續時間≥6個月之比例%	82.3	78.9
持續時間≥12個月之比例%	65.8	63.2

* HR(IMJUDO 和 durvalumab 與sorafenib)是基於分層 Cox 比例風險模型。

† 基於分層對數秩檢驗。


‡ 基於具有 O'Brien Fleming 類型邊界的 Lan-DeMets α 支出函數和觀察到的實際事件數，IMJUDO 和 durvalumab 與sorafenib的統計顯著性邊界為 0.0398 (Lan 和 DeMets 1983)。

§ 確認的完全反應或部分反應。

¶ 基於 Clopper-Pearson 方法。

CI=信賴區間，HR=危險比，NR=未達到


圖6：OS的Kaplan-Meier曲線



12.5 子宮內膜癌

DUO-E 是一項隨機分配、多中心、雙盲、安慰劑對照的第三期試驗，研究晚期或復發性子宮內膜癌病人接受第一線含鉑化療併用 IMFINZI，接續 IMFINZI 治療 (併用或未併用 olaparib)。病人的子宮內膜癌必須屬於以下其中一種：新診斷為第三期疾病 (在手術或診斷性組織切片後，具有 RECIST 1.1 版定義的可測量病灶)、新診斷為第四期疾病 (不論在手術或診斷性組織切片後是否患病) 或疾病復發 (具有 RECIST 1.1 版定義的可測量或不可測量病灶)，且單獨或併用手術治療的可能性很低。對於疾病復發的病人，先前的化療必須用於輔助治療，且從最後一次化療日到後續復發日期至少相隔 12 個月，才允許納入試驗。試驗中納入所有組織學類型的上皮子宮內膜癌病人，包括癌肉瘤 (carcinosarcomas)。排除子宮內膜肉瘤 (sarcoma) 的病人。

隨機分配的分層因子包括腫瘤組織的錯配修復 (MMR) 狀態 (功能正常或缺陷)、疾病狀態 (復發或新診斷)、地理區域 (亞洲或全球其他地區)。病人按 1:1:1 的比例隨機分配至以下任一組別：



- 第 1 組 (含鉑化療)：每 3 週一次含鉑化療 (paclitaxel 和 carboplatin)，最多 6 個週期，以及每 3 週一次 durvalumab 安慰劑。完成化療後，未出現客觀疾病惡化的病人每 4 週一次接受 durvalumab 安慰劑，以及每日兩錠 olaparib 安慰劑，作為維持治療，直到疾病惡化。
- 第 2 組 (含鉑化療 + IMFINZI)：每 3 週一次含鉑化療 (paclitaxel 和 carboplatin)，最多 6 個週期，以及每 3 週一次 durvalumab 1120 mg。完成化療後，未出現客觀疾病惡化的病人每 4 週一次接受 durvalumab 1500 mg，以及每日兩錠 olaparib 安慰劑，作為維持治療，直到疾病惡化。
- 第 3 組 (含鉑化療 + IMFINZI + olaparib)：每 3 週一次含鉑化療 (paclitaxel 和 carboplatin)，最多 6 個週期，以及每 3 週一次 durvalumab 1120 mg。完成化療後，未出現客觀疾病惡化的病人每 4 週一次接受 durvalumab 1500 mg，以及每日兩錠 olaparib 300 mg，作為維持治療，直到疾病惡化。

病人如果由於疾病惡化以外的原因停用任一藥品 (IMFINZI/安慰劑或 olaparib/安慰劑)，可依據毒性考量及試驗主持人的判斷，必要時繼續使用其他藥品進行治療。

持續治療直到發生 RECIST v1.1 定義的疾病惡化或無法耐受的毒性。自隨機分配起，最初 18 週每 9 週進行一次腫瘤狀態評估，之後每 12 週進行。

主要評估指標為試驗主持人依 RECIST 1.1 評估的無惡化存活期 (PFS)。次要療效指標包括整體存活期 (OS)、客觀反應率 (ORR) 和反應持續時間 (DoR)。

試驗結果顯示，相較於含鉑化療，在意圖治療 (ITT) 族群中接受含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 治療的病人 [HR=0.55 (95% CI: 0.43, 0.69)， $p < 0.0001$]，以及接受含鉑化療 + IMFINZI 治療的病人 [HR=0.71 (95% CI: 0.57, 0.89)， $p = 0.003$]，PFS 達到統計顯著改善。在 PFS 分析時，期中 OS 資料成熟度為 28%，718 名病人中有 199 人發生死亡事件。


錯配修復 (MMR) 狀態由中央實驗室使用 MMR 免疫組織化學檢驗分析確認。本試驗總計 718 名病人進行隨機分配，其中 575 人 (80%) 的腫瘤狀態為 MMR 功能正常 (pMMR)，143 人 (20%) 為 MMR 缺陷 (dMMR)。

錯配修復缺陷 (dMMR) 子宮內膜癌病人

在 dMMR 腫瘤狀態的病人中，人口學資料和基準點特性，在各治療組別皆大致平衡分佈。三組的基準點人口學資料如下：年齡中位數 62 歲 (範圍：34 至 85 歲)、41% 為 65 歲以上、1.5% 為 75 歲以上、62% 是白人、29% 是亞裔、2% 是黑人或非裔美國人。疾病特性如下：ECOG 體能狀態為 0 (58%) 或 1 (42%)；46% 為新診斷，54% 為疾病復發。組織學亞型包括類子宮內膜 (83%)、混合型上皮細胞 (5%)、漿液性 (3%)、癌肉瘤 (3%)、未分化 (2%) 及其他類型 (3%)。

表 28 和圖 7 摘述 dMMR 腫瘤狀態病人的結果。dMMR 腫瘤狀態資料截止病人的 PFS 追蹤期中位數方面，含鉑化療 + IMFINZI 組為 15.5 個月，含鉑化療組為 10.2 個月。在 PFS 分析時，期中 OS 資料成熟度為 26%，接受含鉑化療 + IMFINZI 治療以及接受含鉑化療的 95 名病人中有 25 人發生死亡事件。

表 28：DUO-E 試驗的療效結果 (dMMR 腫瘤狀態的病人)



	IMFINZI 併用 Carboplatin 和 Paclitaxel N=46	Carboplatin 和 Paclitaxel N=49
無惡化存活期 (PFS) ^{a,b}		
事件數 (%)	15 (32.6)	25 (51.0)
PFS 中位數 (月) (95% CI) ^c	NR (NR, NR)	7.0 (6.7, 14.8)
危險比 (95% CI)	0.42 (0.22, 0.80)	
客觀反應率 (ORR) ^b		
客觀反應率 (ORR)	N=42	N=42
ORR % (95% CI)	71.4 (55.4, 84.3)	40.5 (25.6, 56.7)
完全反應 n (%)	12 (28.6)	4 (9.5)
部分反應n (%)	18 (42.9)	13 (31.0)
反應持續時間 (DoR) ^b		
DoR 中位數 (月) (範圍)	NR (2.4+, 26.9+)	10.5 (2.1+, 25.2+)

^a 試驗主持人評估。


^b 結果根據第一次期中分析 (資料截止：2023 年 4 月 12 日)。

^c 使用 Kaplan-Meier 方法計算。

^d 治療反應：最佳客觀反應為經確認的完全反應或部分反應。根據治療組在基準點時具有可測量病灶的病人數 (Carboplatin和Paclitaxel + IMFINZI 組 N=42，含鉑化療組 N=42)。

CI = 信賴區間，HR = 危險比，NR = 未達到

圖 7：DUO-E 試驗的 PFS Kaplan-Meier 曲線 (dMMR 腫瘤狀態的病人)



錯配修復功能正常 (pMMR) 子宮內膜癌病人

在 pMMR 腫瘤狀態的病人中，人口學資料和基準點特性，在各治療組別皆大致平衡分佈。三組的基準點人口學資料如下：年齡中位數 64 歲 (範圍：22 至 86 歲)，48% 為 65 歲以上、8.1% 為 75 歲以上、56% 是白人、30% 是亞裔、6% 是黑人或非裔美國人。疾病特性如下：ECOG 體能狀態為 0 (69%) 或 1 (31%)；47% 為新診斷，53% 為疾病復發。組織學亞型包括類子宮內膜 (54%)、漿液性 (26%)、癌肉瘤 (8%)、混合型上皮細胞 (4%)、透明細胞 (3%)、未分化 (2%)、黏液性 (<1%) 及其他類型 (3%)。

表 29 和圖 8 摘述 pMMR 腫瘤狀態病人的結果。pMMR 腫瘤狀態資料截止病人的追蹤期中位數方面，含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組為 15.2 個月，含鉑化療組為 12.8 個月。

在 PFS 分析時，期中 OS 資料成熟度為 29%，接受含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 治療以及接受含鉑化療的 383 名病人中有 110 人發生死亡事件。

表 29：DUO-E 試驗的療效結果 (pMMR 腫瘤狀態的病人)

	IMFINZI + Olaparib 併用 Carboplatin 和 Paclitaxel N=191	Carboplatin 和 Paclitaxel N=192
無惡化存活期 (PFS) ^{a,b}		
事件數 (%)	108 (56.5)	148 (77.1)
PFS 中位數 (月) (95% CI) ^c	15.0 (12.4, 18.0)	9.7 (9.2, 10.1)



	IMFINZI + Olaparib 併用 Carboplatin 和 Paclitaxel N=191	Carboplatin 和 Paclitaxel N=192
危險比 (95% CI)	0.57 (0.44, 0.73)	
客觀反應率 (ORR) ^b		
客觀反應率 (ORR)	N=147	N=156
ORR % (95% CI)	61.2 (52.8, 69.1)	59.0 (50.8, 66.8)
完全反應 n (%)	23 (15.6)	15 (9.6)
部分反應n (%)	67 (45.6)	77 (49.4)
反應持續時間 (DoR) ^b		
DoR 中位數 (月) (範圍)	18.7 (2.8+, 29.6+)	7.6 (2.1+, 29.7+)


^a 試驗主持人評估。


^b 結果根據第一次期中分析 (資料截止：2023 年 4 月 12 日)。

^c 使用 Kaplan-Meier 方法計算。

^d 治療反應：最佳客觀反應為經確認的完全反應或部分反應。根據治療組在基準點時具有可測量病灶的病人數 (含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組 N=147，含鉑化療組 N=156)。CI = 信賴區間，HR = 危險比，NR = 未達到

圖 8：DUO-E 試驗的 PFS Kaplan-Meier 曲線 (pMMR 腫瘤狀態的病人)





在 pMMR 腫瘤狀態的病人中，

含鉑化療 + IMFINZI + olaparib 組相較於含鉑化療組，PD-L1 陽性表現的病人 (236/383; 62%) 的 PFS HR 為 0.44 (95% CI: 0.31, 0.61)，PD-L1 陰性表現的病人 (140/383; 37%) 的 PFS HR 為 0.87 (95% CI: 0.59, 1.28)。PD-L1 陽性表現定義為腫瘤陽性面積 (TAP) $\geq 1\%$ 。

12.6 肌肉層侵犯型膀胱癌(MIBC)

肌肉層侵犯型膀胱癌 – NIAGARA試驗

NIAGARA (NCT03732677) 是一項隨機分配、開放性、多中心試驗，目的為評估使用 IMFINZI 併用 gemcitabine 和 cisplatin 作為術前前導性治療，接續使用 IMFINZI 單一藥物作為術後輔助治療，對於 MIBC 病人的療效。試驗中隨機分配 (1:1) 1,063 名適合接受根除性膀胱切除術，且先前未接受過 NMIBC 或 MIBC 全身性化療或免疫介導療法的病人。該試驗排除具有單純非泌尿道上皮組織學、任何小細胞組織學及原發性非膀胱 (即輸尿管、尿道或腎盂) 泌尿道上皮癌的病人。

隨機分配分層因子為：臨床腫瘤分期 T2N0 或 $> T2N0$ (包括 T2N1、T3、T4a)；腎功能 (肌酐清除率 [CrCl] ≥ 60 mL/min，或 CrCl ≥ 40 至 < 60 mL/min)；PD-L1 表現量 (高或低/陰性)。病人接受：

- 手術前每 3 週一次 IMFINZI 1500 mg + gemcitabine 1,000 mg/m² 和 cisplatin 70 mg/m²，共 4 個週期，接續手術後每 4 週一次 IMFINZI 1500 mg 單一藥物輔助治療，最多 8 個週期，或
- 手術前每 3 週一次 gemcitabine 1000 mg/m² 和 cisplatin 70 mg/m²，共 4 個週期，不使用術後輔助治療。

在兩組中，CrCl ≥ 40 至 < 60 mL/min 病人，在每個週期的第 1 天和第 8 天各接受 cisplatin 一半劑量 35 mg/m²。


基準點及前導性治療完成時 (手術前)，進行 RECIST 1.1 腫瘤評估。術後 24 個月內，每 12 週進行一次 RECIST 1.1 腫瘤評估，其後 36 個月內每 24 週一次，再之後每 52 週一次，直到疾病惡化、試驗結束或死亡。

主要療效結果指標為由盲性獨立中央審查 (BICR) 評估的無事件存活期 (EFS)。其他療效結果指標包括整體存活期 (OS)。

基準點人口學資料為：男性 (82%)；年齡中位數 65 歲 (範圍 32 至 84 歲)，年齡 ≥ 65 歲 (53%)；白人 (67%)、亞裔 (28%)、黑人或非裔美國人 (0.9%)、其他 (0.8%)、西語裔或中南美裔 (8%)；ECOG 體能狀態 0 分 (78%) 或 1 分 (22%)。疾病特性：腫瘤分期 T2N0 (40%) 或 $> T2N0$ (60%)；區域性淋巴結 N0 (95%) 或 N1 (5%)；適當腎功能 (81%) 或臨界腎功能 (19%)。組織學亞型包括：泌尿道上皮癌 (85%)、組織學變異之泌尿道上皮癌 (15%)。

在所有受試者中，IMFINZI 併用 gemcitabine 及 cisplatin 組有 469 名 (88%) 病人，以及 gemcitabine 及 cisplatin 組有 441 名 (83%) 病人接受了根除性膀胱切除術。

此試驗預定的期中分析證實，相對於 gemcitabine 及 cisplatin 組，IMFINZI 併用 gemcitabine 及 cisplatin 組在 EFS 及 OS 方面達到統計顯著的改善。本試驗的設計並未



針對治療各階段（術前前導性或術後輔助治療）中 IMFINZI 的效果進行單獨評估。請見表 30 以及圖 9、圖 10。

表 30：NIAGARA 試驗的療效結果

	IMFINZI 併用gemcitabine及cisplatin (N=533)	Gemcitabine及cisplatin (N = 530)
EFS*		
事件數 (%)	187 (35.1)	246 (46.4)
EFS 中位數 (月) (95% CI) [‡]	NR (NR, NR)	46.1 (32.2, NR)
HR (95% CI) [†]	0.68 (0.56, 0.82)	
雙側 p 值 ^{§, #}	<0.0001	
OS*		
事件數 (%)	136 (25.5)	169 (31.9)
OS 中位數 (月) (95% CI) [‡]	NR (NR, NR)	NR (NR, NR)
HR (95% CI) [†]	0.75 (0.59, 0.93)	
雙側 p 值 ^{§, #}	0.0106	

* EFS定義為自隨機分組起至下列任一事件首次發生的時間，以最先發生者為準：根除性膀胱切除術後疾病首次復發的時間；因醫療因素無法接受根除性膀胱切除術的病人，出現首次明確疾病進展的時間；拒絕接受根除性膀胱切除術的病人預計手術的時間，或有殘餘病灶受試者而未能接受根除性膀胱切除術的時間；或因任何原因導致死亡的時間。

[†] 依據分層 Cox 比例風險模型。

[§] 依據分層對數秩檢定。

[#] 期中分析時分配給 EFS 的顯著水準 (alpha) 為 0.0412，分配給 OS 的顯著水準為 0.0154。

CI = 信賴區間；HR = 風險比；NR = 未達到。

圖 9：EFS的Kaplan-Meier曲線





圖 10：OS的Kaplan-Meier曲線



12.7 胃腺癌或胃食道接合處腺癌


可手術切除的胃腺癌或胃食道接合處腺癌的術前前導性及術後輔助治療—

MATTERHORN

MATTERHORN (NCT04592913) 為一項隨機分配、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗，探討 IMFINZI 併用 FLOT作為術前前導性和術後輔助治療，接著以 IMFINZI 作為單一藥物輔助治療的療效，試驗納入 948 名先前未曾接受治療且患有可手術切除的 GC/GEJC 的病人(第 II 期至第 IVA 期 [AJCC 第 8 版])。符合資格的病人先前未曾接受免疫介導療法且WHO/ECOG 體能狀態為 0 或 1。活動性或先前病歷記載患有自體免疫或發炎疾病，或在第一劑 durvalumab 的 14 天內曾使用免疫抑制藥物的病人不符合資格。

隨機分配的分層因子包括地理區域 (亞洲或亞洲以外)、臨床淋巴結狀態 (陽性或陰性)、PD-L1 表現狀態 (TAP < 1% 或 TAP ≥ 1%)。

病人按 1:1 比例隨機分配進入下列治療組之一。兩試驗組之間不得轉換。



- 每 4 週一次第 1 天 IMFINZI 1500 mg + 第 1 天和第 15 天 FLOT，於術前前導性治療階段 2 個週期及術後輔助治療階段 2 個週期，接著每 4 週一次第 1 天 IMFINZI 1500 mg，最多 10 個額外週期，術後階段總計 12 個週期 (每個週期 1 劑 IMFINZI)
- 每 4 週一次第 1 天安慰劑 + 第 1 天和第 15 天 FLOT，於術前前導性治療階段 2 個週期及術後輔助治療階段 2 個週期，接著每 4 週一次第 1 天安慰劑，術後最多 10 個額外週期，總計 12 個週期 (每個週期 1 劑)

在術前前導性治療開始前、手術前、術後輔助治療開始前，依據 RECIST 進行腫瘤評估。接著每 12 週評估一次，持續 2 年，之後每 24 週一次，直到發生 RECIST 1.1 版定義的放射影像疾病惡化、撤回同意或死亡為止。

試驗主要療效評估指標為盲性獨立中央審查 (BICR) 評估的無事件存活期 (EFS)。EFS 定義為以下任一情形之最早發生時間：依 RECIST 1.1 判定之疾病惡化，且導致無法手術，或在術前前導性治療期間需要非試驗設計規定之治療；在術後輔助治療期間，依 RECIST 1.1 判定之惡化（於 R1/R2 切除後）或復發（於 R0 切除後）；非 RECIST 所界定之惡化（依試驗主持人評估或經當地病理檢驗確認），且導致無法手術，或在術前前導性治療期間需要非試驗設計規定之治療，或於手術過程中被發現；手術後經當地病理檢驗確認之惡化或復發；死亡。


其他療效評估指標為整體存活期 (OS) 和盲性中央病理審查的病理完全反應 (pCR)。本試驗的設計並未針對治療各階段（術前前導性或術後輔助治療）中 IMFINZI 的效果進行單獨評估。

人口學資料為：年齡中位數 62 歲 (範圍 26 至 84 歲)，年齡 ≥ 65 歲 (41%)；男性 (72%)、白人 (68%)、亞裔 (20%)、美洲印第安人或阿拉斯加原住民 (4%)、黑人或非裔美國人 (1.1%)、其他種族 (1.7%)、西語裔或中南美裔 (20%)；WHO/ECOG 體能狀態 0 分 (74%)。疾病特性如下：第 II 期 (29%)、第 III 期 (62%)、第 IVA 期 (9%)、胃部 (68%)、胃食道交界 (32%)、Siewert 氏分類第 1 型 (10%)、Siewert 氏分類第 2 型 (15%)、Siewert 氏分類第 3 型 (7%)、腸型 (51%)、瀰漫型 (26%)、未定型 (23%)、臨床淋巴結狀態陽性 (70%)、臨床淋巴結狀態陰性 (29%)、PD-L1 表現狀態 TAP $\geq 1\%$ (90%)、PD-L1 表現狀態 TAP $< 1\%$ (10%)。

完成根治性目的手術的病人人數，IMFINZI 治療組為 412 (87%) 人，安慰劑組為 400 (84%) 人。延遲手術（定義為自術前前導性治療最後一次給藥起，超過 8 週後嘗試進行手術）於 IMFINZI 組有 48 位病人 (10%)，安慰劑組有 51 位病人 (11%)。在 IMFINZI 組中，完成 2 個週期 IMFINZI 術後輔助治療者為 248 位 (52%)，完成 2 個週期 FLOT 術後輔助治療者為 291 位 (61%)。在安慰劑組中，完成 2 個週期安慰劑術後輔助治療者為 245 位 (52%)，完成 2 個週期 FLOT 術後輔助治療者為 303 位 (64%)。IMFINZI 組中有 344 位 (73%) 病人接受單獨使用 IMFINZI 作為術後輔助治療，相較之下，安慰劑組為 332 位 (70%)。

此試驗證實，相對於安慰劑組，IMFINZI 組在 EFS 方面達到統計顯著的改善。請見表 31、圖 11 及圖 12。

表 31：MATTERHORN 試驗的療效結果



	IMFINZI + FLOT 化療 (N = 474)	安慰劑 + FLOT 化療 (N = 474)
無事件存活期 (EFS)*		
事件數・n (%)	167 (35)	218 (46)
EFS 中位數 (月) (95% CI) ‡	NR (40.7, NE)	32.8 (27.9, NE)
危險比 (95% CI)†	0.71 (0.58, 0.86)	
p 值¶	<0.001	
整體存活期 (OS)*		
事件數(%)	160 (33.8)	192 (40.5)
OS 中位數 (月) (95% CI) ‡	NR (NE, NE)	NR (NE, NE)
危險比 (95% CI)†	0.78 (0.63, 0.96)	
p 值§	0.021	
病理完全反應 (pCR)*		
達到反應的病人數	91	34
反應率・(%) (95% CI)#	19.2 (15.8, 23.0)	7.2 (5.0, 9.9)
p 值¥	<0.001	

* EFS結果係依據預先指定的期中分析 (資料截止日期：2024 年 12 月 20 日) · OS結果係依據預先指定的最終分析 (資料截止日期：2025 年 9 月 1 日) · pCR結果係依據預先指定的最終分析 (資料截止日期：2023 年 2 月 1 日)。

‡ 使用 Kaplan-Meier 方法計算。

† 根據分層 Cox 比例風險模型，隨機分配時依地理區域、臨床淋巴結狀態和 PD-L1 表現狀態進行分層。CI 以剖面概似方法計算。

¶ 根據對地理區域、臨床淋巴結狀態、PD-L1 表現狀態分層調整後的分層對數秩檢定。採用 O'Brien–Fleming 邊界，雙側顯著水準為 0.0239。

§ 根據對地理區域、臨床淋巴結狀態、PD-L1 表現狀態分層調整後的分層對數秩檢定。採用 O'Brien–Fleming 邊界，雙側顯著水準為 0.0499。

CI 以 Clopper Pearson 方法計算。



※ 根據對地理區域、臨床淋巴結狀態、PD-L1 表現狀態分層調整後的Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 檢定。採用預先規定的邊界 0.001 (雙側) 。
CI = 信賴區間，HR = 危險比，NE = 無法估計，NR = 未達到。

圖11：EFS的Kaplan-Meier曲線





圖12：OS的Kaplan-Meier曲線



13 包裝及儲存

13.1 包裝

IMFINZI (durvalumab) 注射液是一種清澈至乳白色，無色至微黃色溶液，以裝有 1 個單劑量小瓶的紙盒供應：

- 500 mg/10 mL
- 120 mg/2.4 mL

13.2 效期


保存期限請參照標籤或外盒

13.3 儲存條件

以原裝紙盒避光儲存，冷藏於 2°C 至 8°C。不可冷凍。不可搖晃。

15 其他

版本日期：2026年03月 (USPI: 11/2025)



製造廠：CALENT INDIANA, LLC

製造廠廠址：1300 SOUTH PATTERSON DRIVE, BLOOMINGTON, IN 47403 US

製造廠：VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG

製造廠廠址：MOOSWIESEN 2, 88214 RAVENSBURG, GERMANY

製造廠：ASTRAZENECA AB

製造廠廠址：GARTUNAVAGEN SE-152 57 SODERTALJE SWEDEN

包裝廠：ASTRAZENECA AB

包裝廠廠址：FORSKARGATAN 18,151 36, SODERTALJE, SWEDEN

包裝廠：ASTRAZENECA AB

包裝廠廠址：GARTUNAVAGEN SE-152 57 SODERTALJE SWEDEN

包裝廠：CALENT INDIANA, LLC

包裝廠廠址：1300 SOUTH PATTERSON DRIVE, BLOOMINGTON, IN 47403 US

藥商：臺灣阿斯特捷利康股份有限公司

地 址：臺北市大安區敦化南路二段207號21樓

IMFINZI is a registered trademark of AstraZeneca group of companies.

製造廠

包裝廠：ASTRAZENECA AB

GARTUNAVAGEN SE-152 57 SODERTALJE SWEDEN

製造廠：VETTER PHARMA-
FERTIGUNG GMBH & CO KG

MOOSWIESEN 2, 88214 RAVENSBURG, GERMANY

包裝廠：CALENT INDIANA,
LLC

1300 SOUTH PATTERSON DRIVE, BLOOMINGTON, IN 47403
US

包裝廠：ASTRAZENECA AB

FORSKARGATAN 18,151 36, SODERTALJE, SWEDEN

製造廠：ASTRAZENECA AB

GARTUNAVAGEN SE-152 57 SODERTALJE SWEDEN

製造廠：CALENT INDIANA,
LLC

1300 SOUTH PATTERSON DRIVE, BLOOMINGTON, IN 47403
US

藥商

臺灣阿斯特捷利康股份有限公司

台北市大安區敦化南路二段207號21樓