



艾舒心[®] 注射液 0.1%
Isocin[®] Injection 0.1%

【成份】

Each ml contains :

Isosorbide Dinitrate (Diluted)

(Eq. to Isosorbide Dinitrate.....1 mg)

賦形劑：Water For Injection

【適應症】

治療狹心症之發作。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

可依病患的反應調整劑量。一般而言，每小時投藥 2~7mg 為適當劑量。雖然有時必需投以高劑量達每小時 10mg。

建議濃度：

5 支 10ml 安瓿的本品應以適當溶液(如氯化鈉注射液或葡萄糖注射液)稀釋至 500ml，最終濃度為 100µg/ml。如有必要降低液體攝取，可增加輸注液濃度，以 10 支 10ml 安瓿的本品加入適當溶液稀釋至 500ml，最終濃度為 200 µg/ml。

本品在包裝開啟後應立即加入輸注液中。混合稀釋的過程應保持無菌操作。

本品建議劑量表：

(100µg/ml) 5 支安瓿稀釋至 500ml 流速		本品劑量 mg/hour	(200µg/ml) 10 支安瓿稀釋至 500ml 流速	
µ drops/min ml/hour	drops/min		µ drops/min ml/hour	drops/min
10	3-4	1	5	1-2
20	7	2	10	3
30	10	3	15	5
40	13	4	20	7
50	17	5	25	8
60	20	6	30	10
70	23	7	35	12
80	27	8	40	13
90	30	9	45	15
100	33	10	50	17

1ml 約等於 60 滴小兒使用的微滴，相當於 20 滴標準滴

以上劑量表係說明以最終濃度 100µg/ml 或 200µg/ml 的藥液投藥，欲達到一定劑量的本品 (mg/hour) 的建議輸注方式。

例如：

劑量非常容易換算，如果病患需以每小時 6mg 本品之劑量投藥，使用 100µg/ml 的藥液，則應該以每分鐘 60 微滴（相當於每小時 60ml），或每分鐘 20 滴的流速給藥。如有必要限制病

患液體攝取量，相同劑量（每小時 60ml）的本品可使用 200µg/ml 藥液，每分鐘 30 微滴（相當於每小時 30ml），或每分鐘 10 滴的流速給藥。

給藥方式：

本品原包裝係為高濃度藥品，不得直接注射給藥。給藥前應以適當的輸注液如氯化鈉或葡萄糖溶液加以稀釋。調配妥當的本品藥液應以靜脈輸注給藥，或輔以注射幫浦。在給藥期間應密切注意病患的血壓及脈搏。稀釋用的輸注液應先扣除本品的等量藥液容積，再配置成最終濃度的藥劑。

兒童用藥：

本品使用在兒童的療效和安全性尚未確認。

【藥品使用相關的注意事項】依文獻記載

相容性：

本品為含有 Isosorbide dinitrate 的等張生理食鹽液，與一般的輸注液皆相容。目前為止並未發現不能相容的報告。

本品與玻璃輸注瓶以及聚乙烯（polyethylene）材質的輸注套組可以相容。

本品可使用玻璃或硬塑膠材質的針筒幫浦進行緩慢輸注。

【禁忌症】依文獻記載

本品不可用於治療心因性休克，除非已有採取措施使病患的舒張壓維持在正常範圍，例如：給予刺激收縮的藥物。

本品禁用於循環衰竭及嚴重低血壓的病患。

本品不應給予已知對硝酸鹽藥物過敏、顯著貧血、頭部創傷、腦出血或容積不足的病患。

【注意事項】依文獻記載

本品投藥期間應密切監測脈搏及血壓。

本品使用於可能有狹角性青光眼、甲狀腺機能過低、營養不良、嚴重肝或腎臟疾病，或體溫過低等患者應小心注意。

除非醫師判定為必要，本產品不應在懷孕或泌乳期間使用。

【不良反應】依文獻記載

一般而言，全身性的動脈壓快速下降可能會造成腦部血流不足，以及減低冠狀動脈灌流。但本品的臨床經驗顯示在正常情況下並不會有這類問題。因為 Isosorbide dinitrate 的血管擴張作用主要是針對循環系統中的靜脈而非動脈。正如其他硝酸鹽藥物一般的不良反應，在給藥期間可能會出現頭痛和噁心。

【儲存條件】25℃ 以下儲存。

【包裝】10ml 安瓿，100 支以下盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路 182 號