

10.5cm

衛部藥製字第058553號

“政德”樂克痢黴素 乾粉注射劑 200萬單位

Locolin Powder for Injection 2,000,000U. "Gentle"

【性 狀】

Locolin (Sodium Colistin Methanesulfonate或Colistimethate Sodium)為白色～淡黃色之粉末，其化學本質為鹽基性多肽類(Polypeptide)，在PH2-10等範圍內，效果不變。

PH及滲透壓比(以注射用蒸餾水4ml當溶解劑)

| 規 格  | 濃 度      | PH  | 滲透壓比 |
|------|----------|-----|------|
| 200萬 | 50萬單位/ml | 6.6 | 0.6  |

【成 分】

每瓶含Sodium Colistin Methanesulfonate....200萬單位(66.8mg Colistin base 力價)  
賦形劑：無

【適 應 症】

限用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。  
肌肉注射或靜脈注射。

1. 肌肉注射：

- (1)腎功能正常之病患，2.5~5mg/kg/day 分2~4 次劑量注射，依年齡、症狀輕重適宜增減之。  
(2)成人腎功能障害之病患使用sterile colistimethate sodium 劑量推薦表如下：

| RENAL FUNCTION                                 | DEGREE OF IMPAIRMENT |         |          |              |
|------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------------|
|                                                | Normal               | Mild    | Moderate | Considerable |
| Plasma creatinine, mg/100ml                    | 0.7-1.2              | 1.3-1.5 | 1.6-2.5  | 2.6-4.0      |
| Urea clearance, % of normal                    | 80-100               | 40-70   | 25-40    | 10-25        |
| DOSAGE                                         |                      |         |          |              |
| Unit dose of sterile Colistimethate sodium, mg | 100-150              | 75-115  | 66-150   | 100-150      |
| Frequency, times/day                           | 4 to 2               | 2       | 2 or 1   | every 36hr   |
| Total daily dose, mg                           | 300                  | 150-230 | 133-150  | 100          |
| Approximate daily dose, mg/kg/day              | 5.0                  | 2.5-3.8 | 2.5      | 1.5          |

備註：注射本劑時，單一劑量為2.5~5mg/kg，注射之時距，依腎功能障害程度而定。  
用法：將本劑66.8mg 小瓶以2ml 之注射用滅菌蒸餾水或生理食鹽水溶解即每ml 含有33.4mg 之colistin base；溶解時，輕輕的旋轉小瓶，避免產生泡沫。

2. 靜脈注射：

- (1)直接間歇靜脈注射：一次為半日劑量，投與時間要超過3 至5 分鐘以上，緩慢注射，每12 小時一次。  
(2)靜脈點滴輸注注射：一次為半日劑量，投與時間要超過3 至5 分鐘以上。  
腎功能正常病患於靜脈點滴輸注開始1~2 小時，以每小時5~6mg速率注射。  
腎功能障害病患依其障害程度，降低其注射速率。  
下列敘述之輸注液能與本劑配合使用。  
(1)0.9% Sodium Chloride inj.  
(2)5% Dextrose in 0.9% NaCl inj.  
(3)5% Dextrose inj.  
(4)5% Dextrose in 0.45% NaCl inj.  
(5)5% Dextrose in 0.225% NaCl inj.  
(6)Lactated Ringer's Solution.  
(7)10% Invert sugar solution.

任何含本劑之輸注液須新鮮調配且24 小時內使用完畢。

【注意事項】

- 一、曾對Colistin 或Polymyxin B 產生過敏症狀之患者，禁用本劑。  
二、對有腎障礙之患者，使用本劑，宜慎重投與。  
三、副作用：  
1. 腎臟：使用本劑少有腎障礙出現，在充分觀察中，若發現腎機能異常時，立刻停止使用本劑。  
2. 神經系：使用本劑若有難聽、知覺異常、頭痛、發熱、嗜眠、運動失調、視覺障礙、神經筋無力、呼吸抑制等症狀出現時，中止使用本劑。  
3. 消化道：使用本劑，偶有嘔吐、食慾不振、下痢等症狀出現。  
4. 過敏症：使用本劑，若產生發疹等過敏症狀，立刻中止投與。  
四、本劑對孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，故若非必要，少用本劑。  
五、藥物相互作用：本劑與下列藥物合用時，可能會產生神經肌肉阻斷作用，或呼吸抑制作用，故宜慎重投與：麻醉劑、筋弛緩劑、氨基酸苷類抗生素等。

【貯存方法】

室溫保存(25°C)。  
本劑注射用蒸餾水溶解後，室溫可保存7天，在冰箱不致凍結之狀態可保存2星期。

【有效期限】請見藥品外包裝及瓶身標示。

【包 裝】6毫升玻璃小瓶裝，50 支以下盒裝



政德製藥股份有限公司  
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號

29.7cm