

“政德” **樂活朗** 注射劑 1.0 公克
(使治他新鈉)

Loforan for injection 1.0 Gm “Gentle”
(Cefotaxime Sodium)

Loforan 係 cephalosporin 系抗生素，具殺菌效果，對大部分的病原菌，其最小殺菌濃度，只比它最小的抑菌濃度稍微高一點而已。對 G(+) 及 G(-) 菌均具有殺菌作用，尤其對 G(-) 桿狀菌的殺菌效果比目前所知的 cephalosporins 及 penicillins 強好幾倍，抗藥性之發生很慢，依注射方式之不同其與血清蛋白之結合量為 32~50%，組織內移行良好，主要以活性型經由腎臟排泄。對小孩及嬰兒之使用效果更為良好，Loforan 使用於敏感菌引起之全身或局部性感染如呼吸道、腎臟及泌尿系統、敗血症、細菌性心內膜炎、腦膜炎、骨骼、關節軟組織與皮膚炎症、腹腔炎症、耳鼻喉感染、生殖器官感染等。在嚴重感染時不必等待敏感菌試驗可併用 Aminoglycosides 可避免延誤治療時機。

成份：每瓶含

主成份：

Cefotaxime sodium..... 1048mg

eq. to Cefotaxime..... 1000mg

賦形劑：無。

適應症：呼吸道感染、腎臟與尿道感染、敗血症、細菌性心內膜炎、腦膜炎、骨骼、關節軟組織及皮膚炎症、腹腔炎症、耳鼻喉之感染及生殖器官感染。

用法用量：成人一日 1~2g，小孩及嬰兒依每公斤體重 50~100mg 分二次，每 12 小時或 6 小時一次，緩徐肌肉或靜脈注射，靜脈注射時間 3~5 分鐘，重症時可加大劑量一天 200mg/kg 分數次使用。本藥限由醫師使用。

注意事項：

1. 對 Cephalosporin 過敏病人不可使用。
2. 副作用極少如皮膚反應，發燒，嗜伊紅性血球增多，過敏，暫時性白血球減少，暫時性血清酵素增高，偶而有腹瀉現象，此時須停藥。
3. 過敏性休克很少發生，一般在注射後 30 分發生，此時須讓病人躺下，使呼吸道暢通，使用人工呼吸器，靜脈注射交感神經刺激劑與大量腎上腺皮質素。
4. 藥物交互作用 (1) 併用利尿劑可能會引起腎功能障礙但至目前為止仍未發現，但最好避免。(2) 使用後糖尿病會呈假陽性。(3) 有些病人在做 direct coombs test 會呈陽性。
5. 注射時請使用新鮮配製之溶液，若貯藏在冰箱內可保持 24 小時安定性水溶液變為深黃色或褐色則須丟棄。
6. 遮光保存，貯藏在 25°C 以下。

包裝：100 支以下小瓶盒裝。



政德製藥股份有限公司
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號