

“南光” **腦寶** 注射液

Noopol Injection "N.K."

□成分：Each mL contains:

Piracetam 200 mg

□賦形劑：Glacial Acetic acid 10%、Water for Injection。

□適應症：

對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

□用法用量：

【注射液】本藥限由醫師使用。

平均劑量為：以 1gm 計一次 1 安瓿，每天三次。靜脈、肌肉注射均可。
在初期注射投藥時，每天可達到 10gm 或 15gm，依病情的輕重而酌量使用。

兒童：按體重，每天 30~50mg/公斤體重之間。

治療期間：除一些急性病例其效果幾乎即可顯見外，通常自第三星期後可看出進步，為了要使病情更好和增加其進步，必須依醫師指示繼續使用。

老人：根據其腎臟功能調整使用劑量。

□注意事項：

禁忌：嚴重腎臟機能不全者禁用。

□交互作用：

與warfarin併用時可能有出血(月經)之症狀出現。

□副作用：

於治療初期可能有精神運動性的精神激昂的症狀，但少見。
其餘神經性症狀如頭痛、痙攣、暈眩、錐體外症狀及胃腸道症狀如噁心、嘔吐、厭食、下痢、便秘、及胃痛偶會發生。消化功能之改變亦曾發生。

□儲藏：本藥應置於單劑量熔封容器內，並貯存於陰涼處，25℃以下。

□包裝：5、10毫升安瓿裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 011420 號



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

TEL: (06)5984121(代表) FAX: (06)5981845