

## 賜克菌 乾粉注射劑 1公克

## Phel Powder for Injection 1gm

Cephalexin sodium是一種注射用半合成頭孢子菌素類抗生素，具有廣效性抗菌作用。本品之作用機轉為抑制細菌細胞壁合成，抗菌範圍廣泛包括G(+)菌及G(-)菌，且對penicillin之耐性菌有效。本品與其他類抗生素間無交叉耐性，投與後可高濃度移行至各器官，尤其是腎、肝、肺及膽，並且高濃度自尿中排泄。

Cephalexin sodium對下列細菌呈現殺菌效果：

乙種溶血性鏈球菌及其他鏈球菌( $\beta$ -hemolytic and other streptococci)、腸球菌(Enterococci)中之許多菌株如糞鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、肺炎克雷白氏桿菌(Klebsiella pneumoniae)、流行性感胃嗜血桿菌。

成 分 Each vial contains:

Cephalexin(as sodium).....1000mg(potency)

適應症 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量 通常成人每日2-8gm幼兒每日每公斤體重50-100mg。  
腎功能不全者按下表調整劑量：

| 肌酸酐廓清率(ml/min) | 最大成人劑量(g/day) |
|----------------|---------------|
| 20-50          | 3             |
| 5-20           | 1.5           |
| <5             | 0.5           |

分次行肌肉或靜脈注射。本藥限由醫師使用。

## 注意事項

- 1.一般注意事項：須先做休克之過敏試驗。
- 2.禁忌：對本藥會發生休克之患者。
- 3.慎重投與：
  - ①會對penicillin系或Cephalosporin系藥物過敏者。
  - ②本人或雙親及兄弟中有人具有支氣管痙攣、發疹、蕁麻疹等過敏性體質者。
  - ③嚴重腎障害之患者。
  - ④經口攝取不良或非經口營養之患者、高齡者、全身狀況不良之患者。
- 4.副作用：
  - ①休克：須小心觀察，若有不快感、口內異常感、耳鳴、眩暈、便意、喘鳴、發汗等現象應停止用藥。
  - ②過敏症：發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴節腫脹、關節痛等症狀應停藥並適當處理。

- ③血液：顆粒球減少、好酸球增多、血小板減少、溶血性貧血。
- ④肝臟：出現黃疸、SGOT、SGPT、alkaline phosphatase上昇。
- 腎臟：間有BUN、Creatinine上昇、乏尿、蛋白尿等腎障礙之現象出現，須詳細觀察，若有異常現象出現須適當處置。
- ⑤胃腸：發熱、腹痛、白血球增多、伴有粘液及血液便等急性下痢症狀的嚴重大腸炎、內視鏡檢查可看見偽膜斑形成，出現偽膜性大腸炎、腹痛及頻回的下痢應即停藥並做適當處置。此外有噁心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食慾不振、胃部不快感。
- ⑥菌交代症：口內炎、念珠菌症。
- ⑦維他命缺乏症：維他命K缺乏(低prothrombin血症、出血傾向)，維他命B群缺乏症(舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎)。
- ⑧其他：頭痛、目眩、全身倦怠。
- 5.對孕婦之安全性尚未確立，須基於有益性之判斷再使用。
- 6.臨床檢查值之影響：
  - ①除了Test Tape外Benedict氏；Fehling氏液及clini test的尿糖檢查值呈偽陽性。
  - ②Creatinine的測定，使用picric acid反應的測定值會上升。
  - ③BCG法測定Alubumin會使Alubumin及BCG結合發生競合阻害，測定值減低。
  - ④直接coombs試驗呈陽性。
- 7.使用上注意：
  - ①靜脈內大量投與會引起血管痛、血栓靜脈炎。預防方法須注意注射液之調製、注射部位及注射方法，減慢注射速度。
  - ②溶解後須儘速使用。若須保存時在室溫可保存24小時，若冷藏庫可保存5天以內使用。
- 8.室溫25℃以下遮光保存。

包裝 1公克小瓶裝，100支以下盒裝。

**製造廠：濟生化學製藥廠股份有限公司**

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路3號

**委託者：萬欣藥業有限公司**

地址：台北市內湖區民權東路6段123巷20弄12號2樓