

“台裕” 林 格 氏 注射液

Ringer's Solution for Injection “Tai Yu”

【成 分】

Each ml contains:

Sodium Chloride 8.6mg

Potassium Chloride..... 0.3mg

Calcium Chloride Dihydrate..... 0.33mg

電解質組成(mEq/L)：Na⁺147, K⁺4, Ca⁺⁺4.5, Cl⁻155.5。

滲透壓比：約 1。

【適 應 症】

循環血液量及組織間液減少時，細胞外液之補給及補正。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以每小時 300~500ml 為宜(即每分鐘約 80~130 滴為度)。

【注意事項】

- (一) 1. 腎疾患及腎臟功能不全之患者、心臟功能不全及高張性脫水之患者、閉塞性尿路疾患而致尿量減少之患者，應慎重投藥。
2. 大量急速投藥，其副作用有：腦浮腫、肺水腫、末梢性水腫或酸中毒等現象。
3. 本品含鈣，與抗凝血劑檸檬酸鹽併用時應注意。
4. 使用時，不可與磷酸鹽或碳酸鹽製劑配合，以免發生沉澱。
5. 用前應詳予檢視，如溶液為澄清透明方可使用；輸液玻璃瓶裝者應再拍打瓶底，如有反彈之中空清脆聲(真空)，方可使用。
- (二) 取用時：
1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂，縫隙或瓶塞鬆動；若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
- (三) 輸液套選用及插入法：
1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞；插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【賦 形 劑】

Water for Injection。

【貯藏方法】

室溫避光貯存。

【包 裝】

100、250、500、1000ml 玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋裝，100 支(袋)以下盒裝。



台 裕 化 學 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389