

水分、營養、電解質補充液

“南光”沙多士 注射液 0.45%
0.225%

Suntose INJECTION 0.45% "N.K."
0.225%

急性下痢、激烈嘔吐、霍亂.....等等，均會引起身體喪失大量水分，因此，必須及時補充或維持正常量的水分，以彌補鹽的過度損失，所以，本品可謂是一種 rehydrating solution.

□成份：Each ml contains:

	0.45 %	0.225 %
Dextrose Monohydrate	50 mg	50 mg
Sodium Chloride	4.5 mg	2.25 mg

□賦形劑：Water for Injection。

□製劑特性：

	0.45 %	0.225 %
Dextrose Monohydrate (w/v%)	5	5
Sodium chloride (w/v%)	0.45	0.225
Na ⁺ (mEq /L)	77	38.5
Cl ⁻ (mEq /L)	77	38.5
Calories (Cal / L)	170	170
Osmolarity (mOsm / L)	406	329
抗微生物劑	—	—

□適應症：

鈉、氯離子之補充，脫水時水分補充，體內葡萄糖、熱能之補充。

□用法用量：本藥限由醫師使用。

用法 — 可藉靜脈注射投與。

用量 — 通常成人一次500~1000 ml，可視實際需要酌予增減。

□注意事項：

- 1.具有下列症狀之患者應慎重投與：(1)腎臟疾病 (2)心臟疾病 (3)閉塞型尿道疾病而有尿量減少時 (4)糖尿病
- 2.大量急速投與時，可能會出現下列副作用：腦浮腫、肺水腫、四肢浮腫、酸中毒、水中毒。
- 3.使用方法

(1)取用時:

- a.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- b.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法:

- a.請依輸液套使用方法正確使用。
- b.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲 藏：

應於室溫下存放在陰涼處所。

□包 裝：

- 0.45% — 100, 300, 500, 1000 ml 玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋，100 支以下盒裝。
- 0.225% — 250, 500, 1000 ml 玻璃瓶、塑膠瓶、塑膠軟袋，100 支以下盒裝。

□字 號：

- 0.45% — 衛署藥製字第 029738 號 G.M.P.:G-0707
- 0.225% — 衛署藥製字第 039654 號 G.M.P.:G-5170



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL: (06)5984121(代表) FAX: (06)5981845