



“南光” **沙多士** 注射液 2.5 %
5 %

Suntose Injection 2.5 %
5 % "N.K."

□成分：Each ml contains:

2.5% Dextrose Monohydrate	25mg
Sodium Chloride.....	4.5mg
5% Dextrose Monohydrate.....	50mg
Sodium Chloride	9mg

□賦形劑：Water for Injection。

□適應症：

手術或其他疾患之水分及電解質之補給。

□用法用量：

劑量由醫師視病人之需要而定。可藉皮下或靜脈輸注方式投與。2.5%者適合嬰幼兒使用。本藥限由醫師使用。

□注意事項：

一、取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲藏：

本品應存放於陰涼處所。

□包裝：

2.5% 20,100,250,500,1000毫升玻璃瓶、塑膠瓶或塑膠軟袋裝。

5% 20,100,250,500,1000毫升玻璃瓶、塑膠瓶或塑膠軟袋裝。

2.5% 衛署藥製字第029960號

5% 衛署藥製字第029834號



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號
TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845