

使用說明

泰莎樂™注射液劑210毫克

TEZSPIRE™ Solution for Injection 210 mg

Tezepelumab

注射液，皮下使用

單次使用預填式注射筆

本使用說明包含有關如何注射 TEZSPIRE 的資訊。

在使用 TEZSPIRE 預填式注射筆之前，醫護人員應向您或您的照護者示範正確的使用方式。

開始使用 TEZSPIRE 預填式注射筆之前，以及每次拿到新藥後，請先閱讀本《使用說明》，其中可能包含新的資訊。即使您已閱讀本《使用說明》，仍然必須與醫護人員討論您的疾病和治療。
如果您或您的照護者有任何疑問，請諮詢醫護人員。

注射 TEZSPIRE 前您需要瞭解的重要資訊

請將 TEZSPIRE 置於原包裝盒內，放入冰箱冷藏 (2°C 至 8°C)，等到要注射時再取出。TEZSPIRE 在室溫 20°C 至 25°C 置於原包裝盒內最多可保存 30 天。

TEZSPIRE 回復至室溫時，請勿放回冰箱冷藏。

TEZSPIRE 如果在室溫下保存超過 30 天，請立即丟棄。

如果出現下列情況，請勿使用 TEZSPIRE 預填式注射筆：

- 注射器已結凍
- 注射器曾掉落或已損壞
- 包裝盒上的安全封條已拆封
- 已超過保存期限 (EXP)

請勿搖晃預填式注射筆。

請勿將預填式注射器共用或使用超過 1 次。

請勿讓 TEZSPIRE 預填式注射器受熱。

若有上述情況，請將預填式注射筆丟棄，放入不易刺穿的尖銳物品收集盒，換一支新的 TEZSPIRE 預填式注射筆。


每支 TEZSPIRE 預填式注射筆含有 1 劑 TEZSPIRE，只能使用 1 次。

TEZSPIRE 預填式注射筆和所有藥物請妥善收存，避免兒童拿取。

TEZSPIRE 只能採用皮下注射 (皮下) 給藥。

您的 TEZSPIRE 預填式注射筆

請勿取下注射器的保護蓋，直到本說明的步驟 6 準備注射 TEZSPIRE 時再取下。



準備注射 TEZSPIRE

步驟 1 – 準備用品

- 1 支從冰箱取出的 TEZSPIRE 預填式注射筆
- 1 片酒精棉片
- 1 個棉球或 1 塊紗布
- 1 條小繃帶 (非必要)
- 1 個不易刺穿的尖銳物品收集盒。請見步驟 10 的說明，以安全的方式丟棄使用過的 TEZSPIRE 預填式注射筆。



步驟 2 – 準備使用 TEZSPIRE 預填式注射筆

注射之前，請先將 TEZSPIRE 回復到室溫 20°C 至 25°C，通常需要約 60 分鐘 (最多可保存 30 天)。

請將預填式注射筆置於原包裝內保存，避免光線照射。

請勿以其他方式將預填式注射筆回溫，例如放入微波爐或熱水中加熱、直接日曬或放在其他熱源附近。

TEZSPIRE 回復至室溫後，請勿放回冰箱冷藏。TEZSPIRE 如果在室溫下保存超過 30 天，請立即丟棄。

步驟 6 之前請勿取下保護蓋。



步驟 3 – 取出並檢查預填式注射筆

握住預填式注射筆主體的中段，從托盤中取出預填式注射筆。



檢查預填式注射筆是否損壞。如果預填式注射筆損壞，請勿使用。

檢查預填式注射筆上的**有效期限**。如果預填式注射筆過期，請勿使用。

請透過檢視窗，檢查注射液，應為透明無色至淺黃色。

如果 TEZSPIRE 注射液出現渾濁、變色或有顆粒，請勿使用。

注射液中可能含有小氣泡，這是正常現象。您不需要採取任何行動。



有效期限

注射 TEZSPIRE

步驟 4 – 選擇注射部位



如果您自行注射，**建議注射部位**為大腿前側或肚子下方 (腹部)。請勿自己注射在上臂。

如果由照護者替您注射，可注射在上臂、大腿或腹部。

每次注射時，請選擇不同的部位，和前一次的注射部位至少要距離 3 公分。

請勿注射在以下部位：

- 肚臍周圍 5 公分以內
- 皮膚觸痛、瘀傷、脫屑或變硬的部位
- 皮膚上的疤痕或受傷部位
- 透過衣物注射




步驟 5 – 洗手並清潔注射部位

用肥皂和清水確實洗淨雙手。

用酒精棉片以畫圓的方式清潔注射部位，等待自然乾燥。

直到注射前，**請勿**觸碰已清潔過的區域。

已清潔過的區域**請勿**搨風或用嘴吹氣。



步驟 6 – 取下保護蓋

請勿取下保護蓋直到準備要注射時才可取下。



一手握住預填式注射筆主體，另一手小心拿掉保護蓋。

將保護蓋放在一旁，稍後再丟棄。

此時會露出橘色的針頭安全裝置，橘色的針頭安全裝置可以避免您碰觸到針尖。

請勿用手指碰觸針頭或推動橘色的針頭安全裝置。

請勿將保護蓋蓋回預填式注射筆，以免導致提前注射或損壞針頭。




步驟 7 – 注射 TEZSPIRE

請依照醫護人員的指示進行注射。您可以輕輕捏起注射部位的皮膚，也可以不捏起皮膚，直接注射。

依照圖a、b、c、d 所示的步驟注射 TEZSPIRE。


注射時，您會聽到第一聲喀嚓聲，表示注射已經開始。按住預填式注射筆 15 秒鐘，直到您聽到**第二聲喀嚓聲**。

開始注射後，**請勿**變更預填式注射筆的位置。




擺放預填式注射筆。

- 將橘色的針頭安全裝置抵在皮膚上 (成 90 度角)。
- 必須能夠看見檢視窗。




用力向下壓，直到看不到橘色的針頭安全裝置。

- 您會聽到**第一聲喀嚓聲**，表示注射已經開始。
- 注射時，可透過檢視窗看見橘色柱塞向下移動。



請按住注射器約 15 秒。

- 您會聽到第二聲喀嚓聲，表示注射已經結束。
- 橘色柱塞會填滿整個檢視窗。




完成注射後，筆直向上提起預填式注射筆。

- 橘色的針頭安全裝置會向下滑出，鎖定到位將針頭蓋住。


步驟 8 – 檢查檢視窗

檢查檢視窗，確認藥物都已注射完畢。


如果橘色柱塞桿沒有填滿檢視窗，表示您可能並未將劑量全部注射完畢。
若有這個情形，或您有其他疑問，請聯絡醫護人員。



注射前



注射後



步驟 9 – 檢查注射部位

注射部位可能出現少許血液或液體，這是正常現象。

請用棉球或紗布輕輕按壓皮膚，直到不再流血為止。

請勿搓揉注射部位。若有需要，可使用小繃帶貼住注射部位。