



妥血止[®] 注射液(妥內散敏)

Transacid[®] Injection (Tranexamic acid)

Fibrin 溶解現象(線溶現象)是身體內的生理現象，也是一種病態的生理現象，溶解現象開始後 Fibrin 被分解，接著血管透過性亢進，而發生種種出血症狀或過敏症狀。其進展與治癒之間與 Plasmin 有著密切的關係，Transacid 能阻止 Plasminogen Activator 與 Plasmin 之作用，故具有抗出血、抗過敏、抗炎症之效果。

【成份】 Each ml contains :

Tranexamic Acid.....50mg

構造式：
$$\text{H}_2\text{NH}_2\text{C}-\text{C}_6\text{H}_{10}-\text{COOH} \quad \text{Mol. wt. : 157.21}$$

Trans-4-aminomethylcyclohexane carboxylic Acid

賦形劑：Sodium Bisulfite、Water For Injection

【藥理作用】 ①抗 Plasmin 作用：

Transacid 對 Plasminogen Activator 與 Plasmin 之作用特別具有強力的阻止效果。

②止血作用：

當 Plasmin 異常亢進時，Fibrin 會輕易的被分解，血小板之凝集作用也會被阻止。使用 Transacid 時，可以阻止 Fibrin 的被分解及抑制血管之脆弱化，而得到止血的效果。

③抗過敏、抗炎症作用：

Transacid 是對 Kinin 或其他活性的 Peptide 等引起之血管透過性亢進，及過敏性炎症性病變之原因（即 Plasmin 等）具有抑制作用，臨床上可以改善皮膚疾病、咽喉頭疾病之腫脹、發赤、瘙癢等症狀。

【適應症】 全身及局部出血或出血性疾病。

【用法用量】 一日 5~10ml，一日 1~2 次靜脈或肌肉注射，必要時一次 10~100ml 靜脈點滴注射。本藥限由醫師使用。

【使用時之注意事項】

- ①採取緩慢靜脈注射。（急速投與可能易引起噁心、胸部不適、心悸亢進、血壓低下之現象）。
- ②肌肉注射時避免影響組織及神經。若須多次注射時，避免在同一部位注射。
- ③注射針刺進皮膚，如有劇烈疼痛或有血液流出時，請即易位注射之。
- ④避免異物混入，請先以 Ethanol 擦拭消毒針劑之瓶頸處，再行切割。

【注意事項】①血栓病者(腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎)，對本藥具過敏病症者，請慎重投與。

②消費性凝固障害之病人要與 Heparin 併用才可以。

③如發生過敏現象，請停止用藥。

④使用後偶而會有搔癢感、發疹、及輕微的睡意。

⑤如併用 Hemocoagulase 等之止血性臟器製劑，可能會增加血栓形成之傾向，須慎重投與。

【包裝】5 毫升、10 毫升、20 毫升安瓿，100 支以下盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號