

安 可 健 注射液

Vagostin Injection

【組成】主成分：每ml含：

Neostigmine Methylsulfate0.5mg

賦形劑：Sodium Chloride、Sodium Acetate 3H₂O、
Acetic Acid(Glacial)、Water for Injection。

【作用】

Neostigmine有抗Cholinesterase作用，在身體內能防止Acetylcholine之分解，而增加Choline作用（即副交感神經興奮作用），其主要之作用，乃刺激腸管之蠕動及興奮膀胱肌之張力。

【適應症】

腸管麻痺，肌無力症，血管痙攣性疾患，眼筋無力症。

【用法・用量】

成人通常每日一次，一次1ml注射於肌肉內，依年齡及症狀之輕重由少量而漸次增量至一次3ml或一日數次，一次1ml可反覆使用，腸麻痺者一次1ml亦可每隔4～5小時反覆使用，對於眼科領域一次0.5～1ml注射於皮下內。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1.妊娠期／生育期

妊娠期—Neostigmine未在人體或動物做這方面的研究，使用時宜謹慎評估之。

分娩—抗膽鹼製劑，可能會導致尿道刺激及靜脈注射時，可能導致早產。

2.哺乳期：

未有這方面使用產生問題的文獻；宜謹慎使用。

3.副作用：

Neostigmine比Ambenonium或Pyridostigmine易產生嚴重的蕁毒素(Muscarinic)的副作用。

【包裝】

玻璃安瓿：1ml，2ml，100支以下盒裝。

內衛藥製字第001976號



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54220020⑤