

愛克痰 發泡顆粒 600 毫克

Actein Effervescent Granules 600 mg

[成分]

每包中含有
Acetylcysteine.....600 mg.

[適應症]

減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性、蓄意或偶發之 Acetaminophen 中毒之解毒劑。

[特性]

乙醯半胱胺酸 (Acetylcysteine, NAC) 是本品的活性成份。它通過分解粘蛋白複合物、核酸，將膿性成份及其它分泌物從粘稠變為透明而發揮強烈溶粘液作用。

此外，NAC 具有直接抗氧化作用，它提供一個能與親電子的氧化基團相互發生作用的自由硫氨基（親核的 -SH）。最近證實，NAC 能阻止次氯酸 (HOCl) 對 α 1- 抗胰蛋白酶 (α 1-antitrypsin) 和彈性蛋白酶 (elastase) 的破壞。次氯酸是一種強氧化劑，為活化吞噬細胞而產生的髓過氧化物酶 (myeloperoxidase)。由於上述作用，使得本品對於急性和慢性的呼吸系統感染所引起濃稠性及化膿性分泌有極佳之功效。此外，NAC 的分子結構能透過細胞膜，在細胞中分解成 L-Cysteine(L- 半胱胺酸)，此胺基酸是合成 Glutathione(GSH) 的主要成份。GSH 是一種可高度再活化三胺基，普遍存在各種動物的組織中，它提供細胞的保護機制，來保持細胞功能和細胞外形上的完整性。GSH 代表最重要的保護功能，無論體內，體外，還是其他大多數之細胞毒素物質，其反應機制是抗氧化作用。

NAC 在維持體內有足夠 GSH 之平衡中，扮演重要的角色。而 GSH 有助於保護細胞免受有毒物質藉著不斷消耗 GSH，而產生細胞毒性作用，如 Acetaminophen 中毒的情況。由於具有這種作用機制，在 Acetaminophen 中毒時，NAC 也可作為一種特殊的解毒劑。

[用法、用量]

(六歲以上或成人) 一次服用本品 600 mg 的發泡顆粒一包，一天一至二次（最好在晚上服用）。一包發泡顆粒置於玻璃容器中，需用 150C.C. 以上的水溶解，混勻後服用。

本藥需由醫師處方使用。

[禁忌症]

對本品內含成份過敏者，請勿投與。因本品含有甜味劑阿斯巴甜 (Aspartame)，故苯酮尿患者不宜使用。

[副作用]

本品口服，偶爾發生胃腸障礙如噁心和嘔吐，極少出現諸如皮疹和支氣管痙攣等過敏反應。

[警告]

在治療時，患有支氣管哮喘的病人用藥要嚴格控制。出現支氣管痙攣時治療必須立刻暫停。藥品可能有硫臭味，此並非代表產品變質，而是此製劑中含有活性成份的一種特徵。最好不要將其它藥物與本品的溶液混在一起。

[賦形劑]

Citric Acid Anhydrous Granular、Sodium Carbonate、Sodium Bicarbonate、Sucrose Granule、Aspartame、Acesulfame Potassium、Pineapple Powder、Orange Powder.

[包裝]

2 ~ 555 公鋁箔袋盒裝 (每包 1.8 公克)。

儲存於 25°C 以下。

衛部藥製字第 059040 號



藥商：健喬信元醫藥生技股份有限公司

地址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

製造廠：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

地址：303 新竹縣湖口鄉中興村工業一路 6 號

製造廠(分包裝)：優良化學製藥股份有限公司

地址(分包裝)：303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號