



合利他命 F 50 糖衣錠

ALINAMIN-F 50 S.C. TABLETS

內衛藥製字 第 004085 號

須由醫師處方使用

版本日期 2026-01-19

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每1錠中含有下列成分：

Fursultiamine (TTFD)50mg

Vitamin B₂.....5mg

1.2 賦形劑

Talc、Magnesium Stearate、Acacia、Shellac Pearl-N、Glyceryl Monostearate、
Beeswax White、Ethyl Vanillin、Tartrazine、Castor Oil、Sucrose、Carnauba
Wax、Gelatin、Lactose、Corn Starch、Alcohol 95%、n-Hexane、Opacode
Grey、n-Butyl Alcohol

1.3 劑型

糖衣錠

1.4 藥品外觀

黃色圓形錠，具符號及F50字樣，直徑約9mm。

2 適應症

神經炎、維生素B₁缺乏諸症、神經痛、術後腸管麻痺、眼睛疲勞，神經性膀胱炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人1日1~3錠，分3次於飯後服用，不必咬碎，立即吞服即可，依症狀可適宜增
減用量。但施行大量療法時，原則上1日量服用100mg以上，對重症神經性疾患則1日
量增加到300mg較為適宜。

4 禁忌


無。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

服用本劑後尿液呈黃色，此係本劑所含之維生素B₂所引起，不必掛慮。

7 交互作用



目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

合利他命F係將原來之合利他命 (Thiamine Propyl Disulfide) 改變為無臭性之維生素B₁。與合利他命同樣屬於Disulfide型 (S · S型) 之化合物，為維生素B₁之衍生體。

10.2 藥效藥理特性

Fursultiamine

維生素B₁在維持神經細胞形態上扮演重要角色，它參與了神經細胞的神經傳導及能量產生。與傳統維生素B₁相比，Fursultiamine於腸胃道被良好吸收，具有使血液與器官中維生素B₁濃度更高、在體內停留時間更長，以及生成大量結合型維生素B₁的特性。藉由於生理及生化層面上補充維生素B₁的代謝儲池，它可改善因維生素B₁缺乏或代謝異常所導致的神經功能受損。

就其對神經與肌肉的作用而言，曾於試驗中觀察到神經細胞增生加速、神經再生加快（兔子試驗）以及骨骼肌動作電位增加（大鼠試驗）。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

合利他命F與原來之維生素B₁性質迥異，具有以下諸種特長：

1. 易由消化管吸收，顯示出高的血中濃度。
2. 具有Lipoid易溶之特性，故對組織之親和性強，可高濃度移行於血球、體液等各種臟器中，長時間貯留於體內。
3. 於體內迅速酯化 (Esterification)，產生多量的結合型B₁ (Cocarboxylase)。
4. 不被維生素B₁分解酵素 (Aneurinase) 所分解。
5. 大量療法時，可迅速顯現出合利他命效果。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2 ~1,000錠，盒裝、瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請保存於乾燥，25°C以下及避免日光直射的場所，以確保品質。

15 其他

版本：IT-1785-05

製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

藥商

台灣武田藥品工業股份有限公司

台北市信義區松高路1號17樓