

152mm

艾胃逆服®

Algitab® CHEWABLE TABLETS 咀嚼錠

衛署藥製字第031800號

【成分】每錠含：

有效成分及含量：Alginic acid.....0.200g
Magnesium carbonate(light).....0.040g
Aluminum hydroxide gel(dried).....0.030g
(註：鎂含量為0.8mEq)

其它成分(賦形劑)：Hydrated Silica、Sucrose、Lactose Spray Dried、Povidone K-30、
Citric Acid Monohydrate、Caramel Flavor、Sodium Bicarbonate、
Vanillin、Strawberry Flavor、Magnesium Stearate

【用途(適應症)】逆流性食道炎、裂孔赫尼亞、胃灼熱、胃及十二指腸潰瘍、胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 三歲以下。
 2. 消化道潰瘍的人。
 3. 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射，宜保存於25℃以下。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 每一錠含鈉 0.4mEq。
 5. 本藥應於口中咀嚼或溶化後吞服。
 6. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

【用法用量】

一日服用次數	每次服用量
3 次	2 錠

餐後咀嚼服用，睡前服用效果更佳。

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢
醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
腸胃道	腹瀉、便秘、噁心、嘔吐、打嗝

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【作用】藻膠酸(Alginic acid)與碳酸鎂(Magnesium carbonate,light)
之混合物，具有產生持續保護性泡沫之功能。因此當胃
酸逆流時，可藉此保護敏感之胃壁及食道壁黏膜。

【包裝】4~1,000錠鋁箔盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【說明】本產品由於主原料及蔗糖因素產生黃褐色斑點，
經檢驗不影響產品品質，請安心使用。

【儲存方式】避免陽光直射，請置於適當陰涼處所(25℃以下)。

藥商：台灣東洋藥品工業股份有限公司

臺北市南港區國區街3-1號3樓

製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠

基隆市七堵區工建西路5號

2IS01D041(A03)

215mm