

aine Aluzaine Aluz

雅露佳[®]錠

Aluzaine[®] Tablets

胃炎或胃部疾患向來皆以飲食療法為主，再併用制酸劑、抗膽素劑、黏膜保護劑的方法收效雖佳，但對於胃痛、嘔吐、悶胸、噁心等主訴緊迫症狀卻不易顯效。

通常之局部麻醉劑，因其毒性強易生耐藥性，唯獨Oxethazaine 為幾乎無此缺點之胃黏膜專用之局部麻醉劑，本公司再配合Polymagal 之制酸劑而成「雅露佳」錠。

成分：每錠含

Oxethazaine.....10 mg

Polymagal 400mg

作用及特質：

(1)解除急性胃炎症狀(但弱酸性及無酸性胃炎例外)。

可除去由胃炎引起的胃痛、噁心、胃灼熱、胃不快感、嘔吐等症狀，且可抑制胃機能的異常亢進。

(2)消去便意頻迫症狀。

胃痛時胃腸反射刺激亢進屢使便意頻繁，「雅露佳」錠可緩和胃腸反射感度，改善便意頻迫症狀。

(3)作用持續長久。

Oxethazaine絕少被吸收，LD₅₀為1.8g/kg 毒性極低，配合Polymagal可延續其作用時間，Polymagal為持續性制酸劑，可保護胃粘膜，但不引起便秘和下痢。

適應症：急、慢性胃炎所引起的胃痛、噁心、胃灼熱以及胃部不快感。

用法用量：成人通常一次1～2錠，孩童半量。一日3～4次，每飯前15分鐘及就寢前服用。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

賦形劑：Potato Starch、Carboxymethylcellulose Sodium、Sodium Starch Glycolate、Sodium Lauryl Sulfate、Water Purified、Alcohol 95%、Vegetable Magnesium Stearate、Glycyrrhiza Extract(Licorice Extracts)

貯藏：貯存於乾燥避光之室溫處(25℃以下)

包裝：6-1000錠鋁箔盒裝。6-1000錠塑膠瓶裝。

衛署藥製字第012828號 Code. No. TA-03 2211030



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號

S0412