

炎平膠囊 15毫克

(施普樂)

Anpin Capsules 15mg
(Seaprose-s)

本劑為Aspergillus melleus在特殊情況下培養產生精製而成之一種蛋白分解酵素在pH5~9之範圍內安定，俱強力的抗腫脹作用及蛋白分解作用。對粘液性及膿性分泌物俱優良的溶解效果。對於喀痰，膿粘液，外傷手術，浮腫之緩解均有理想的表現。

成分：每粒含

Seaprose-S..... 15mg

賦形劑：Potato Starch、Silicon Dioxide

膠囊殼(Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Purified Water)

特 徵：●蛋白分解作用：蛋白分解力(Casein pH7, 37°C)為 α -Chymotrypsin之1.4倍，Bromelain之8.8倍。

●Bradykinin之分解作用：其分解力與 α -Chymotrypsin約大致相同，Trypsin之4倍，Bromelain之300倍。

●抗腫脹作用：本劑俱強力速效之消炎、抗浮腫作用，小劑量即有顯著的效果。本劑之最小有效量為2.5mg/kg，為 α -Chymotrypsin之1/8，Bromelain之1/64。

適 應 症：外傷後及手術後腫脹之緩解、因支氣管炎、細支氣管炎、支氣管擴張症、支氣管喘息、肺結核、肺氣腫引起之喀痰困難。

用法用量：通常成人一次10~15mg，1日3~4次，於飯後及就寢前服用。依年齡症狀適宜增減之。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

①慎重投藥：血液凝固異常之患者、嚴重肝、腎障害之患者。

②副作用：①過敏症：偶有發疹、發紅之現象，中止投藥即可消失。

②消化器：腹瀉、胃病、偶有食慾不振、胃部不快感、噁心、嘔吐等現象。

③血液：偶有血痰之現象。

③相互作用：有增強抗凝血劑之效力，故與抗凝血劑併用時必須小心觀察慎重投藥。

④室溫儲存。

包 裝：6-1000粒塑膠瓶裝。

委 託 商：上大藥品有限公司

新北市蘆洲區中山二路176-1號5樓

製 造 廠：衛達化學製藥股份有限公司

台中市南屯區工業區23路21號