



“永信”

祛痰劑

暢痰

(艾普樂索)

Axol

(Ambroxol)

錠 30公絲

Tablets 30mg "Yung Shin"

AOT-006
衛署藥製字第031662號
Code No.:38207

3.98cm

本藥主成分係Bromhexine之代謝產物，具有更優秀的祛痰排痰效果。

【成分】每錠中含：

Ambroxol Hydrochloride.....30mg

【賦形劑】

Lactose、Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Orange Powder、Mannitol、Aspartame。

【特徵】

1. 本藥具有刺激分泌與溶解分泌物的特性，因此促使排除呼吸道內粘稠且充血的分泌物。
2. 本藥能刺激支氣管—肺系統內表面活性物質（Surfactant）的形成與分泌，因而增進粘液纖毛運送機轉的效力。服用後可以很有效地幫助粘液的排除與呼吸道的通暢。
3. 以本藥治療時，鼻、喉嚨與支氣管的乾性粘膜內之分泌可變為正常，並舒緩疲憊刺激性的咳嗽。
4. 本藥耐受性良好，可長期使用。

【適應症】

祛痰。

【用法用量】

成人及6歲以上的小孩：初期治療時，每次一錠，一天3次。

長期治療時，每次一錠，一天2次。

2～5歲的小孩：1.2～1.6mg/kg/day，分3次服用。

2歲以下的小孩：1.2～1.6mg/kg/day，分2次服用。

飯後伴少量液體吞服之。

本藥須由醫師處方使用。

【警語及注意事項】

1. 於懷孕的頭三個月，不宜使用。
2. 本品含阿斯巴甜（Aspartame）賦形劑，苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用。
3. 有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑（erythema multiforme）、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症（Stevens-Johnson syndrome <SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>）、急性廣泛性發疹性膿疱症（acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>）等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

【不良反應】

免疫系統疾患

罕見：過敏反應（hypersensitivity reactions）

頻率未知：過敏性反應（anaphylactic reactions）（包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症）

皮膚及皮下組織疾患

罕見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應（包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症）

【副作用】

1. 消化器：偶而有胃部不快感、胃部膨滿感、胃痛、腹部膨滿感、下痢、軟便、噁心、嘔吐、便秘、胸燒、食慾不振等症狀出現。
2. 過敏症：偶而有發疹、蕁麻疹樣紅斑、瘙癢感等症狀出現；若有此症狀出現時，宜中止投與。
3. 其他：偶而有上肢麻痺的現象出現。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

4～1000錠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：（04）26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2146045