

 易寧優[®] 錠 2毫克 (哈羅哩利杜)
5毫克 (哈泊度)
Binin-U[®] Tablets 2mg
5mg (Haloperidol)

本品是一種長效性精神神經安定劑，適用於精神不安，心理緊張，神經症，神經興奮以及精神病等方面，精神安定劑之作用與鎮靜劑稍有不同，鎮靜劑是刺激睡眠中樞或麻痺覺醒中樞，而精神安定劑，則選擇性作用於腦幹及脊髓等低級神經中樞，以緩和患者之喜、怒、哀、樂等情緒，因而無嗜眠現象發生。

【成分】

易寧優錠2毫克 Each tablet contains :
Haloperidol..... 2mg
易寧優錠5毫克 Each tablet contains :
Haloperidol 5mg

【賦形劑】

易寧優錠2毫克 Lactose、Avicel、Povidone K-30、Polyethylene Glycol 6000、
New Cocaine、Magnesium Stearate、Primojel
易寧優錠5毫克 Lactose、Avicel、Povidone K-30、Polyethylene Glycol 6000、
Tartrazine Aluminum Lake、Aluminum Lake Blue No 1、Indigo
Carmine Aluminum Lake、Stearic Acid、Primojel

【藥理作用】

本品屬於 Butyrophenone 類精神安定劑，具抗精神病效果(鎮靜，抗幻覺，抗妄想，自律神經，遮斷及椎體外路症狀)之藥理作用。

【適應症】

躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。
成人通常一天 2-3次，一次一錠，依症狀酌量增減。

【警語及注意事項】

- 一、「抗精神病藥物惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS)：如同其他的抗精神病藥物，本藥與NMS有關。NMS是一種罕見的特異體質反應，其症狀可能包括：發高燒、全身肌肉僵直、自主神經不穩定、神智改變等。高燒通常是此症狀的早期徵兆。此時應立即中止抗精神病藥物治療，給予適當支持療法並小心監測」。
- 二、曾有精神病患以 haloperidol 治療而發生猝死、QT 波延長 (QT-prolongation)和 torsades de pointes 之案例報告，尤其是比仿單建議更高的治療劑量和靜脈注射有較高的風險導致 QT 波延長和 torsades de pointes 發生。發生 QT 波延長、torsades de pointes 之高風險案例可能發生於無潛在危險因子之病患，但具有以下危險因子之病患必須特別注意，包括建議接受治療之前已有 QT 波延長情形之患者(包括電解質不平衡【特別是低血鉀和低血鎂】、使用已知會引起 QT 波延長之藥物、心血管疾病、甲狀腺功能低下、QT 波延長之家族病史)。倘若 haloperidol 以靜脈注射途徑給藥，應監測病患之心電圖，追蹤其 QT 波及心律不整之情形。
- 三、依據隨機分派，有對照組的臨床試驗 (Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究 (Retrospective cohort study) 發現，抗精神病藥品，包括傳統 (Conventional) 與非典型 (Atypical) 之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患 (dementia-related psychosis) 的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。
- 四、服用本劑時請勿飲酒。
- 五、老年人患有嚴重之心臟病者如需服用本劑時，應請醫師特別指示。
- 六、孕婦應避免使用。

【儲存條件】請儲存於 25℃以下。

【包裝】4-1000 粒瓶罐裝、PTP 鋁箔盒裝。