



"正和"益血康糖衣錠

BLOODFULL S.C. TABLETS "C.H."

衛署藥製字 第 024053 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-03-21

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each S.C. Tablet Contains:

Ferrous Fumarate.....	50 mg
Folic Acid.....	2 mg
Cyanocobalamin.....	2 mcg
Thiamine Mononitrate.....	1 mg
Riboflavin.....	1 mg
Nicotinamide.....	3 mg

本藥品活性成分中含有鈷。

1.2 賦形劑

Sucrose、Calcium Phosphate Dibasic、Castor Oil、Carboxymethyl cellulose
Calcium、Gelatin、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、PVP、
Shellac、Talc、New Coccine

1.3 劑型

糖衣錠

1.4 藥品外觀

本品為紅色糖衣錠，其中一面印有 CH38 之白色字樣。

2 適應症

妊娠期、發育期、貧血、手術後及其他一般鐵質缺乏性貧血，低血色素性貧血。

3 用法及用量

3.1 用法用量


通常成人一次二錠，一日三次於每飯中或每飯後即時服用，有必要時可加倍服用，兒童減半服用。

4 禁忌

已知對維生素B₁₂或本藥品所含之賦形劑發生嚴重過敏者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項



1. 本藥品含有鈷，若已知本身對鈷過敏，請告知醫療人員。
2. 曾有鈷過敏病人使用本藥品後發生過敏性接觸皮膚炎之情形。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

1. 皮膚及皮下組織異常：上市後曾接獲使用本藥品後出現皮膚疹、搔癢、痤瘡樣皮疹、血管性水腫、皮膚炎、多型性紅斑等不良反應。
2. 免疫系統的異常：上市後曾接獲本藥品後出現嚴重過敏反應或過敏性休克不良反應。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

12~1000錠塑膠瓶裝。

13.2 效期


請參閱外盒標示。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下，避光存放。

製造廠

114.03.21



正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區嘉芳里新工路 2 3 號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區嘉芳里新工路 2 3 號