

25 mm
8 mm

鈣立德® 發泡錠

Calcium Vitamin D3 STELLA
Effervescent Tablets



STELLA

衛部藥輸字第026242號

26.25 mm

【作用】：鈣是構成牙齒與骨骼的主要成分，維持心臟、肌肉正常收縮及神經的感應性，活化凝血酶原轉變為凝血酶，幫助血液凝固，控制細胞的通透性，維持骨骼及牙齒的健康。維生素D3幫助或促進鈣、磷的吸收及利用。幫助骨骼及牙齒的生長發育。幫助維持血鈣的正常濃度。維持神經、肌肉生理的正常。幫助骨骼鈣化（calcification）。

【成份】：每錠中含：

有效成分及含量：Calcium 1000 mg (as calcium gluconolactate 100mg and calcium carbonate 2469mg), Vitamin D3 880 IU (equal to 0.022mg)

其他成分(賦形劑)：Citric acid, Anhydrous sodium bicarbonate, Saccharose, Povidone K-30, Sodium saccharin, Orange flavor powder, Riboflavin phosphate sodium, PEG 6000, Absolute ethanol

【用途(適應症)】：預防鈣質缺乏症如佝僂病、牙齒損壞及骨質疏鬆病。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏。(二) 嚴重腎衰竭。(三) 腎結石

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 正在接受心血管疾病治療的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量或使用次數。

【用法用量】：本品須加水發泡後飲用，勿直接吞嚥。

成人	一天一次，一次一錠
7歲以上兒童	適用成人劑量之1/2

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	癢疹
腸胃道	噁心、嘔吐、脹氣、腹瀉、便秘

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有上述外之其他不適情況產生。

(二) 本藥過量時偶有高血鈣症、腎結石之病例發生。

【包裝】：2-1000 錠塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存條件】：儲存於30°C以下，避光乾燥處。

藥商：韋淳貿易股份有限公司

地址：104台北市松江路65號4樓

電話：02-25006378

製造廠：Stellapharm J.V. Co., Ltd-Branch 1

地址：No. 40, Tu Do Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam

包裝廠：嘉里醫藥物流股份有限公司

廠址：桃園市龜山區頂湖路58號2樓



PI20200729