

“優良” 碳酸鈣 錠 500 毫克

CALCIUM CARBONATE TABLETS 500 mg "U.L."

【成份】：有效成分及含量：每錠內含有
Precipitated Calcium Carbonate.....500 mg
(註：本藥單次劑量(1錠)之酸中和能力大於9 mEq)

其他成分(賦形劑)：

Microcrystalline Cellulose、Pregelatinized Corn Starch、Aspartame、
Tutti-Frutti Flavor、Magnesium Stearate

【用途(適應症)】：

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(二) 苯酮尿症的人(Phenylketonurics)

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治

(一) 3歲以下。

(二) 消化道潰瘍的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(五) 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】：

年齡	使用量
成人及12歲以上	一天3至4次，每次一錠或需要時服用，應嚼咬後吞服
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之1/2
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之1/4
3歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用

【警 語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】：6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】：請置於25℃以下。

衛署藥製字第028939號

 優良化學製藥股份有限公司

303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號

製造廠名：優良化學製藥股份有限公司

製造廠址：303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號



SLT0050R-02